

UMA NOVA ESPÉCIE DE *PLAGIOMETRIONA* SPAETH (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE, CASSIDINAE)Zundir José Buzzi¹

ABSTRACT

Plagiometriona (Parametriona) palmeirensis sp.n. is described.

INTRODUÇÃO

Spaeth (1899) cria o gênero *Plagiometriona* descrevendo *eggi* e incluindo nesse gênero *clarki* (Bohemann, 1862). Em 1937, Spaeth o divide em dois subgêneros: *Plagiometriona* s. str. e *Parametriona*, ambos subdivididos em vários grupos.

Plagiometriona (Parametriona) palmeirensis sp.n. está incluída no nono grupo, juntamente com *paleacea*, *punctipennis*, *foliata*, *invenusta* e *subprasina*.

Plagiometriona (Parametriona) palmeirensis sp.n.

(Fig. 1)

Subarredondada, pouco mais longa (7,68 mm) do que sua maior largura (7,04 mm). Amarelo-esverdeada exceto os quatro últimos artículos das antenas e olhos, pretos; o sétimo artículo das antenas fusco; unhas castanhas, exceto o dente, mais claro; genas castanho-escuras; o disco do pronoto e dos élitros pouco mais pardo. Anteriormente a mancha do disco elitral se prolonga para os ângulos umerais, não alcançando a margem.

Pronoto 1,7 vezes mais largo que longo; aba transparente e reticulada; superfície lisa; projeção mediana posterior bastante saliente e com margem posterior quase reta. Élitros com os ângulos umerais arredondados; dali para trás alargados e depois estreitados suavemente; ápice arredondado; abas transparentes, reticuladas, pouco mais estreitas que a largura do disco elitral na altura da giba que é bastante forte.

Antenas com os artículos medindo, em mm, do primeiro ao último, respectivamente: 0,40; 0,22; 0,26; 0,26; 0,26; 0,22; 0,26; 0,26; 0,26; 0,28; 0,48; os cinco artículos distais pouco mais alargados que os basais e com sulco sensorial longitudinal.

Tipo e localidade-tipo: Holótipo de El Limón, 1300 m, Litoral, D.F., Venezuela, 20-VI-1965, Bordon Leg., depositado no Museu do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. Parátipos, 13: 12 da mesma localidade do holótipo, dos quais 10 de 19-VI-1965 e dois de 20-VI-1965, Bordón leg.; um parátipo de Tiara (Edo. Aragua) de 21-V-1967, 1200 m, Bordón leg.

•

1. Departamento de Zoologia da UFPR. Caixa Postal 19020 - CEP 81504 Curitiba, PR - Brasil.

Com o Sr. Carlos Bordón, estão sete parátipos (Maracay, Venezuela) que sobre a localidade de El Limón, informou o seguinte: "... queda a aprox. 70 km de Caracas, en la vertiente hacia el mar, de la Cordillera de la Costa. El ambiente es de selva húmeda, a veces con neblina, un área de transición hacia la selva nublada que comienza unos 100 m de desnivel más arriba; 50 km más al Oeste se encuentra el Parque Nacional Henry Pittier (Rancho Grande) que ha sido creado para conservar este ambiente típico de la Cordillera de la Costa".




Fig. 1 – *Plagiometriona (Parametriona) palmeirensis* sp.n.

DISCUSSÃO

Plagiometriona palmeirensis sp.n. é muito próxima de *P. subprasina* Spaeth, 1902 e *P. gibbifera* Champion, 1894 (= *P. foliata* Boh., 1855) e delas se distingue pelos quatro últimos artículos antenais pretos e ventralmente é amarelo-esverdeada. Espécies próximas são também *P. paleacea* (Boh., 1855) que é totalmente amarela e subtriangular; *P. punctipennis* (Boh., 1855), arredondada, amarela exceto o prosterno, mesosterno, abdômen no meio e os quatro últimos artículos antenais que são pretos; *P. invenusta* Weise, 1896, subtriangular, amarela, exceto os três últimos artículos antenais, fuscas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- SPAETH, F. 1899. Beschreibung einiger neuer Cassididen nebst synonymischen Bemerkungen. III. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. 49: 213-221.
SPAETH, F. 1937. Neue Cassidinen des Rijksmuseums in Leiden un meiner Sammlung. Temminckia. 2: 135-158.