Notas sobre os Oligochaeta da Amazônia

Gilberto Righi (*)

Resumo

São estudadas três espécies de Oligochaeta da ilha Curari, no rio Solimões. Novas ocorrências são registradas para *Pristina minuta* (Stephenson), Naididae, e *Dichogaster andina evae* Righi, Ayres & Bittencourt, Octochaetidae. É descrita *Hemienchytraeus* (H.) *solimoensis*, sp. n., Enchytraeidae.

Durante sua permanência no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Dr. Joachim Adis (Göttingen) fez uma grande coleção de animais, dos quais os Oligochaeta foram-me gentilmente enviados para estudo.

Os Oligochaeta estão representados nesta coleção por três espécies provenientes do solo de matas de várzeas na ilha Curari, rio Solimões, Amazonas (03°21'S, 60°08'W). Estes animais encontram-se depositados no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus. Os estudos foram baseados em disseções, em preparações totais coradas pelo Paracarmin de Mayer ou Carmin borácico e em cortes seriados corados pelo método triplice de Mallory (Pantin, 1964).

NAIDIDAE

Pristina minuta (Stephenson, 1914)

Naidium minutum Stephenson, 1914: 327, figs. 3-5; 1923: 68, fig. 22; Marcus, 1943: 129, figs. 103-104A-C.

Pristina minuta, Sperber, 1948: 222; Stout, 1958: 291; Naidu, 1963: 206, figs. 29A-C; Brinkhurst, 1964: 217; Righi, 1973: 295, figs. 1-4.

MATERIAL — Brasil, Amazonas: ilha Curari, rio Solimões; em solo de mata de várzea, 12 exemplares (INPAZ-96), J. Adis col. II-III/1976.

DISTRIBUIÇÃO — Paquistão, Lahore (Stephenson, 1914: 437). Índia, Cuddaph (Naidu, 1963: 206). Brasil, São Paulo: São Pedro (Marcus, 1943: 129); Minas Gerais: serra do Cipó (Righi, 1973: 295); Amazonas: ilha Curari.

Os animais da serra do Cipó e da ilha Curari vivem em solo úmido, periodicamente inundado; os demais são límnicos.

ENCHYTRAEIDAE

Hemienchytraeus (H.) *solimoensis*, sp. n. (Figs. 1-10)

MATERIAL — Brasil, Amazonas: ilha Curari, rio Solimões; em solo de mata de várzea, 11 exemplares (2 fragmentados) (INPAZ-97), J. Adis col. I-III/1976.

O comprimento dos animais varia de 5,0 a 8,5 mm e o diâmetro na região média do corpo de 0,2 a 0,3 mm. O número de segmentos é de 30 a 36. O prostômio é curto e cônico, com o poro cefálico subapical. Em cada segmento, há um anel de glândulas cutâneas coincidente com o anel setífero. Nos segmentos pré-clitulares pode haver mais um anel anterior e outro posterior por segmento. O clitelo é anelar em XII - 1/2 e XIII e apresenta as células glandulares dispostas irregularmente.

A partir de II, há pares de tufo de cerdas por segmento, exceto em XII onde faltam. Há 2 certas por tufo, que se tornam sucessivamente maiores no sentido antero-posterior. Nos segmentos pré-clitulares o comprimento das cerdas varia de 30 a 37 µm e nos pós-clitulares de 50 a 56 µm. As cerdas são retas, sem nódulo e com ligeira curvatura ental (Fig. 1).

O primeiro par de nefrídios prende-se ao septo 6/7; todos apresentam a massa celular intermediária bastante desenvolvida. A porção pré-septal é volumosa, constando do funil e algumas voltas do canal nefridial. A porção pós-septal é ovóide mais alongada nos nefrídios pós-clitulares. O canal excretor tem origem mediana ventral nos nefrídios pré-clitulares e póstero-ventral nos pós-clitulares (Figs.

(*) — Departamento de Zoologia, Universidade de São Paulo.

Hemienchytraeus (H.) solimoensis, sp. n. — 1, cerda posterior; 2-4, nefrídios; 5, vista dorsal dos segmentos V-VII; 6, peptonefrídio; 7, gânglio cerebriode; 8, espermateca; 9, vista de perfil dos segmentos V-VII; 10, funil seminal.

2-4). Os nefridióporos dispõem-se em série com as cerdas ventrais. A relação entre o comprimento das porções pré e pós-septal varia de 3 : 2,8, nos nefrídios pré-clitelaes e de 2 : 3 ou 2,5 : 3 nos pós-clitelaes. Celomócitos são raros. Os poucos observados são discóides, com 9 μ m de diâmetro, nucleados e com o plasma dotado de numerosos grânulos refrigerantes. O gânglio cerebriode (Fig. 7) é pouco mais longo do que largo. A maior largura é próxima da margem posterior, que é côncava. As margens laterais convergem ligeiramente para a frente. O vaso dorsal inicia-se em 13/14.

A transição esôfago-intestino é gradual; não há divertículos. Células cloragógenas são reconhecíveis a partir do segmento VII. O peptonefrídio é formado por uma porção basal cilíndrica, com larga cavidade irregular (Fig. 6). Distalmente divide-se em dois ramos primários de posição transversal, que se subdividem em dois ramos secundários. Estas ramificações são percorridas por um canal delgado. Glândulas septais primárias bastante desenvolvidas prendem-se anteriormente nos septos 4/5 e 6/7 (Fig. 5). As simétricas dos dois primeiros pares fundem-se largamente sobre o esôfago; as do terceiro par são independentes. Pares de glândulas acessórias encontram-se em V e VI. Em um dos exemplares, as glândulas de 6/7 prolongam-se ventralmente em VII (Fig. 9).

Um par de testículos maciços prende-se posteriormente em 10/11. Os funis masculinos têm a forma de cones alongados (Fig. 10), 3 a 4 vezes mais longos do que a maior largura. Um colar cilíndrico é mal delimitado do restante do funil, porém distingue-se bem por suas células não apresentarem grânulos de inclusão. Ao colar adere pequeno tufo de espermatozoides. Os canais deferentes são curtos, irregularmente espiralados e situam-se de cada lado, na região anterior e ventral de XII. Cada canal associa-se a um bulbo penial pequeno e arredondado, com cerca de 50 μ m de diâmetro. Poucos espermatozoides encontram-se na cavidade de XI. Vesícula seminal ausente.

Um par de ovários situa-se em XII. Um ovisaco volumoso prolonga-se dorsal e anteriormente até o septo 9/10 em 8 animais e pos-

teriores até o septo 9/10 em 8 animais e posteriormente até o segmento XIV em outros 3. Ovários parciais (Teilovaria) e um ou dois ovos diferenciados encontram-se em seu interior e em XII. Um par de espermatecas pequenas abre-se em 4/5, em série com as cerdas dorsais e situa-se antero-lateralmente em V. Em cada espermateca (Fig. 8) o duto é musculoso, sem glândulas associadas e seu comprimento equivale a um terço do total da espermateca. A ampola dilata-se um pouco logo após o duto, a seguir diminui ligeiramente de calibre, e termina em outra pequena dilatação. Nenhum dos exemplares tem espermatozoides nas espermatecas.

CONSIDERAÇÕES

Pela organização dos peptonefrídios *Hemienchytraeus* (H.) *solimoensis*, aproxima-se de H. (H.) *bifurcatus* Nielsen & Christensen, 1959, conhecida da Dinamarca. As duas espécies distinguem-se pelas espermatecas, origem do vaso dorsal e tamanho dos celomócitos. H. (H.) *stephensoni* (Cognetti, 1927) é uma espécie complexa, até agora, a única do subgênero conhecida da região Neotropical (Righi, 1974 : 130). H. (H.) *solimoensis* afasta-se de *stephensoni* pelas espermatecas e peptonefrídios. Não está excluída a possibilidade de *solimoensis* ser apenas uma variedade de *stephensoni*, talvez uma linhagem partenogenética. Falam a favor desta última hipótese o tamanho reduzido das espermatecas, a pobreza de espermatozoides no segmento XI, sua ausência nas espermatecas e a posição aberrante do ovisaco na maioria dos animais.

OCTOCHAETIDAE

Dichogaster andina evae Righi, Ayres & Bittencourt, 1977

D. andina evae Righi, Ayres & Bittencourt, 1977, 6 figs.

MATERIAL — Brasil, Amazonas : ilha Curari, rio Solimões; em solo de mata de várzea, 5 exemplares clitelados (INPAZ-98), J. Adis col. II-III/1976.

CONSIDERAÇÕES

Este material difere da forma típica da sub-espécie, conhecida apenas da região do rio Preto de Eva, Amazonas, por faltarem papilas associadas aos poros prostáticos.

SUMMARY

Three species of *Oligochaeta* are studied from ilha Curari, river Solimões, Amazonas, Brazil. New occurrences are recorded for the naidid *Pristina minuta* (Stephenson, 1914), and for the octochaetid *Dichogaster andina evae* Righi, Ayres & Bittencourt, 1977. The enchytraeid *Hemienchytraeus* (H.) *solimoiensis*, sp. n., is described.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- BRINKHURST, R.O.
1964 — Studies on the North American aquatic *Oligochaeta*. I. Naididae and Opisthocystidae. *Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia*, 116 (5):195-230.
- COGNETTI DE MARTIUS, L.
1927 — Lumbricidi dei Carpazi. *Boll. Mus. Zool. Genova* (2)7(10):1-8.
- MARCUS, E.
1943 — Sobre Naididae do Brasil. *Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. S. Paulo*, 25, *Zoologia*, 7:3-181, est. 1-33.
- NAIDU, K.V.
1963 — Studies on the freshwater *Oligochaeta* of South India. I. Aelosomatidae and Naididae, 5. *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 60 (1):201-227.
- NIELSEN, C.O. & CHRISTENSEN, B.
1959 — The Enchytraeidae. Critical revision and taxonomy of European species. *Nat. Jutl.*, 8-9:1-160.
- PANTIN, C.F.A.
1964 — Notes on microscopical technique for zoologists. :VIII+76 pp. Cambridge University Press.
- RIGHI, G.
1973 — On *Pristina minuta* (*Oligochaeta*, Naididae) from Brazilian soil and its epizoic *Rhabdos-tyla pristinis*, sp. n. (*Ciliata*, Epistylidae). *Zool. Anz.*, 19 (5/6):295-299.
1974 — Notas sobre os *Oligochaeta* Enchytraeidae do Brasil. *Papéis Avulsos S. Paulo*, 28(7):127-144.
- RIGHI, G., AYRES, I. & BITTENCOURT, E.C.R.
1977 — *Oligochaeta* (Annelida) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia *Acta Amazonica* (no prelo).
- SPERBER, C.
1948 — A taxonomical study of the Naididae. *Zool. Bidrag*, 28:1-296, pls. 1-21.
- STEPHENSON, J.
1914 — On a collection of *Oligochaeta* mainly from northern India. *Rec. Ind. Mus.*, 10:321-365.
1923 — The fauna of British India. *Oligochaeta*. :XXIV+518 p., Taylor & Francis, London.
- STOUT, J.
1958 — Aquatic *Oligochaetes* occurring in forest litter. II. *Trans. R. Soc. New Zealand*, 85(2):289-299.

(Aceito para publicação em 20-08-78)