IMUNOSSUPRESSÃO COM TACROLIMUS FAVORECE A REGENERAÇÃO HEPÁTICA INDUZIDA POR HEPATECTOMIA EXTENSA EM RATOS

Tacrolimus-based immunosuppression favours liver regeneration induced by extent hepatectomy in rats

Ozimo Gama **FILHO**, Edimar Leandro **TODERKE**, Giorgio Alfredo Pedroso **BARETTA**,
Daniele Giacometti **SAKAMOTO**, Miguel Angelo **AGULHAM**,
Elizabeth Milla **TAMBARA**, Jorge Eduardo Fouto **MATIAS**

Trabalho realizado no Laboratório de Cirurgia Experimental do Programa de Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

RESUMO - Racional - A regeneração hepática representa o resultado de respostas fisiológicas que ocorrem após perdas de parênquima, como consequência de agressões tóxico-medicamentosas, infecciosas, traumáticas ou cirúrgicas. **Objetivo** - Avaliar, em dois momentos distintos da regeneração hepática, a influência do tacrolimus sobre o fenômeno da regeneração hepática desencadeada pela ressecção de 70% do parênquima hepático em ratos plenamente desenvolvidos. **Método** - Utilizaram-se 40 ratos Wistar com peso médio de 510,08 g $\pm$ 11,66 g divididos aleatoriamente em dois grupos de 20 (Estudo e Controle), cada grupo subdividido em dois subgrupos conforme o dia da morte após a hepatectomia (24 horas e 7 dias). De acordo com o grupo os animais receberam por gavagem, diariamente, iniciando três dias antes da hepatectomia e prolongando-se por todo o período de observação, solução aquosa de tacrolimus 0,1 mg/kg/dia ou solução salina no mesmo volume. Após três dias de pré-terapia todos foram submetidos à hepatectomia de 70% pela ressecção dos lobos hepáticos mediano e lateral esquerdo que foram pesados para posterior cálculo da regeneração hepática pela fórmula de Kwon. Vinte e quatro horas ou sete dias após a hepatectomia, 10 animais de cada grupo foram mortos, os fígados remanescentes (regenerados) foram pesados e amostrados para realização de índice mitótico por hematoxilina-eosina e estudo imunoistoquímico com os marcadores PCNA e Ki-67. **Resultados** - Os animais que receberam tacrolimus mostraram índice maior de regeneração hepática, atingindo significância estatística quando comparado ao subgrupo de animais mantidos com placebo quando analisados pelos parâmetros: fórmula de Kwon, índice mitótico e marcador PCNA. A tendência para o marcador Ki-67 foi idêntica aos outros parâmetros, mas não alcançou significância estatística. **Conclusões** - A imunossupressão com tacrolimus possui efeito estimulante no processo de regeneração hepática desencadeado pela hepatectomia 70% em ratos Wistar adultos, plenamente desenvolvidos.

DESCRIPTORES - Tacrolimo. Hepatectomia. Regeneração hepática.

Correspondência:

Ozimo Gama Filho,
e-mail: ozimogama@hotmail.com

Fonte de financiamento: não há
Conflito de interesses: não há

Recebido para publicação: 12/10/2009
Aceito para publicação: 14/01/2010

ABSTRACT - Background - Liver regeneration is the result of physiological responses that occur after loss of parenchyma, as a consequence of drug abuse-toxic, infection, trauma or surgical procedure. **Aim** - To analyze, during two different moments of liver regeneration, the effect of the immunosuppressant tacrolimus on the 70% hepatectomy model-induced liver regeneration in adult rats. **Methods** - Forty Wistar adult rats, weighing 510.08 $\pm$ 11.66 g were randomly divided into two groups (Study or Control), each group divided into two subgroups according to the death day after 70% hepatectomy (24 hours or 7 days). According to the group of study, rats received 0.1mg/Kg/day of tacrolimus or the same volume of saline solution, by gavage, daily, starting three days before hepatectomy until the end of observation (animal death's day). After three days of pre-therapy, all animals were submitted to 70% hepatectomy by resection of median and left lateral hepatic lobes which were weighed for posterior calculation of liver regeneration by Kwon's formula. Twenty four hours or seven days after hepatectomy 10 rats of each group were killed; the remaining liver (regenerated) was entirely resected, weighed and sampled for mitotic index on hematoxylin-eosin staining and immunohistochemical assays with PCNA and Ki-67 markers. Data were statistically analyzed by Mann-Whitney or Student "t" tests, with significance level of 5% (P<0.05). **Results** - Rats receiving tacrolimus showed statistically significant higher levels of liver regeneration when compared to placebo according to Kwon's formula, mitotic index and PCNA marker. Identical trend was found with Ki-67 marker, but without statistical significance. **Conclusion** - Tacrolimus-based immunosuppression has stimulatory effect on liver regeneration process induced by 70% hepatectomy in adult Wistar rats.

HEADINGS - Tacrolimus, Hepatectomy, Liver regeneration.

INTRODUÇÃO

A regeneração hepática representa o resultado de respostas fisiológicas que ocorrem após perdas de parênquima, como consequência de agressões tóxico-medicamentosas, infecciosas, traumáticas ou cirúrgicas^{8,14}.

O fígado possui reserva funcional e capacidade regenerativa consideráveis. Porém este crescimento tecidual se constitui em fenômeno complexo, do qual participam hormônios e substâncias presentes no soro, ou secretadas nos próprios tecidos após estímulo adequado⁶.

Apesar de ser largamente utilizado, o termo "regeneração" é biologicamente incorreto, uma vez que a resposta induzida pelo dano tecidual hepático promove hiperplasia e hipertrofia compensatória do tecido remanescente, até o restabelecimento da massa hepática inicial. Logo os lóbulos ressecados ou destruídos não são recuperados⁶. Todas as células hepáticas remanescentes proliferam para substituir a perda de tecido hepático e após a re-estruturação do parênquima o processo regenerativo cessa¹⁸.

A cirrose é doença crônica do fígado decorrente de destruição e regeneração das células hepáticas, que acarreta, do ponto de vista histológico, a presença de fibrose e a transformação nodular difusa, com consequente desorganização das arquiteturas lobular e vascular do órgão, capaz de impor graus proibitivos de disfunção orgânica, atingindo estádios irreversíveis de insuficiência.

Em 1983 o Instituto Nacional de Saúde Americano declarou o transplante hepático modalidade terapêutica aceitável clinicamente para pacientes com doença hepática terminal²².

Devido à relevância dos fenômenos regenerativos no fígado transplantado e a possibilidade de interferência de múltiplos fatores, quer endógenos quer exógenos, surge o interesse pela definição de que tipo de ação drogas imunossupressoras teriam sobre a regeneração hepática, pois tais drogas constituem a base do tratamento após transplante de órgãos sólidos.

Os inibidores da calcineurina, cujos representantes são a ciclosporina A e o tacrolimus (FK 506), são os agentes imunossupressores mais utilizados atualmente em pacientes submetidos a transplante hepático cadavérico ou inter-vivos. A calcineurina é uma fosfatase cálcio-dependente responsável pela transcrição da interleucina 2 (IL-2), principal citocina envolvida na resposta imunológica mediada pelo linfócito T. As drogas agem, portanto, inibindo a produção de IL-2, bloqueando desta forma os mecanismos envolvidos na rejeição celular aguda²³.

Francavilla et al, ao estudarem os efeitos do tacrolimus na resposta regenerativa em ratos submetidos à hepatectomia 70%, demonstraram que esta droga apresenta efeito positivo provavelmente

por uma via não imunológica através da inibição da apoptose dos hepatócitos em regeneração, e por uma via imunológica através da inibição das células "natural killer" que apresentam efeito citotóxico direto nos sinusóides hepáticos^{10,11}.

Considerando-se a importância do estudo do efeito dos inibidores da calcineurina, em especial do tacrolimus, sobre a regeneração e remodelação do parênquima hepático, justifica-se o interesse pela análise dos efeitos deste imunossupressor sobre o fenômeno de regeneração hepática quando induzida experimentalmente em ratos através da ressecção de 70%⁹.

O presente estudo visou avaliar, em dois momentos distintos da regeneração hepática, a influência do tacrolimus sobre o fenômeno da regeneração hepática desencadeada pela ressecção de 70% do parênquima hepático em ratos plenamente desenvolvidos.

MÉTODO

O projeto de pesquisa foi realizado de acordo com as normas éticas estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e Lei Federal 6638, submetido, analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da UFPR (CEP/SD), sob o registro CEP/SD: AN.008.004.07.08. Foram utilizados 40 ratos Wistar (*Rattus norvegicus albinus*, Roentia mammalia) adultos, machos, provenientes do biotério de criação do Instituto Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O peso médio inicial dos animais foi 510,08 g (DP $\pm$ 11.66), variando entre 424g e 559,8g.

O experimento foi realizado no Laboratório de Cirurgia Experimental do Programa de Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica da UFPR, onde durante todo o período de estudo os animais permaneceram em ambiente com controle de temperatura ($22 \pm 1^{\circ}\text{C}$), ruído e luminosidade (ciclos claro-escuro de 12 horas – Cronomat[®], Mallory do Brasil, São Paulo, SP, Brasil), agrupados em número máximo de cinco, em gaiolas coletivas de aproximadamente 0,022 m³ (41,4 cm x 34,4 cm x 16 cm). As gaiolas, em número total de 10, foram identificadas e acomodadas sobre estantes horizontais. Durante todo o período de aclimação (14 dias), e de estudo, os animais receberam água e ração balanceada ad libitum, padrão Nuvilab CR1[®]. Os animais foram pesados e divididos aleatoriamente em dois grupos de 20. Cada um desses grupos foi subdividido em dois subgrupos conforme a medicação utilizada e o dia da morte em:

- **Grupo de Estudo (E):** constituído por 20 animais que receberam tacrolimus do 30 dia do pré-operatório até a morte, subdividindo-se em:
 - a) **E.24h:** constituído por 10 animais que receberam tacrolimus do 30 dia pré-operatório até a morte 24 horas após a hepatectomia;

- b) **E.7d**: constituído por 10 animais que receberam tacrolimus do 30 dia pré-operatório até a morte sete dias após a hepatectomia;
- **Grupo Controle (C)**: constituído por 20 animais que receberam solução salina isotônica (SSI) à 0,9% do 30 dia pré-operatório até a morte, subdividindo-se em:
 - a) **C.24h**: constituído por 10 animais que receberam SSI à 0,9% do 30 dia pré-operatório até a morte 24 horas após a hepatectomia;
 - b) **C.7d**: constituído por 10 animais que receberam SSI à 0,9% do 30 dia pré-operatório até a morte sete dias após a hepatectomia.

A pesagem dos animais foi diária, em balança modelo AM 500 Marte®, regulada nos padrões do Inmetro e usada para calcular a dose diária da medicação em estudo em relação a variação do peso corporal.

Para administração diária por gavagem do imunossupressor ou de SSI à 0,9% (placebo), os animais foram submetidos à anestesia inalatória com vaporizador de isoflurano (Isoforine® - laboratório Cristália) na concentração de 1,5 a 3% e fluxo de oxigênio variando de 0,5 a 3L/min. Cápsulas de tacrolimus 1 mg (Janssen - Cilag, São Paulo, SP, Brasil) foram abertas e seu conteúdo diluído em solução aquosa até a dosagem de 1mg/mL. Dose padronizada de 0,1 mg/kg/dia foi fornecida via sondagem orogástrica rígida aos animais dos grupos E.24h e E.7d. Nos grupos controle, utilizou-se quantidades isovolumétricas de SSI à 0,9%.

Após três dias de administração orogástrica de tacrolimus ou placebo de acordo com grupo e subgrupo, todos os animais submeteram-se - após anestesia já descrita, tricotomia e antisepsia da região ventral com solução tópica de polivinilpirrolidona-iodo (PVPI) - à ressecção cirúrgica de 70% da massa hepática total. O procedimento cirúrgico consistiu-se em realizar a laparotomia mediana longitudinal de 4 cm a partir do apêndice xifóide; abertura por planos; liberação dos ligamentos hepáticos; ligadura única dos pedículos dos lobos lateral esquerdo e mediano do fígado com monocril 3-0 e ressecção da massa hepática referente aos dois lobos (Figura 1).

FIGURA 1 – Procedimento cirúrgico: (A) Fio passado ao redor dos pedículos dos lobos lateral esquerdo e mediano; (B) visão frontal após ligadura ainda sem ressecção; (C) aspecto final após retirada dos lobos perfazendo 70% da massa hepática

O fechamento da laparotomia foi realizado com sutura contínua única de prolene 3-0. O espécime ressecado foi pesado para posterior cálculo da regeneração hepática pela fórmula de Kwon e em seguida desprezado.

Após 24 horas da hepatectomia, 10 animais do subgrupo E.24h e 10 do subgrupo C.24h foram submetidos à morte por dose letal inalatória de éter etílico em câmara de vidro. Em seguida o rato foi pesado, posicionado em mesa cirúrgica e, através da reabertura da incisão, inspecionou-se o fígado remanescente regenerado, realizou-se a liberação cuidadosa de todo o órgão e secção das veias supra-hepáticas, porta e cava inferior. O fígado retirado foi pesado e, para estudo histológico, foi amostrada a porção superior do lobo direito, a qual foi armazenada em solução de formalina 10%.

Após sete dias da hepatectomia, os mesmos procedimentos descritos anteriormente foram executados em 10 animais do subgrupo E.7d e 10 do subgrupo C.7d, para completar-se a amostragem de todos os quatro subgrupos do estudo.

Análise da regeneração hepática pelo peso hepático (fórmula de Kwon)

Logo após a morte dos animais, calculou-se a regeneração hepática de cada grupo pela fórmula de Kwon⁹, a qual forneceu a taxa de regeneração baseada no peso hepático:

$$\% \text{ de regeneração hepática} = D/E \times 100$$

Onde:

D = peso do fígado por 100 gramas de peso do animal no dia da morte;

E = estimativa do peso do fígado por 100 gramas de peso do animal no dia da hepatectomia, a qual é calculada a partir do peso do fígado ressecado durante a hepatectomia (R) em que $E = R/0,7$.

Análise da regeneração hepática pelo índice mitótico (HE)

O estudo histológico com coloração de Hematoxilina-Eosina foi desenvolvido no Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas da UFPR. Para avaliação da regeneração hepática utilizando-se o índice mitótico, um fragmento da porção superior do lobo direito após a morte de cada animal foi colocado em frasco contendo formalina à 10%. As amostragens macroscópicas foram padronizadas para todos os espécimes, realizando-se cortes transversais na porção média do fragmento hepático. Após desidratação, diafanização e emblocamento dos tecidos em parafina, foram realizadas microtomias de 4 µm e coloração com HE. Analisaram-se 10 campos de grande aumento (400X) de maneira aleatória, sendo as figuras de mitose registradas e fotografadas.

Análise da regeneração hepática pela imunoistoquímica com PCNA

O estudo imunoistoquímico com PCNA foi desenvolvido no Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas da UFPR. Foram utilizadas lâminas silanizadas para evitar o descolamento dos cortes histológicos durante a coloração. As peças foram desparafinizadas e reidratadas em concentrações adequadas de etanol e água destilada. A atividade da peroxidase endógena foi bloqueada com a utilização de água oxigenada (H₂O₂) a 3% por cinco minutos, seguido por uma breve rinsagem em água destilada e lavagem de 15 minutos em PBS. As peças foram então colocadas em um tampão de citrato com pH de 6,0 e então aquecidas em forno de microondas a 980 C por cinco minutos para o PCNA. Após, as peças foram resfriadas à temperatura ambiente por 20 minutos e rinsadas em PBS. Anticorpos primários anti-PCNA (Monoclonal, Código M0879, Dako, Carpinteria, USA) foram aplicados "overnight" à temperatura de 2° C a 8° C. Após banho em tampão fosfato, seguiu-se à aplicação de anticorpo biotilado por 30 minutos, à temperatura ambiente. Após novo banho em tampão fosfato, seguiu-se à aplicação do complexo estreptavidina – peroxidase por 30 minutos, ainda à temperatura ambiente. Foi então realizado mais um banho em tampão fosfato e revelação da reação imune com diaminobenzidina, seguido de contra-coloração com HE. Na sequência, os cortes foram desidratados e montados com bálsamo e lamínulas de vidro.

A positividade da coloração imunoistoquímica foi identificada nas áreas de pigmentação acastanhada. Controles positivos e negativos foram utilizados. As lâminas foram avaliadas sem a identificação dos grupos dos animais. Foram analisados 100 hepatócitos de maneira aleatória e considerados positivos os que coraram-se moderada ou fortemente e, deste modo, efetuada a porcentagem de células positivas.

Análise da regeneração hepática pela imunoistoquímica com Ki-67

O estudo imunoistoquímico foi desenvolvido no Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas da UFPR. Foram utilizadas lâminas silanizadas para evitar o descolamento dos cortes histológicos durante a coloração. As peças foram desparafinizadas e reidratadas em concentrações adequadas de etanol e água destilada. A atividade da peroxidase endógena foi bloqueada com a utilização de água oxigenada (H₂O₂) a 3% por cinco minutos, seguido por uma breve rinsagem em água destilada e lavagem de 15 minutos em PBS. As peças foram então colocadas em um tampão de citrato com pH de 6,0 e então aquecidas em forno de microondas a 980 C por 30 minutos para o Ki-67. Após, as peças foram resfriadas à temperatura ambiente por 20 minutos e rinsadas em PBS. Anticorpos primários anti-Ki67 (Monoclonal, Código NCL-Ki-67-MM1, Clone MM1, Novocastra, USA) foram aplicados "overnight" à temperatura de 2° C a 8° C. Após banho em tampão

fosfato, seguiu-se à aplicação de anticorpo biotilado por 30 minutos, à temperatura ambiente. Após novo banho em tampão fosfato, seguiu-se a aplicação do complexo estreptavidina – peroxidase por 30 minutos, ainda à temperatura ambiente. Foi então realizado mais um banho em tampão fosfato e revelação da reação imune com diaminobenzidina, seguido de contra-coloração com HE. Na sequência, os cortes foram desidratados e montados com bálsamo e lamínulas de vidro.

A positividade da coloração imunoistoquímica foi identificada nas áreas de pigmentação acastanhada. Controles positivos e negativos foram utilizados. As lâminas foram avaliadas sem a identificação dos grupos dos animais. Foram analisados 100 hepatócitos de maneira aleatória e considerados positivos os que coraram-se moderada ou fortemente e, deste modo, efetuada a porcentagem de células positivas.

Análise estatística

Todos os dados foram tabulados em planilha do programa Microsoft Office Excel® (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA), obtendo-se os valores médios (M), mediana, desvio padrão (DP) para cada variável nos diferentes tempos estudados.

Procedeu-se ao tratamento estatístico conforme a natureza dos dados analisados nos grupos controle e estudo, nos períodos 24 horas e sete dias. Observou-se o pré-requisito da distribuição normal (Gaussiana) das variáveis para a escolha do teste estatístico. Na análise não-paramétrica foi utilizado o teste de Mann-Whitney para as comparações do peso total estimado do fígado (g) no dia da hepatectomia e do peso do animal (g) no mesmo momento entre os grupos nos períodos 24 horas e sete dias; relação do peso total do fígado (g) no dia da morte e do peso do animal (g) no mesmo momento no período 24 horas; porcentagem do Ki67 dentro do grupo estudo e entre os grupos no período sete dias; porcentagem do índice mitótico entre os grupos no período 24 horas. Nos demais resultados utilizou-se a análise paramétrica com o teste "t" de Student. Para todos os testes estatísticos o nível de significância adotado foi de 5% (P≤0,05).

RESULTADOS

Regeneração hepática pelo peso do fígado - fórmula de Kwon

A regeneração hepática avaliada pela fórmula de Kwon mostrou crescimento estatisticamente significativo do remanescente hepático nos dois grupos (estudo/controle), nas primeiras 24 horas e no sétimo dia pós-hepatectomia (Figura 2). Quando pareados os resultados intergrupos, os animais que receberam tacrolimus mostraram índice maior de regeneração hepática, atingindo significância estatística quando comparado ao subgrupo de animais mantidos com placebo (Figura 3).

FIGURA 2 – Porcentagem de regeneração hepática pela fórmula de Kwon e comparações estatísticas intragrupos (24h x 7d)

FIGURA 3 – Porcentagem da regeneração hepática pela fórmula de Kwon e comparações estatísticas intergrupos (controle x estudo)

Regeneração hepática pelo índice mitótico

Na avaliação do índice mitótico pela coloração de HE, a diferença estatística foi observada no grupo controle entre os dois períodos ($P=0,01$) e também no grupo de estudo entre os mesmos períodos, porém com maior diferença quando comparados intergrupos (Figura 4).

FIGURA 4 – Avaliação da regeneração hepática pelo índice mitótico e comparações estatísticas intra e intergrupos

Regeneração hepática pela imunoistoquímica com PCNA

Com relação ao anticorpo, o PCNA, observou-se diferença estatística entre os grupos controle e estudo nos dois períodos, porém sem diferença intragrupos (Tabela 1).

TABELA 1 – Análise estatística das médias da porcentagem do PCNA intra e intergrupos nos períodos 24 horas e sete dias

GRUPOS		PORCENTAGEM DO PCNA		p
		média ± dp	x média ± dp	
Controle 24 horas	x	67,4 ± 17,6	57,9 ± 22,2	0,20
Estudo 24 horas	x	80,7 ± 5,1	78,5 ± 18,95	0,36
Controle 24 horas	x	67,4 ± 17,6	80,7 ± 5,1	0,01
Controle 7 dias	x	57,9 ± 22,2	78,5 ± 18,95	0,01

Nota: dp – desvio-padrão, p – nível de significância estatística

Regeneração hepática pela imunoistoquímica com Ki-67

Com relação ao antígeno Ki-67, a análise estatística dentro e entre os grupos controle e de estudo nos períodos de 24 horas e sete dias não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Tabela 2).

TABELA 2 – Análise estatística das médias da porcentagem do ki67 intra e intergrupos nos períodos 24 horas e sete dias

GRUPOS		PORCENTAGEM DO Ki67		p
		média ± dp	x média ± dp	
Controle 24 horas	x	58,3 ± 19,8	44,7 ± 18,0	0,12
Estudo 24 horas	x	68,8 ± 10,93	64,8 ± 26,51	0,34
Controle 24 horas	x	58,3 ± 19,8	68,8 ± 10,93	0,07
Controle 7 dias	x	44,7 ± 18,0	64,8 ± 26,51	0,08

DISCUSSÃO

O processo de regeneração hepática compreende um intrincado mecanismo molecular, celular e genético auto-regulado com marcadores de iniciação e finalização que apresenta como objetivo final a reconstituição da funcionalidade hepática utilizando múltiplas vias de sinalização^{7,19}.

O modelo universalmente utilizado para o estudo experimental deste fenômeno é a realização de hepatectomia à 70% em roedores proposta por Higgins e Anderson¹⁵. Neste modelo, os pesquisadores costumam utilizar ratos Wistar jovens, com pesos até 250 g, o que faz a resposta de regeneração ser de tal exuberância que chega a atingir níveis acima de 100% nos parâmetros normalmente avaliados^{2,3,24}. Acredita-se que nas condições de estudo acima descritas a regeneração hepática se apoia, pelo menos parcialmente, e sofre influência de múltiplos fatores presentes e ativos nos animais jovens em fase de crescimento. Neste estudo utiliza-se propositalmente ratos Wistar adultos, plenamente desenvolvidos, com pesos acima de 400 gramas, na tentativa de obter-se como único estímulo

e fator interveniente para a regeneração hepática a ressecção extensa do parênquima hepático e o uso do tacrolimus respectivamente.

Já na década de 80 foi demonstrada a capacidade de estímulo do tacrolimus na regeneração hepática⁶. A larga utilização desta droga nos esquemas de imunossupressão pós-transplante hepático e o aumento do número de transplante utilizando a técnica de doador vivo ou inter-vivos demonstra a importância do estudo da participação do tacrolimus na regeneração hepática.

A metodologia aqui utilizada incluiu a pré-terapia com tacrolimus por três dias consecutivos antes do estímulo à regeneração hepática (ressecção de 70% do fígado), o que certamente difere do uso clínico normal deste imunossupressor em humanos. Porém, como o fenômeno de regeneração hepática em ratos após hepatectomia à 70% é bastante conhecido e se caracteriza por apresentar a maioria das alterações moleculares e celulares já nas primeiras 24 a 48 horas após a ressecção⁸, achou-se altamente conveniente que os animais já estivessem com níveis sanguíneos do imunossupressor quando se submetessem ao estímulo da regeneração hepática.

Como não monitorou-se os níveis séricos do imunossupressor durante o estudo, a administração do fármaco através de gavagem, desde o 30 dia pré-operatório até a morte dos animais em 24 horas ou sete dias após a ressecção hepática, assegurou o aporte da dose de 0,1 mg/Kg/dia, levando sempre em consideração a variação do peso corpóreo aferido diariamente para este fim.

Foram aferidas as médias do peso do fígado ressecado, a massa restante e o peso total do órgão no momento da hepatectomia e da morte. Ocorreu diferença significativa nos subgrupos 24 horas o que pode demonstrar o início de ação precoce do tacrolimus no processo de cicatrização^{13,20}.

No presente trabalho quando comparou-se os valores da regeneração pela fórmula de Kwon dentro de cada grupo, observou-se aumento significativo da taxa de regeneração no grupo controle, sendo o mesmo tipo de resultado obtido com o grupo de estudo porém com aumento ainda mais pronunciado ($P < 0,01$).

Este aumento progressivo é ocasionado por dois picos de mitoses encontrados normalmente durante o processo de regeneração. O primeiro ocorre dentro de 24 horas após a hepatectomia e é devido exclusivamente aos hepatócitos⁶.

No segundo pico de mitoses há a participação das células não-parenquimatosas, nos ratos ocorre dentro de 72 horas, sendo mais evidente nas hepatectomias maiores que 50% do parênquima e avaliadas após sete dias⁸.

A taxa de regeneração hepática foi avaliada também pelo índice mitótico e análise imunoistoquímica com marcadores PCNA e Ki-67. O índice mitótico avalia o número de hepatócitos em processo de mitoses

corados no HE com aumento de 400 vezes.

Neste estudo observou-se diferença estatística tanto inter quanto intragrupos na avaliação do índice mitótico. Estas aumentaram cronologicamente, levando-se a considerar que quanto mais tempo sob ação do tacrolimus maior o efeito positivo na regeneração hepática, assim como demonstrado por outros autores^{16,17,21}.

Alvira et al.¹ demonstraram que a ação dos imunossupressores, em especial os inibidores da calcineurina, em porcos transplantados, são dose-dependentes em relação ao efeito hepatotrófico, sendo esta característica reproduzida tanto nas hepatectomias quanto nos enxertos de split liver⁵.

Quando avaliou-se a regeneração hepática pelo PCNA, proteína que expressa atividade do ciclo celular (transição G1 / S), encontrou-se diferença estatística na avaliação intergrupos o que demonstrou a facilitação da passagem das células parenquimatosas e não-parenquimatosas devido a ação do tacrolimus.

Francavilla et al.⁹ demonstrou que o tacrolimus atua como fator de crescimento isolado facilitando a fase de priming da regeneração, além de reduzir o estresse isquêmico celular¹² e modular a resposta inflamatória de forma positiva¹³.

O Ki-67 é um antígeno nuclear expresso nas fases G1, S, G2 e M do ciclo celular. Seu índice (percentual de células marcadas/total de células avaliadas) é utilizado para quantificar a atividade proliferativa celular⁴. Neste estudo o marcador Ki-67 falhou em demonstrar maior proliferação hepatocitária nos subgrupos tratados com tacrolimus, apesar de clara tendência estatística no mesmo sentido dos outros parâmetros do estudo.

Como a proteína Ki-67 está localizada no núcleo celular, em especial no nucléolo, acredita-se que a ação do tacrolimus em níveis genéticos necessitam de avaliação em tempo mais prolongado que sete dias para definir-se a parcela de interferência neste mecanismo por mecanismos transcripcionais^{25,26}.

Os dados do presente estudo comprovam o efeito estimulante do tacrolimus sobre o fígado em processo de regeneração desencadeado por ressecção extensa do parênquima hepático no decorrer dos sete dias de observação.

Outras pesquisas devem ser realizadas no sentido de elucidar todos os mecanismos celulares e moleculares envolvidos neste fenômeno, o que certamente traria potenciais benefícios ainda não explorados na utilização clínica atual desta farmacoterapia

CONCLUSÃO

A imunossupressão com tacrolimus possui efeito estimulante no processo de regeneração hepática desencadeado pela hepatectomia 70% em ratos Wistar adultos, plenamente desenvolvidos.

REFERÊNCIAS

- Alvira LG, Herrera N, Salas C, Pereira F, Herrera J, Suarez-Massa MD, Castillo-Olivares JL. Influence of cyclosporine on graft regeneration and function after liver transplantation: trial in pigs. *Transplant Proc* 2002; 34(1):315-6.
- Biondo-Simões ML, Matias JE, Montibeller GR, Siqueira LC, Nunes Eda S, Grassi CA. Effect of aging on liver regeneration in rats. *Acta Cir Bras* 2006; 21 (4):197-202.
- Branco AB, Campos ACL, Ferreira M, Andriquetto PS, Sakamoto DG, Trubian PS, Matias JEF. Regeneração hepática em ratos submetidos à hepatectomia parcial: efeito da desnutrição protéica e da renutrição pré-operatória. *ABCD Arq Bras Cir Dig*. 2006;19(4):159-66.
- Brown DC, Gatter KC. Ki-67 protein: the immaculate deception? *Histopathology* 2002; 40(1):2-11.
- Dahmen U, Gu YL, Shen K, Dirsch O, Li J, Fan LM, Broelsch C. Onset of liver regeneration after subtotal resection is inhibited by the use of new immunosuppressive drugs. *Transplant Proc* 2002; 34(6):2312-3.
- Fausto N & Riehle KJ. Mechanisms of liver regeneration and their clinical implications. *J Hepatobiliary Pancreat Surg*. 2005; 12(3):181-9.
- Fausto N, Campbell JS, Riehle KJ. Liver regeneration. *Hepatology*. 2006; 43(2 Suppl 1): S45-53.
- Fausto N. Liver regeneration and repair: hepatocytes, progenitor cells, and stem cells. *Hepatology*. 2004; 39(6): 1458-67.
- Francavilla A, Barone M, Starzl TE, Zeevi A, Scotti C, Carrieri G, Mazzaferro V, Prelich J, Todo S, Eiras G. FK 506 as a growth control factor. *Transplant. Proc*. 1990; 22(1): 90-2.
- Francavilla A, Barone M, Todo S, Zeng QH, Porter KA, Starzl TE. Augmentation of rat liver regeneration by FK506 compared with cyclosporin. *Lancet* 1989; 25; 2(8674):1248-9.
- Francavilla A, Starzl TE, Barone M, Zeng QH, Porter KA, Zeevi A, Markus PM, van den Brink MR, Todo S. Studies on mechanisms of augmentation of liver regeneration by ciclosporine and FK506. *Hepatology*, 1991; 14(1): 140-3.
- Garcia-Criado FJ, Palma-Vargas JM, Valdunciel-Garcia JJ, Toledo AH, Misawaka K, Gomez-Alonso A, Toledo-Pereyra LH. Tacrolimus (FK506) down-regulates free radicals tissue levels, serum cytokines, and neutrophil infiltration after severe liver ischemia. *Transplantation* 1997, 27; 64(4):594-8.
- Granelli-Piperno A. The effect of immunosuppressive agents on the induction of nuclear factors that bind to sites on interleukin-2 promoter. *J Exp Med* 1990; 172(6): 1869-72.
- Gonzalez AM, Lopes Filho GJ, Triviño T, Messetti F, Rangel EB, Melaragno C. Opções técnicas utilizadas no transplante pancreático em centros brasileiros. *Rev. Col. Bras. Cir*. 2005;32(1):18-22.
- Higgins G & Anderson R. Experimental pathology of the liver. Restoration of the liver of the white rat following partial surgical removal. *Arch Pathol*. 1931; 12:186-212.
- Kaibori M, Inoue T, Tu W, Oda M, Kwon AH, Kamiyama Y, Okumura T. FK 506, but not cyclosporin A, prevents mitochondrial dysfunction during hypoxia in rat hepatocytes. *Life Sci* 2001; 69(1):17-26.
- Kawano K, Bowers JL, Kim YI, Tatsuma T, Kitano S, Kobayashi M, Clouse ME. FK 506 reduces oxidative hepatic injury following cold ischemic preservation and transplantation. *Transplant Proc* 1996; 28(3):1902-3.
- Koniaris LG, McKillop IH, Schwartz SI, Zimmers TA. Liver regeneration. *J Am Coll Surg*, 2003; 197(4):634-59.
- Kwon, AH, Uetsuji S, Yamamura M, Hioki K, Yamamoto M. Effect of administration of fibronectin or aprotinin on liver regeneration after experimental hepatectomy. *Ann. Surg*. 1990; 211(3): 295-300.
- Lodewijk L, Mall A, Spearman CW, Kahn D. Effect of liver regeneration on the pharmacokinetics of immuno-suppressive drugs. *Transplant Proc* 2009;41(1):379-81.
- Mazzaferro V, Scotti-Foglieni CL, Porter KA, Trejo Bellido J, Carrieri G, Todo S, Fung JJ, Francavilla A, Starzl TE. Studies of the hepatotrophic qualities of FK506 and CyA. *Transplant Proc* 1990; 22(1):93-5.
- National Institute of Health Conference. *Hepatology* 1984; 4;51.
- Schreiber SL. The mechanism of action of cyclosporin A and FK506. *Immunol. Today* 1992; 13(4):136-42.
- Tannuri AC, Tannuri U, Wakamatsu A, Mello ES, Coelho MC, dos Santos NA. Effect of the immunosuppressants on hepatocyte cells proliferation and apoptosis in young animal model of liver regeneration. *Pediatr Transplant*. 2008; 12(1):40-6.
- Taub R. Liver regeneration 4: Transcriptional control of liver regeneration. *FASEB J* 1996; 10(4):413-27.
- White P, Brestelli JE, Kaestner KH, Greenbaum LE. Identification of transcriptional networks during liver regeneration. *J Biol Chem* 2005, 4; 280(5):3715-22.