

NOTA SÔBRE *Fulgora* (1)

LUIZ GONZAGA E. LORDELLO

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de São Paulo

Procurando identificar, de acôrdo com os estudos realizados por PINTO DA FONSECA (1926, 1932), os Fulgóridas atualmente agrupados no gênero *Fulgora* (METCALF 1938), pertencentes à coleção da Cadeira de Zoologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", encontramos as seguintes espécies.

1) *Fulgora servillei* Spinola — Estudamos alguns exemplares (incluindo material do Instituto Biológico de São Paulo), uns sem indicação de procedência e outros coligidos em diferentes pontos do Estado de São Paulo (São Pedro, Tapiraí, Santos, Barretos e Santa Bárbara). Em apenas três exemplares, dois de origem desconhecida e outro capturado em Petrópolis, apareciam as manchas rosadas do apêndice cefálico que, segundo PINTO DA FONSECA (1926), são ausentes na variedade *therezopolensis* por êle descrita.

Chamamos a atenção para o fato de filiar-se a esta espécie o indivíduo figurado no 3.o tomo da obra do Professor COSTA LIMA (1942, fig. 30) onde, por engano, êle é identificado como *F. lampetis* Burm.

2) *Fulgora orthocephala* (Pinto da Fonseca) — Uma fêmea, procedente de Leme, neste Estado de São Paulo.

(1) Hom., Fulgoridae.

3) *Fulgora lucifera* Germar — Esta espécie é, de tôdas, a mais distinta e, a que nos parece, a mais comum, sendo a única da qual existem representantes coligidos em Piracicaba.

As quatro manchas negras que flanqueam as gibas são sempre bastante nítidas, em alguns indivíduos aparecendo mais duas máculas igualmente situadas na post-fronte, entre as quatro mencionadas. A coloração da face ventral variou do pardo sujo ao avermelhado intenso.

4) *Fulgora cearensis* (Pinto da Fonseca) — Estudamos um macho coligido em Batatais (Est. de S. Paulo), cujos caracteres nos indicaram filiar-se a esta espécie, que o entomólogo PINTO DA FONSECA descreveu de indivíduos coletados em Fortaleza.

Dessa forma, a área de distribuição de *F. cearensis* torna-se consideravelmente aumentada.


SUMMARY

This paper includes a few notes on some Homoptera insects of the genus *Fulgora*, according to a study carried out on a little collection belonging to the Laboratory of Zoology of the Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Piracicaba, Brazil).

The following species are mentioned: *F. servillei* Spinola, *F. lucifera* Germar, *F. orihoccephala* (Pinto da Fonseca) and *F. cearensis* (Pinto da Fonseca). The types of the latter having been collected in Fortaleza (Ceará), its area of distribution is considerably enlarged by the information of its occurrence in the State of São Paulo.

LITERATURA CITADA

- COSTA LIMA, A. da, 1942 — *Insetos do Brasil*, 3.o tomo, pp. 1-327, figs. 1-267. Rio de Janeiro.
- FONSECA, J. Pinto da, 1926 — As espécies brasileiras do gênero *Laternaria* (*Fulg.*). *Rev. Mus. Pau.* 14: 471-500.
- FONSECA, J. Pinto da, 1932 — Novos subsídios para o conhecimento do gênero *Laternaria* (*Homop.*; *Fulgoroidea*). *Rev. Entomologia* 2: 1-53.
- METCALF, Z. P., 1938 — The *Fulgorinae* of Barro Colorado and other parts of Panama. *Bull. Mus. Comp. Zoo. Harv. Col.* 82: 275-423.



(*Fulgora cearensis* (Pinto da Fonseca)
(Macho)