Observações sôbre a estrutura foliar de
Spathodea nilotica Seem¹

PAULO NOGUEIRA DE CAMARGO*

1 — Entregue para publicação em 28-12-66; 2 — Cadeira de Botânica da ESALQ.

RESUMO

O autor descreve observações sôbre a estrutura da fôlha de *Spathodea nilotica* Seem., bignoniácea arbórea, ornamental, de origem africana, aclimatada e cultivada no Estado de S. Paulo, para arborização urbana.

A estrutura dos folíolos é estudada com vistas à interpretação do seu comportamento anormal, quando sujeitos a condições de alta perda de água por transpiração.

A fôlha é composta penada e os folíolos são hipostomáticos. A epiderme adaxial é glabra e a abaxial tem enormes pêlos triculares, localizados nas regiões das nervuras. Os estômatos são protrusos, situados nas regiões interfibrovasculares da epiderme abaxial. O mesófilo é heterobárico, com três camadas de parênquima paliádico, e o parênquima lacunoso é constituído de células elipsóidais, em fileiras moniliformes. A cutícula é muito delgada e apresenta espaços subcuticulares.

O autor sugere que a presença dos espaços subcuticulares, aliada à estrutura heterobárica, poderia ter influência em um possível descolamento parcial da cutícula, em condições de alta desidratação dos folíolos.

INTRODUÇÃO

Ao estudarem o balanço hídrico de *Spathodea nilotica* Seem. CAMARGO *et al.* (1966) verificaram que os folíolos dessa planta quando destacados da árvore, apresentam um comportamento anômalo, em relação ao movimento hidroativo dos estômatos. Quando pendurados na balança de torsão, eles perdem água continuamente, até se encarquilhar, e, em certos casos, enrolam-se bruscamente, como se alguma tensão se houvesse rompido. Este fato levou o autor a estudar a estrutura desses folíolos, a fim de procurar esclarecer esse comportamento.

MATERIAL E MÉTODO

Os folíolos de *S. nilotica* foram seccionados em estado frescos com navalha histológica, à mão livre e examinados ao microscópio tendo sido usado, quando necessário, os reagentes e corantes de uso corrente.

Os desenhos foram executados por meio de uma câmara lúcida Reichert, de espelho, e passados a tinta Nankin em papel vegetal, para a confecção dos clichês.

RESULTADOS

A figura 1 mostra um corte transversal da lâmina de um folíolo de *S. nilotica*. A epiderme adaxial é glabra, com células periclinamente alongadas, nas regiões entre-nervuras e mais ou menos isodiamétricas ou anticlinalmente alongadas, nas regiões das nervuras.

A cutícula é delgada, de textura irregular.

O sistema fibrovascular é constituído de nervuras transversalmente decorrentes, em que os feixes são conectados às epidermes por tabiques de esclerênquima. Tais nervuras formam um sistema anastomosado, que divide o mesofilo em uma rede de compartimentos fechados, onde se alojam os clorênquimas. Esta estrutura caracteriza o mesofilo heterobárico. Os feixes libero-lenhosos são envolvidos por um tecido de transfusão, constituído de uma bainha uniestratificada de parênquima incolôr, que envolve os feixes. Essa bainha é muito conspícua, de células grandes, unidas, sem espaços intercelulares.

O parênquima paliádico é formado por três camadas de células, muito regularmente dispostas, sem espaços intercelulares. O parênquima lacunoso se constitui de células alongadas, elipsoidais, em fileiras moniliformes que, na região abaxial, se distanciam entre si, formando longas câmaras subestomáticas (Figs. 1 e 3, cse).

A epiderme abaxial (Figs. 1 e 3) é formada por células bem menores que as da adaxial, periclinamente alongadas, de paredes espessas, em contraste com a cutícula, que é bastante delgada. Nas regiões das nervuras, esta epiderme é deprimida e, nas depressões, se localizam tricomas de dois tipos: 1) pêlos glandulares pequenos, formados por quatro células periclinais basais e um capitel pluricelular hemisférico; 2) grandes pêlos tricelulares, abundantes, de paredes cuticularizadas.

Fig. 1 — Estrutura de um folíolo de *Spathodea nilotica*, em corte transversal da lâmina: cut: cutícula; ep ab: epiderme abaxial; ep ad: epiderme adaxial; esc: esclerênquima; n: nervura; b: bainha da nervura; pal: parênquima paliádico; lac: parênquima lacunoso; cse: câmara subestomática; es: estômato; p: pêlos tricelulares gl: pêlos glandulares.

As regiões interfibrovasculares da epiderme abaxial são bombeadas e apresentam estômatos. Em vista frontal (Fig. 2,A), as células epidérmicas são aproximadamente trapézoidais.

Fig. 2-A — Epiderme abaxial de *Spathodea nilotica*, mostrando os estômatos; ca-célula anexa; B-seção transversal da epiderme do pecíolo de *Musa sp*; ep-epiderme; cut-cutícula; c-cera; pf-pontos de fixação da cutícula; esc-espaço sub-cuticular. (A - original; B - seg. EAMES e MAC DANIELS, 1947)

Os estômatos são do chamado tipo rubiáceo, com duas células anexas paralelas às células-guarda. Em corte transversal da epiderme abaxial, pode-se observar que os estômatos são protrusos (Fig. 3,A).

As paredes das células-guarda são mais espessas na região mediana (Fig. 3,A,C).

Nas regiões de contacto com a células anexas, as paredes das células-guarda são delgadas apenas nas extremidades (Fig. 3,B,C), ao passo que na região mediana elas são muito mais espessas (Fig. 3,A).

A cutícula é muito delgada e não adere perfeitamente à epiderme, deixando espaços subcuticulares, geralmente nas regiões intercelulares.

DISCUSSÃO

A estrutura do folíolo de *S. nilotica* mostra um mesofilo heterobárico (RAWITSCHER e FERRI, 1942): os clorênquimas permanecem confinados em câmaras mesofílicas separadas por tabiques fibrovasculares, impermeáveis a gases e vapores. O ar, o CO₂ e o vapor de água não passam de uma câmara a outra em estado de gases, mas somente quando dissolvidos em água. Por conseguinte, as câmaras mesofílicas só mantêm intercâmbio de gases com o exterior, através dos estômatos. Se duas câmaras A e B, por exemplo

(Fig. 1), são contíguas e se A tem mais estômatos que B, ou se os estômatos de A se abrem mais, ou mais rapidamente que os de B, ou ainda, se em B se deposita uma gotícula de água sobre a epiderme, haverá maior saída de vapor de A do que de B, considerando-se a tensão do vapor à superfície da epiderme idêntica para ambas as câmaras. Estabelece-se então, uma diferença de pressões entre as duas câmaras, o que provoca a translocação da água líquida das câmaras contíguas para A, através dos tabiques fibrovasculares. Esta água, ao chegar à câmara de menor pressão, passará ao estado de vapor, restabelecendo o equilíbrio. Nas folhas homobáricas, isto é, naquelas em que as nervuras não formam câmaras fechadas por tabiques fibrovasculares, o restabelecimento do equilíbrio de pressões nas diversas partes do mesofilo é rápido, por correntes de difusão de vapor, através dos espaços intercelulares.

Em condições de alta evaporação, pode haver rápida saída de vapor das câmaras mesofilares, em quantidades diferentes, ocasionando grandes diferenças de pressão entre elas, e, por conseguinte, diferentes tensões de sucção que não poderão ser equilibradas, com rapidez suficiente, pelo afluxo de água líquida através dos tabiques fibrovasculares. Pode, então, resultar a desidratação das células mesofilares e epidérmicas. As altas diferenças de pressão nas câmaras e a maior desidratação das células mesofilares das câmaras de menor pressão podem provocar movimentos nos tabiques fibrovasculares, com reflexos nas epidermes. A desidratação das células epidérmicas, pela tensão de sucção dentro das câmaras, e pela perda de água para os espaços subcuticulares, também pode contribuir para um possível descolamento parcial da cutícula.

Em *S. nilotica*, a cutícula deixa espaços sub-cuticulares, sendo colada às paredes externas das células epidérmicas apenas na região mediana dessas células (Fig. 3,v). Esta cutícula oferece, portanto, muito menor resistência ao descolamento que a do pulvino de *Musa* (Fig. 2,B), em que a cutícula é presa à epiderme apenas por pontos de fixação, encravados, como cavilhas (EAMES e MAC-DANIELS, 1947), nas regiões intercelulares. Assim, em *Musa*, o vapor de água que se acumula sob a cutícula pode translocar-se, por difusão, para outras regiões subcuticulares. Mas, em *S. nilotica* isto não se dá, porque o vapor fica preso nos

espaços subcuticulares, exercendo pressão sobre a cutícula. Como esta é colada às paredes epidérmicas apenas na região mediana das células, haverá, normalmente, uma tendência ao descolamento, quando em condições de alta evaporação.

Em resumo, o comportamento anômalo do folíolo de *S. nilotica*, quando sujeito a altas tensões de sucção, por perda de água por transpiração, poderia ser explicado da seguinte maneira: um folíolo cujo suprimento de água tenha

Fig. 5 — Detalhe da estrutura de um folíolo de *Spathodea nilotica*, mostrando a epiderme abaxial com estômatos e parte do parênquima lacunoso, com as câmaras subestomáticas: cut: cutícula; es: estômatos; an: célula anexa; cse: câmara subestomática; v: espaços subcuticulares; A — corte transversal na região mediana de um estômato; B — idem, na extremidade; C — corte longitudinal de uma célula-guarda.

sido interrompido, perde água através dos estômatos, muito rapidamente. Como o mesófilo é heterobárico, desenvolvem-se, nas câmaras mesofilares, altas diferenças de tensão, que podem provocar movimentos nos tabiques fibrovasculares, com reflexos nas epidermes. As células-guarda perdem água, tanto para as câmaras mesofilares como para o exterior, tendendo a fechar os estômatos. Mas, como as paredes das demais células epidérmicas são mais delgadas, estas perderão água mais rapidamente que aquelas. Em

consequência, a superfície total da epiderme diminuirá, por decréscimo em turgor, tendendo a afastar as células-guarda e, portanto, impedindo o fechamento estomático. Os estômatos, portanto, ao invés de se fecharem, abrir-se-ão. Esta última situação é configurada por DARWIN, citado por FRANCO e MAGALHÃES (1963).

A pressão do vapor nos espaços sub-cuticulares, a diminuição da superfície total da epiderme e os movimentos dos tabiques fibrovasculares formam um conjunto de forças tendentes a descolar a cutícula. Se a fôlha continuar a perder água, estas condições poderão atingir um clímax, isto é, por efeito dessas forças, a aderência da cutícula poderá ser rompida, nos pontos de maior tensão, resultando, imediatamente, um súbito acréscimo de desidratação na epiderme, o que poderá provocar o enrolamento brusco do folíolo.

Esta é apenas uma hipótese que deverá ser comprovada, ou não, mediante ulteriores investigações. •

SUMMARY

*The author describes some structural aspects of the leaflets of *Spathodea nilotica* Seem., an african bignoniacea cultivated in the State of São Paulo, for arborization of streets.*

The structure of the leaflets is studied from the point of view of its abnormal behaviour when in conditions of great loss of water by transpiration.

The leaflets are hypostomatic. The adaxial epidermis is glabrous and the abaxial one has big tricellular hairs in the regions of the veins. The stomata are protruse, located in the interfibrovascular regions of the epidermis. The mesophyll is heterobaric and has three layers of palisade parenchyma. The spongy parenchyma is compound of ellipsoidal cells in parallel moniliform rows, running from the palisade parenchyma to the abaxial epidermis. The cuticles is very thin and shows subcuticular spaces.

The author suggests that the presence of the subcuticular spaces allied to the heterobaric structure of the mesophyll may have influence in a possible partial detachment of the cuticle, when in conditions of great loss of water, which may provoke a sudden rolling up of the leaflet.

BIBLIOGRAFIA

- CAMARGO, P. N., S. F. BARCHA e O. F. CASTRO, 1966 — Balanço Hídrico de *Spathodea nilotica*, Seem. Anais da E.S.A. "Luiz de Queiroz", USP, Piracicaba, S. Paulo.
- EAMES, A. J. e L. H. MAC DANIELS, 1947 — An Introduction to Plant Anatomy. 2nd ed. Mc Graw Hill Book Co. New York.
- FRANCO, C. M. e A. C. MAGALHÃES, 1963 — Inconveniências do Método das Pesagens Rápidas para a Medida da Transpiração. *Phyton* 20 (2) 87-96, XI.
- RAWITSCHER, F. e M. G. FERRI, 1942 — Observações sobre a Metodologia para o Estudo de Transpiração Cuticular em Plantas Brasileiras, especialmente em *Cedrela fissilis*. Bol. Fac. Ciênc. e Letras. Botânica n.º 3, 115-136, Univ. São Paulo. S. Paulo, Brasil.