DISTROFIA MIOTÔNICA

ASPECTOS CLÍNICO-LABORATORIAIS EM 19 CASOS

MILBERTO SCAFF *

ANA MARIA C. TSANACLIS **

JOSÉ ANTONIO LEVY ***

A distrofia miotônica ou doença de Steinert, é uma afecção de evolução progressiva, com caráter familiar (transmitida por um gen autossômico dominante com penetrância variável^{1, 5, 6, 17, 21}), caracterizada por miopatia distal, comprometimento de musculatura da face e pescoço, tendência à persistência da contração muscular com dificuldade para relaxamento (fenômeno miotônico), além de sinais de comprometimento sistêmico: calvície precoce, hiperostose interna da abóbada craniana localizada ou difusa, atrofia do córtex cerebral e substância branca subcortical, catarata, atrofia testicular, hipotireoidismo e alterações eletrocardiográficas^{11, 12}.

O propósito deste trabalho é apresentar alguns aspectos clínicos e laboratoriais desta afecção.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram estudados 19 pacientes examinados no período de 1967 a 1973. Dados de identificação são apresentados na tabela 1. Os pacientes M. C. S., D. S. e S. A. S. (casos 1, 2 e 3, respectivamente) são elementos de uma mesma família, sendo M. C. S. a mãe dos outros dois pacientes. A paciente J. Q. N. (caso 7) é mãe do paciente R. K. N. (caso 17). A paciente J. M. N. (caso 16) é irmão do paciente J. M. N. (caso 17).

O diagnóstico foi estabelecido por dados de anamnese, exame clínico geral e neurológico, eletromiografia e biópsia muscular. Foram realizados os seguintes exames: *a* — dosagem de transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) e glutâmico-pirúvica (TPG) pelo método de Reitman e Frankel com leitura espectrofotométrica; *b* — dosagem de creatinofosfoquinase (CPK) mediante o método 520C (Boletim Sigma nº 520/80F); *c* — eletroforese de proteínas séricas, pelo método de cromatografia em papel¹⁸; *d* — imuno-eletroforese das proteínas séricas — nos casos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 19 empregou-se o método de imunodifusão radial de Mancini & col., em placas de Partigen (Behringwerke A-G) em comparação com soro padrão Behringwerke A-G e, nos demais casos, foi usado o método de imunodifusão em gel de agar; *e* — eletrocardiograma; *f* — eletrencefalograma; *g* — radiografia simples de crânio; *h* — pneumencefalograma.

Trabalho realizado na Clínica Neurológica (Prof. H. M. Canelas) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: * Assistente; ** Residente; *** Docente-Livre.

RESULTADOS

1 — *Idade de início da doença, sexo e cor* (Tabela 1) — A idade de início da doença variou desde os primeiros meses de vida (casos 13 e 16) até uma idade máxima de 42 anos, sendo a média 22,86 anos. Com relação ao sexo, 12 pacientes eram do sexo masculino e 7 do feminino, numa proporção aproximada de 2/1. Com relação à cor, dois pacientes (10,52%) eram pretos e os demais brancos (89,48%).

Caso	Paciente	Registro	Idade de início	Sexo	Cor
1	M. C. S.	969548	37	F	B
2	D. S.	969555	14	M	B
3	S. A. S.	740654	N	F	B
4	J. A.	891456	42	M	B
5	N. G. P.	918001	35	F	B
6	G. R.	489783	33	M	B
7	J. Q. N.	823902	20	F	B
8	R. K. N.	806484	N	M	B
9	O. A. F.	741861	13	M	B
10	A. T. M.	999150	22	F	B
11	B. P. S.	526603	29	M	B
12	E. D. S.	579987	30	F	B
13	J. J. S. S.	1027377	15	M	B
14	B. E.	939713	27	M	B
15	C. A. B. M.	779478	27	M	B
16	J. M. N.	928351	35	F	P
17	J. M. N.	897859	24	M	P
18	F. M.	913654	14	M	B
19	M. J. D.	1051145	17	M	B

Tabela 1 — *Dados de identificação dos pacientes estudados. Legenda: F = feminino; M = masculino; B = branca; P = preta; Idade em anos; N = nascimento.*

2 — *Enzimas séricas* (Tabela 2) — *a* — TGO (dados de 17 pacientes) mostrou-se normal em 12 casos (70,58%); nos restantes, com exceção do caso 4, houve aumento relativamente pequeno (29,42%); *b* — TGP — (dados de 14 pacientes): normal em 10 casos (71,42%), sendo que nos demais, com exceção dos casos 4 e 19, o aumento foi pequeno; *c* — CPK — (dados de 6 pacientes): apenas um mostrou níveis elevados (16,66%), sendo normal nos restantes (73,33%).

3 — *Proteinograma* (Tabela 3) — Estudo feito em 13 pacientes permitiu as seguintes conclusões: proteínas totais em níveis abaixo do limite inferior da normalidade em um caso (7,69%), acima do normal em um caso, normal nos restantes (84,61%); albumina normal em três casos (23,07%) e níveis baixos nos restantes (76,92%); globulina alfa-1 normal em 6 casos (46,15%), abaixo do normal em dois casos (25,38%) e acima do normal em 5 casos (38,46%); globulina alfa-2 normal em 7 casos (53,84%) e acima do normal em 6 casos (46,15%); globulina beta normal em 6 casos (46,15%) e acima do normal em 7 casos (53,84%); globulina gama normal em 9 casos (69,23%), abaixo do normal em um caso (7,69%) e acima do normal em três casos (23,07%).

4 — *Imunoelektroforese de proteínas do soro* (Tabela 3) — Exame feito em 16 casos mostrou IgA normal em 11 casos (61,25%), aumentada em três casos (18,75%) e diminuída em dois casos (12,50%); IgM normal em 7 casos (43,75%),

Caso	TGO	TPG	CPK
1	23	22	8
2	46	22	10
3	27	10	12
4	128	180	—
5	37	—	—
6	10	22	8
7	15	14	1
8	—	—	—
9	18	16	—
10	18	20	—
11	39	35	8,5
12	35	25	—
13	45	34	—
14	—	—	—
15	40	18	—
16	23	—	—
17	44	27	36
18	17	—	—
19	41	83	—

Tabela 2 — Resultado das dosagens de transaminases glutâmico-oxalacética (TGO) e glutâmico-pirúvica (TPG) e da fosfocreatinoquinase (CPK). Valores normais para o método TGO 8-40 unidades Frankel em 1ml de soro; TPG 5-30 unidades Frankel em 1ml de soro; CPK valores normais 0-12 unidade sigma.

Caso	Eletróforese *						Imunoeletróforese		
	Proteínas Albumina		Globulinas				IgA	IgM	IgG
			Alfa 1	Alfa 2	Beta	Gama			
1	6,1	3,38	0,18	0,49	0,73	1,28	A	N	N
2	7,3	4,16	0,75	0,77	1,10	0,95	N	N	A
3	6,5	4,22	0,26	0,52	0,72	0,72	D	D	D
4	7,4	3,42	0,55	0,89	1,14	1,40	N	A	N
5	7,4	3,38	0,50	0,89	1,14	1,49	N	A	N
6	7,5	3,63	0,47	0,60	0,89	1,91	A	A	D
7	—	—	—	—	—	—	N	A	D
8	—	—	—	—	—	—	A	N	A
9	8,5	4,60	0,20	1,10	1,00	1,60	N	A	A
10	—	—	—	—	—	—	D	A	N
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	5,50	2,70	0,20	0,70	0,70	1,20	N	N	D
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	6,40	3,80	0,10	0,60	0,90	1,00	N	D	N
15	6,10	3,23	0,40	0,57	0,95	0,95	N	D	D
16	7,00	2,87	0,63	0,72	1,06	1,72	N	N	D
17	7,50	2,89	0,65	0,91	1,03	2,02	N	N	D
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	6,50	3,94	0,37	0,51	0,85	0,84	N	N	A

*Tabela 3 — Eletróforese e imunoeletróforese das proteínas séricas. Legenda: A = aumentado; D = diminuído; N = normal; * Os resultados são fornecidos em g/100ml.*

aumentada em 6 casos (37,50%) e diminuída em três casos (18,75%); IgG normal em 5 casos (31,25%), aumentada em 4 casos (25,00%) e diminuída em 7 casos (43,75%). Embora o método de imunodifusão radial forneça dados quantitativos, os resultados são apresentados na Tabela 3 em forma qualitativa, pois, como os valores normais para determinada dosagem variam de acordo com o soro padrão usado, a apresentação dos dados reais dificultaria a leitura da tabela.

5 — *Eletrocardiograma* (Tabela 4) — Realizado em 16 pacientes, forneceu os seguintes dados: normal em 5 casos (31,25%), hemibloqueio anterior esquerdo ou direito em 6 casos (37,50%) e outras alterações em 5 casos (31,25%).

Caso	Eletrocardiograma
1	Hemibloqueio anterior superior esquerdo.
2	Ritmo sinusal com extrassístoles supra-ventriculares, hemibloqueio anterior superior esquerdo.
3	Taquicardia sinusal. Provável sobrecarga ventricular direita.
4	Normal.
5	Hemibloqueio anterior esquerdo. Bloqueio de ramo direito.
6	Aumento da voltagem de T em todo o traçado.
7	Taquicardia sinusal. Sobrecarga ventricular esquerda.
8	Hemibloqueio anterior esquerdo. Provável sobrecarga de câmara esquerda.
9	Provável sobrecarga ventricular esquerda.
11	Normal.
13	Hemibloqueio anterior esquerdo.
14	Dentro dos limites normais.
16	Normal.
17	Normal.
18	Distúrbios da condução intra-ventricular.
19	Sobrecarga ventricular esquerda. Sobrecarga atrial direita. Hemibloqueio anterior esquerdo.

Tabela 4 — Resultados do eletrocardiograma em 16 casos.

6 — *Eletromiografia* — O estudo foi realizado em 19 pacientes. Somente no caso 11 não houve registro de fenômeno miotônico.

7 — *Eletrencefalografia* — Realizada em 9 pacientes, foi normal em 7. No caso 13 encontramos moderada desorganização da atividade elétrica cerebral nas regiões fronto-temporais, predominando à esquerda; no caso 14 encontramos anormalidade paroxística nas regiões fronto-temporais, predominando ora à esquerda ora à direita (ondas lentas de média e elevada voltagem).

8 — *Pneumencefalografia* (Tabela 5) — Feita em 14 pacientes, foi normal em três (21,42%), mostrou atrofia subcortical em 10 (71,43%) e em um caso (7,14%) não houve contrastação do sistema subaracnoideu periencefálico.

DISCUSSÃO

Idade de início da moléstia — A idade de início da doença está na dependência da variação na penetrância do gene e sua manifestação diferente

Caso	Craniograma	Pneumencefalograma
1	Diminuição da diploe ao nível das regiões parietais, com osteoporose difusa. Seios frontais hiperpneumatizados.	Ausência de dilatação ventricular, alargamento do espaço subaracnoideu com especial acúmulo de ar ao nível da cistura de Silvius.
2	Sem alterações ósseas.	Dilatação dos ventrículos. Quadro de atrofia subcortical.
3	Sem alterações ósseas.	Dilatação dos ventrículos. Quadro de atrofia subcortical.
4	Hiperplasia dos seios frontais.	Normal.
5	—	Ventrículos assimétricos, sendo o direito maior que o esquerdo, discretamente dilatado.
6	Hiperostose difusa da tábua interna frontal.	Ventrículos laterais de volume moderadamente aumentado na região frontal.
7	—	Normal.
8	Sem alterações ósseas.	Ventrículos de volume normal.
9	Sem alterações ósseas.	Ventrículos de volume discretamente aumentado. Sulcos cerebrais moderadamente alargados.
10	Sem alterações ósseas.	Ventrículos de volume discretamente aumentado. Sulcos cerebrais moderadamente alargados.
11	Apice da odontoide ultrapassando as linhas de Chamberlain e McGregor.	—
12	Espessamento das tábuas ósseas da calota craniana.	Sulcos cerebrais moderadamente alargados.
13	—	—
14	Espessamento difuso da diploe, hiperostose homogênea na região frontal.	Ventrículos de volume aumentado.
15	Hiperostose difusa das tábuas ósseas do crânio.	—
16	Hiperostose da tábua interna da região frontal.	Não houve contrastação do espaço subaracnoideu periencefálico.
17	Normal.	Normal.
18	Hiperostose da tábua interna da região parietal esquerda.	—
19	Normal.	—

Tabela 5 — Resultado dos cranogramas e pneumencefalogramas.

nas gerações sucessivas⁸, explicando a faixa etária tão extensa da nossa casuística. Dyken & Harpers⁵ relataram os casos de dois pacientes com forma congênita de distrofia miotônica, cujas mães haviam iniciado a doença em idade mais tardia — o mesmo ocorreu nos casos 3 e 8 (forma congênita) e suas respectivas mães, casos 1 e 7 de nossa casuística.

Proteinograma — Wochner²⁰ e Hariga & col.⁹ decreram hipogamaglobulinemia, hipoalbuminemia e aumento das globulinas alfa-2 nos pacientes por eles estudados. Lowenthal & van Sande¹⁴ observaram também aumento da fração beta. Em nosso estudo, observamos hipoalbuminemia em 76,92% dos casos e aumento da fração globulina alfa-2 em 46,15%. Quanto à fração gama, nossos resultados não coincidiram com os dados de literatura, pois um caso apenas mostrou hipogamaglobulinemia.

Imunoelektroforese de proteínas — Watters & Williams¹⁹ estudaram 5 famílias com doença de Steinert e encontraram níveis de IgG significativamente baixos em adultos afetados, se comparados com adultos normais. Tal baixa deve-se a um catabolismo excessivo das IgG nestes pacientes^{10,20}. Bunday & col.² notaram que as frações IgM e IgA também estão diminuídas em alguns pacientes. Na presente casuística, o estudo imunoelektroforético evidenciou níveis baixos de IgG em 43,75%, de IgM em 18,75% e de IgA em 12,50% dos casos. As demais alterações por nós encontradas não obedecem a um padrão definido e estão, até certo ponto, em desacordo com os dados de literatura.

Eletrocardiograma — Serratrice e Roux¹⁶ afirmam que 60-70% dos pacientes com distrofia miotônica mostram algum tipo de alteração eletrocardiográfica; De Wind & Jones⁴ encontraram ondas P diminuídas, intervalo P-R alargado, condução intraventricular prolongada, elevação do segmento S-T, e chegam à conclusão de que o próprio miocárdio estaria envolvido pelo mesmo processo que afeta o músculo esquelético. Fisch⁷ notou alterações cardíacas em 5 de seus 6 pacientes. Goodman⁸ encontrou anormalidades várias: P-R alargado, bloqueio de ramo direito e esquerdo, complexos QRS entalhados, elevação do espaço S-T, depressão das ondas T e disritmias.

Em nossos casos, a maior parte das anormalidades foi do tipo hemibloqueio anterior esquerdo ou direito e distúrbios do ritmo, tipo taquicardia sinusal, isto é, alterações, de maneira geral, coincidentes com aquelas relatadas por Goodman. A percentagem de doentes com alterações eletrocardiográficas caiu dentro da faixa esperada.

Radiografia de crânio — Serratrice e Roux¹⁶ referem que 50% dos casos aproximadamente mostram hiperostose difusa ou frontal interna do tipo Morgagni-Morel e, que, nos pacientes acima de 40 anos, pode-se encontrar espessamento da tábua óssea; são descritos, ainda, segundo estes autores, hipoplasia de sela túrcica, hiperpneumatização dos seios frontais e outras disostoses cranianas. Como os de Caughey³, os nossos achados mostram-se semelhantes aos acima referidos.

Pneumencefalograma — Estudos pneumencefalográficos mostraram que grande percentagem de doentes apresenta alargamento dos ventrículos cerebrais¹³. Refsum & col.¹⁵ encontraram alargamento progressivo dos ventrículos cerebrais em 5 de seus 10 casos; este mesmo autor sugere que deve haver uma degeneração cerebral lentamente progressiva durante a vida dos pacientes. Em nossos casos, 78,57% apresentaram sinais de dilatação ventricular e/ou alargamento dos sulcos cerebrais.

RESUMO

São relatados os casos de 19 pacientes com distrofia miotônica. São discutidos alguns aspectos clínicos e para-clínicos da doença: eletroforese e imunoeletroforese de proteínas do sêro, eletrocardiograma, eletrencefalograma, radiografia de crânio e pneumencefalograma. Os resultados apresentados foram comparados àqueles da literatura.

SUMMARY

Myotonic dystrophy: some clinical and laboratorial data in 19 cases

Some clinical and laboratorial data in 19 patients with myotonic dystrophy are reported. The results of electrophoresis of serum proteins, X-ray of skull, pneumoencephalogramm and electromyogramm are similar to those reported by other authors. Electrocardiographic studies disclosed: left or right anterior hemiblock in 37,50% of the patients; rythm disturbances in 12,50%, and other alterations included supra-ventricular extrassystoles, right branck block and disturbances in intra-ventricular conduction. The results of serum protein immuno-electrophoresis were as follows: IgA — normal in 61,25%, increased in 18,75% and decreased in 12,50%; IgM — normal in 43,75%, increased in 37,50% and decreased in 18,75%; IgG — normal in 31,25%, increased in 25% and decreased in 43,75%. Abnormalities of immunoglobulins were found to be mainly in IgG fractions, but also in IgA and IgM. Although IgC was significantly decreased in our patients we found other abnormalities of immunoglobulins with no definite pattern.

REFERÊNCIAS

1. ADAMS, R. D.; DENNY-BROWN, D. & PEARSON, C. M. — Diseases of Muscle. 2nd Ed. Harper & Brithers, New York, 1962.
2. BUNDEY, S.; CARTER, C. O. & SOOTHILL, J. F. — Early recognition of heterozygotes for the gene for dystrophía myotónica. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 33:279, 1970.
3. CAUGHEY, J. E. — Radiological changes in the skull in dystrophía myotónica. J. Bone. Jt. 34b:343, 1952.
4. DeWIND, L. T. & JONES, R. J. — Cardiovascular observations in dystrophía myotónica. JAMA 144:299, 1950.
5. DYKEN, P. R. & HARPER, P. S. — Congenital dystrophía myotónica. Neurology (Minneapolis) 23:465, 1973.
6. FLEISCHER, B. — Ueber myotonischen Dystrophie. Muench. med. Wschr. 64: 1630, 1917.
7. FISCH, C. — The heart in dystrophía myotónica. Am. Heart. J. 41:522, 1951.
8. GOODMAN, R. M. — Genetic Disorders of Man. Little Brown Co., Boston, 1970, pág. 215.
9. HARRIGA, J.; MATTHYS, ET.; MECHLER, L. & JONCKHEER, B. — Sur certains aspects cliniques et génétiques de la myotonie atrophique. Acta Neurol. Bélgica 69:215, 1969.
10. JENSEN, J.; JENSEN, K. B. & JARNUM, S. — Turnover of IgM in myotonic dystrophy. Neurology (Minneapolis) 21: 68, 1971.
11. JUBERT-GRUART, J. — Enfermedad de Steinert. In Enfermedades Musculares — J. M. Espadaler; M. Balcells & Jubert. Salvat, Barcelona, 1971.

12. JULIAO, O. F. & MELARAGNO FILHO, R. — Distrofia muscular familiar: a propósito de 3 casos de moléstia de Steinert. Arq. Neuro-Psiquiat. (São Paulo) 1:101, 1943.
13. KLEIN, D. — La dystrophie myotonique (Steinert) et la myotonie congénitale (Thomsen) em Suisse. J. Genét. Hum. Suppl. 7: 368, 1958.
14. LOWENTHAL, A. & VAN SANDE, M. — Nouvelles déterminations des fractions protéiniques dans le sérum des patients atteints d'affections musculaires. Rev. Franç. Etud. Clin. Biol. 1: 766, 1956.
15. REFSUM, S. & IÖNNUM, A. — Dystrophia myotonica: repeated pneumoencephalic studies in ten patients. Neurology (Minneapolis) 17: 345, 1967.
16. SERRATRICE, G. & ROUX, H. — Leçons de Pathologie Musculaire. Librairie Maloine S.A., Paris, 1968.
17. SILVA, J. B. & BARBIERI, T. A. — Distrofia miotônica: análise clínico-genética de uma família. Arq. Neuro-Psiquiat. (São Paulo) 28:65, 1970.
18. SPINA-FRANÇA, A. — Eletroforese em papel das proteínas do líquido cefalorraquidiano: III Técnica. Arq. Neuro-Psiquiat. (São Paulo) 16:236, 1958.
19. WATTERS, G. V. & WILLIAMS, T. W. — Early onset myotonic dystrophy. Clinical and laboratory findings in five families and a review of the literature. Arch. Neurol. (Chicago) 17: 137, 1967.
20. WOCHNER, R. D.; DREWS, G.; STROBER, W. & WALDMANN, T. A. — Accelerated breakdown of immunoglobulin G (IgG) in myotonic dystrophy: a hereditary error of immunoglobulin catabolism. J. Clin. Invest. 45: 321, 1966.
21. ZELLWEGER, H. & IONASESCU, V. — Myotonic dystrophy and its differential diagnosis. Acta Neurol. Scandinavica Suppl. 55, 49: 1973.

*Clinica Neurológica — Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
— Caixa Postal 3461 — 01000 São Paulo, SP — Brasil.*