Doses de nitrogênio na produção de couve-da-Malásia

Luiz Antônio Zanão Júnior¹; Regina Maria Q. Lana¹; Marli A. Ranal²

UFU, ¹Instituto de Ciências Agrárias, ² Instituto de Biologia, C. Postal 593, 38400-902 Uberlândia-MG; E-mail: luizantoniozanao@agro.ufu.br

RESUMO

É recomendável que a introdução de uma cultura em uma região passe por avaliações prévias que demonstrem a produtividade das plantas nas condições edafo-climáticas do local, bem como suas exigências nutricionais. Isto vem sendo feito com *Brassica chinensis* var. *parachinensis*, introduzida no Brasil, município de Uberlândia, em 1992. Avaliou-se o efeito de doses de nitrogênio na produtividade e na acumulação de nutrientes na parte aérea das plantas, em experimento em delineamento de blocos casualizados, com cinco tratamentos incluindo quatro doses de N (105; 210; 315 e 420 kg ha⁻¹) e a testemunha sem N, e quatro repetições. O nitrogênio foi aplicado parceladamente, sendo 30% da respectiva dose na semeadura, 35% aos 15 e 35% aos 30 dias após a semeadura. Foram avaliados massa fresca e seca da parte aérea e das raízes, número de folhas, diâmetro do caule e acumulação de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn pela parte aérea de plantas cultivadas em casa de vegetação, em vasos de 5 dm³ contendo Latossolo Vermelho Distrófico típico. A couve-da-Malásia respondeu significativamente à aplicação de nitrogênio, sendo o maior crescimento, a maior produtividade e absorção de nutrientes registrados na dose de 210 kg ha⁻¹, exceto o N, Mn e Zn que aumentaram linearmente.

Palavras-chave: *Brassica chinensis* L. var. *parachinensis* (Bailey) Sinskaja, “tsoi sum”, adubação nitrogenada.

ABSTRACT

Nitrogen doses in the flowering white cabbage yield

It is recommendable that the introduction of a new culture in a region be previously evaluated in the yield and nutrition aspects under local soil and climatic conditions. Thus, since 1992 when *Brassica chinensis* L. var. *parachinensis* was introduced in Brazil, this variety has been studied by Brazilian researchers. The experiment was conducted in a greenhouse, in randomized blocks, with five treatments and four replicates, including four doses of nitrogen (105; 210; 315 and 420 kg ha⁻¹) and the control treatment to evaluate the effect of nitrogen doses on the yield and the accumulation of nutrients by plants of this variety. Plants were planted in pots of 5 dm³ containing a Red Latosol dystrophic soil. The nitrogen was applied three times, when sowing (30%), at 15 and at 30 days after sowing (35 + 35%). Fresh and dry mass of the aerial part and roots of the plants, number of leaves, stem diameter, and the accumulation of N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, and Zn by aerial part of the plants were evaluated. The best dose of nitrogen was 210 kg ha⁻¹, where the highest yield and nutrient absorption were registered, except N, Mn, and Zn that increased linearly.

Keywords: *Brassica chinensis* L. var. *parachinensis* (Bailey) Sinskaja, “tsoi sum”, nitrogen fertilization.

(Recebido para publicação em 18 de fevereiro de 2004 e aceito em 16 de novembro de 2004)

Brassica chinensis L. var. *parachinensis* (Bailey) Sinskaja (Bailey, 1930) é uma das mais saborosas couves chinesas (Herklots, 1972); não forma cabeça (Opeña *et al.*, 1988), é de ciclo curto (Lee, 1982; Ferreira *et al.*, 2002) e própria para o consumo de folhas, flores e caules (Herklots, 1972). Nativa da China, tem sido extensivamente cultivada no sudeste asiático e Austrália (Bailey, 1930; Herklots, 1972; Lee, 1982; Hill, 1990). Segundo Opeña *et al.* (1988), sua popularidade tem aumentado entre os povos não orientais nos últimos anos, sendo conhecida como “mock pak-choi” (Bailey, 1930), “flowering white cabbage”, “paak ts’oi sum” (Herklots, 1972; Opeña *et al.*, 1988), “tsoi sum” (Opeña *et al.*, 1988; Hill, 1990) e couve-da-Malásia, denominação esta adotada no Brasil por Warwick E. Kerr que a introduziu no País em 1992, a partir de sementes trazidas da Malásia, em função do seu alto teor de vitamina A.

As couves chinesas têm se destacado na alimentação humana por influência desse povo, cujo consumo é de 500 g por pessoa, por dia, consumo este muito maior do que o registrado nos EUA e Europa (Lee, 1982). Na China, em 1974-75, a produção dessa couve foi equivalente a 23% (= 95215 t) do total de vegetais produzidos, sendo ainda necessária a importação de mais 8%, o que mostra que naquele país esta variedade é comercialmente atrativa em função da alta demanda (Yip *et al.*, 1976).

Em 1992 foram feitos os primeiros experimentos com a variedade no município de Uberlândia. Em setembro desse ano, sementes produzidas no município apresentaram alta germinabilidade em condições de laboratório (99,6%), tanto na luz como no escuro (Ferreira e Ranal, 1999). Em condições de campo suas plântulas emergiram entre dois e três dias, de 0,5 a 1,5 cm de profundidade, alcançando 96% de emergência (Ferreira e Ranal, 1999).

No cultivo de março a junho de 1993, alcançou a maior produtividade agrônômica em espaçamento 30 x 10 cm, com adubação mineral (30 kg ha⁻¹ de nitrogênio no preparo do solo e 40 kg ha⁻¹ em cobertura, ambos aplicados como sulfato de amônio), sendo estimadas 21,5 t ha⁻¹ (Ferreira *et al.*, 2002), valor este incluído na faixa registrada para a China (16,3 a 28,8 t ha⁻¹, Yip *et al.*, 1976) e Malásia (11 a 20 t ha⁻¹, Idris e Abidin, 1987, citados por Hill, 1990). Na China, a maior produtividade foi alcançada em espaçamento 10 x 10 cm, com aplicação de 45, 90 e 135 kg ha⁻¹ de nitrogênio como sulfato de amônio (Yip *et al.*, 1976). Na Austrália, a maior produtividade (46,1 t ha⁻¹) também foi alcançada em cultivo adensado (10 x 10 cm), com 200 kg ha⁻¹ de nitrogênio como nitrato de amônio, sendo que em espaçamentos maiores, 30 x 30 e 20 x 20 cm, as produtividades máximas foram de aproximadamente 6 e 19 t ha⁻¹ respectivamente, com 100 kg ha⁻¹ de

nitrogênio (Hill, 1990). Segundo Trani *et al.* (1994), dentre as hortaliças, as brássicas apresentam grande capacidade de resposta a esse nutriente, verificando-se aumentos na produtividade com aplicações crescentes de N, até 300 kg ha⁻¹.

No Brasil, pouco se conhece sobre as exigências nutricionais dessa variedade, sendo as recomendações de adubação para seu cultivo feitas, até o momento, com base nas recomendações para hortaliças folhosas como a alface. Sabe-se que plantas dessa variedade são altamente sensíveis à falta de nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre (Sousa, 1997) e boro (Mota, 2001).

Para dar suporte teórico à produção brasileira dessa variedade em escala comercial, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a resposta da cultura a diferentes doses de nitrogênio.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em vasos de 5 dm³, mantidos em espaçamento de 20 x 20 cm, em área da UFU. A temperatura média das mínimas na casa de vegetação, durante o período em que o experimento foi conduzido, foi de 21,3°C e a média das máximas de 29,2°C.

Utilizou-se solo da camada superficial (0 a 20 cm) de um Latossolo Vermelho Distrófico típico, textura média, com pH H₂O (1:2,5) = 5,2; P (Mehlich-1) = 16,5 mg dm⁻³; K⁺ (Mehlich-1) = 37,8 mg dm⁻³; Al³⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, H+Al = 0,2; 0,6; 0,1 e 3,2 cmol_c dm⁻³, respectivamente; saturação por bases = 19%, matéria orgânica = 1,4 dag kg⁻¹; B, Cu, Fe, Mn, Zn e S-SO₄⁻² = 0,24; 0,7; 55; 9,1 e 6,0 mg dm⁻³, respectivamente. A análise do solo foi feita segundo metodologia descrita por Silva *et al.* (1999).

Foram avaliados o tratamento controle (solo sem adição de nitrogênio) e quatro doses de nitrogênio (105; 210; 315 e 420 kg ha⁻¹), em delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições. O preparo do solo foi feito para cada vaso. A calagem foi realizada para elevar a saturação por bases a 70%, conforme recomendação feita por Ribeiro *et al.* (1999) para a cultura da alface, aplicando-se 2,0 t ha⁻¹ de

calcário dolomítico calcinado (PRNT 100%). O solo dos vasos foi incubado por 30 dias.

A semeadura foi realizada no dia 03/01/2003, a 1 cm de profundidade, com cinco sementes por vaso. Após a emergência, realizou-se o desbaste, deixando-se uma planta por vaso, a mais vigorosa e centralizada. A irrigação foi feita duas vezes ao dia, colocando-se 100 ml de água por vaso em cada período. Na semeadura, foram aplicados 400 kg ha⁻¹ de P₂O₅ e 60 kg ha⁻¹ de K₂O. As doses também seguiram as recomendações feitas para a cultura da alface (Ribeiro *et al.*, 1999). Como a couve-da-Malásia é muito responsiva à aplicação de boro (Mota, 2001), aplicou-se 1 kg ha⁻¹ deste micronutriente, na forma de bórax. Os fertilizantes foram aplicados misturados ao solo dos vasos no momento da semeadura. A quantidade de nitrogênio foi parcelada em três épocas, sendo aplicados 30% da dose total na semeadura, juntamente com os demais fertilizantes, 35% aos 15 e aos 30 dias após a semeadura, ambas em cobertura. Em cada cobertura com nitrogênio, aplicou-se também 50 kg ha⁻¹ de K₂O, totalizando 160 kg ha⁻¹. O sulfato de amônio foi empregado como fonte de N, o superfosfato triplo como fonte de P₂O₅ e como fonte de K₂O o cloreto de potássio.

A colheita foi realizada 45 dias após a semeadura, para avaliação da massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), número de folhas (NF), massa fresca de raízes (MFR), massa seca de raízes (MSR), diâmetro do caule (DC), teores e acumulação dos macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) e micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn e Zn) pela parte aérea das plantas. O número de folhas foi obtido fazendo-se a contagem das mesmas no momento da avaliação da massa fresca da parte aérea.

As plantas foram retiradas com o solo aderido às suas raízes, de modo a não danificá-las e ocorrer perda de parte do sistema radicular. Posteriormente, o sistema radicular foi separado da parte aérea. As raízes foram lavadas cuidadosamente até a retirada do solo aderido às mesmas. O excesso de água foi retirado com o auxílio de papel toalha e em seguida o material foi avaliado quan-

to à massa. O diâmetro do caule foi medido com o auxílio de um paquímetro. As matérias secas da parte aérea e de raízes foram obtidas secando-se as respectivas partes em estufa de circulação forçada de ar a 70°C, até massa constante. A análise química da parte aérea das plantas, para determinação do teor de macronutrientes e micronutrientes, foi feita com base na metodologia recomendada por Bataglia *et al.* (1985).

O acúmulo de macronutrientes e micronutrientes (µg planta⁻¹ e mg planta⁻¹, respectivamente) foi obtido pelo produto entre a massa da matéria seca e o teor destes nutrientes na parte aérea das plantas (g kg⁻¹ e mg kg⁻¹, respectivamente).

Os dados obtidos foram inicialmente submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade (Levene), para se determinar, caso necessário, a transformação a ser adotada. Como as variâncias foram homogêneas entre os tratamentos e os resíduos da análise da variância apresentaram distribuição normal, nenhum deles foi transformado. O teste *F* a 5% de probabilidade foi utilizado para avaliar a significância das equações polinomiais, referentes aos efeitos das doses de nitrogênio aplicadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de regressão mostrou efeito significativo ($P \leq 0,05$) das doses de nitrogênio aplicadas, sobre a massa fresca e seca da parte aérea e raízes, número de folhas por planta, diâmetro do caule, acumulação de macronutrientes e de micronutrientes pela parte aérea, exceto boro. Observou-se resposta quadrática para massa fresca e seca da parte aérea e das raízes e para número de folhas por planta (Tabela 1), bem como para a acumulação de P, K, Ca, Mg, S, Fe e Cu (Figuras 1 e 2), e resposta linear para diâmetro de caule (Tabela 1) e acumulação de N, Mn e Zn pela parte aérea (Figuras 1 e 2).

Aos 45 dias após a emergência, a dose intermediária de nitrogênio (210 kg ha⁻¹), comparativamente à testemunha, propiciou o maior acúmulo dos macronutrientes pela parte aérea das plantas, exceto nitrogênio (Figura 1).

Tabela 1. Massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), massa fresca de raízes (MFR), massa seca de raízes (MSR), diâmetro do caule (DC) e número de folhas por planta (NF) da couve-da-Malásia, em função de diferentes doses de nitrogênio. Uberlândia, UFU, 2003.

N (kg ha ⁻¹)	MFPA (g planta ⁻¹)	MSPA (g planta ⁻¹)	MFR (g planta ⁻¹)	MSR (g planta ⁻¹)	DC (mm)	NF
0	41,34	6,95	4,27	0,495	9,05	9,75
105	89,97	9,71	5,99	1,077	16,58	14,00
210	114,55	13,01	8,42	1,277	17,20	17,50
315	112,63	12,39	6,86	0,853	18,00	14,50
420	111,40	12,00	6,02	0,780	19,79	13,90
Ajuste da regressão	Q*	Q*	Q*	Q*	L*	Q*
R ²	0,98	0,96	0,76	0,85	0,75	0,79
CV (%)	13,6	12,7	14,5	4,7	7,6	16,2

* Ajuste significativo a 5% de probabilidade pelo teste *F*; Q : ajuste quadrático; L : ajuste linear; CV: coeficiente de variação.

Figura 1. Acúmulo de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) pela parte aérea da couve-da-Malásia, em função de doses de nitrogênio. Uberlândia, UFU, 2003.

Com esta dose, a ordem de acumulação de macronutrientes foi $K > N > Ca > S > P > Mg$. Sousa (1997), estudando o efeito de macronutrientes na produtividade da couve-da-Malásia, verificou que esta foi bastante reduzida em plantas cultivadas na ausência de N, P, S e K. Segundo Furlani *et al.* (1978), as brássicas são mais responsivas ao N e P, mas são também exigentes em Ca e S e retiram do solo maiores quantidades de K e N. Segundo os autores, o nitrogênio favorece o acúmulo de nutrientes porque aumenta a produção de biomassa, estimulando o crescimento vegetativo e de raízes, o que resulta em maior absorção destes. Neste experimento, observou-se que o nitrogênio aumentou a acumulação dos demais nutrientes, até a dose de 210 kg ha⁻¹.

Em solo não adubado com nitrogênio, as plantas apresentaram sintomas visuais de deficiência semelhantes aos

descritos por Sousa (1997), quando esta brássica foi cultivada em solução nutritiva com omissão deste nutriente, como raquitismo das plantas, redução da área foliar e tonalidade verde-claro das folhas. O menor crescimento das plantas desse tratamento pode ser comprovado pelos dados apresentados na Tabela 1. Ao contrário, na dose de 420 kg ha⁻¹ de N, as folhas adquiriram tom verde mais escuro, o que pode estar evidenciando sintomas de toxicidade por excesso desse elemento.

A acumulação linear de zinco e manganês pode estar relacionada à maior absorção e translocação destes nutrientes, em relação aos demais, provavelmente devido à adubação nitrogenada, que pode causar acidificação da rizosfera, provocada pela nitrificação ou pela absorção do íon amônio. A acidificação da rizosfera, segundo Moraghan e Mascagni (1991),

aumenta a eficiência na absorção de micronutrientes metálicos.

A ordem de acumulação de micronutrientes, quando da utilização da melhor dose de nitrogênio, foi $Fe > Mn > Zn > B > Cu$ (Figura 2). Este último geralmente é encontrado em quantidades muito baixas no solo e na matéria seca das plantas (Ferreira e Cruz, 1991). Segundo Castellane *et al.* (1991), esta é a ordem de acumulação de micronutrientes pelas plantas olerícolas em geral. No entanto, Mota (2001) registrou para esta mesma variedade, maior absorção de boro e depois do zinco. Para os demais micronutrientes, a ordem registrada pelo autor foi a mesma.

Pode-se estimar que com 210 kg ha⁻¹ de N, uma população de 333.333 plantas de couve-da-Malásia por hectare é capaz de remover do solo, em kg ha⁻¹, 112,34 de N; 11,9 de P; 134,8 de K; 94,8 de Ca; 11,4 de Mg e 24,8 de S e em g ha⁻¹, 440 de B; 160 de Cu; 4700 de Fe; 9400 de Mn e 1900 de Zn. Essas estimativas são muito superiores às calculadas para a couve-flor (Kimoto, 1993), o que confirma a alta capacidade de extração de nutrientes do solo pelas brássicas.

Os teores de N, Fe e Zn na parte aérea da couve-da-Malásia aumentaram com o aumento das doses de N e os teores dos demais nutrientes diminuíram a partir da dose de 105 kg ha⁻¹ (Tabela 2). A diminuição do teor destes nutrientes pode estar relacionada com o aumento da matéria seca da parte aérea que, na nutrição de plantas, se denomina efeito de diluição.

As produções de massa fresca e seca da parte aérea foram semelhantes para as doses de 210; 315 e 420 kg ha⁻¹ de N (Tabela 1). Isto é explicado pelo fato de que o número de folhas alcançado com 210 kg ha⁻¹ de N foi superior às demais doses. No entanto, o diâmetro do caule alcançado com 315 e 420 kg ha⁻¹ de N foi superior aos demais tratamentos, o que conferiu às plantas massas equivalentes nestas três doses.

A produção de massa fresca da parte aérea (produtividade agrônômica) alcançada neste experimento com as três maiores doses de nitrogênio foi superior à máxima produção obtida por Ferreira *et al.* (2002), quando estudaram

a mesma variedade em Uberlândia, em condições de campo, com adubação orgânica e mineral em diferentes espaçamentos (93 g planta⁻¹), utilizando 70 kg ha⁻¹ de N e por Dantas (1997), com aplicação de metanol e 80 kg ha⁻¹ de N em vasos mantidos em casa de vegetação (52 g planta⁻¹). A produção registrada no presente trabalho também foi superior à obtida por Hill (1990), em espaçamento 10 x 10 cm, com aplicação de 200 kg ha⁻¹ de N (46 g planta⁻¹), em cultivo realizado em campo na Austrália. Esses resultados mostram que o nitrogênio é fator limitante para a produtividade agrônômica dessa variedade.

O maior valor de massa seca de raízes foi registrado para a dose de 210 kg ha⁻¹ de N (1,28 g planta⁻¹). Esta produção foi inferior à obtida por Sousa (1997) e superior à encontrada por Mota (2001), que foram de 2,84 g planta⁻¹ e 0,93 g planta⁻¹, respectivamente. É importante destacar que ambos os autores utilizaram areia lavada como substrato, contida em sacos para mudas com capacidade para 3 litros, com regas efetuadas com solução nutritiva contendo macronutrientes e micronutrientes.

A dose de 210 kg ha⁻¹ de N resultou em maiores valores para todas as características agrônômicas avaliadas, exceto diâmetro de caule, o que é positivo para sua aceitação no mercado de hortaliças (Tabela 1). Segundo Gallacher (1999), um produto de qualidade elevada tem diâmetro de caule entre 15 mm e 25 mm. Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que, com aplicações de nitrogênio, todas as plantas ficaram incluídas dentro dessa amplitude.

O aumento de nitrogênio no solo, acima de 210 kg ha⁻¹, demonstrou efeito negativo sobre a produtividade da cultura, sendo registrados 20,6% de redução no número máximo de folhas, na dose de 420 kg ha⁻¹ de N. Os resultados mostram que a couve-da-Malásia respondeu significativamente à adubação nitrogenada, sendo a produção muito reduzida na ausência de nitrogênio, o que evidencia a importância deste nutriente para o desenvolvimento desta brássica.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Kátia Aparecida de Sá e Aline Mariano Silva

Tabela 2. Teores de macronutrientes e micronutrientes na parte aérea da couve da Malásia, em função de diferentes doses de nitrogênio. Uberlândia, UFU, 2003.

N (kg ha ⁻¹)	N	P	K	Ca	Mg	S
	g kg ⁻¹					
0	12,73	4,20	34,75	17,40	2,48	5,65
105	23,98	3,33	35,13	25,58	3,05	6,38
210	25,72	2,68	31,20	21,93	2,63	5,73
315	31,23	2,38	31,13	21,38	2,53	5,73
420	32,90	2,10	31,13	21,28	2,48	5,60

N (kg ha ⁻¹)	B	Cu	Fe	Mn	Zn
	mg kg ⁻¹				
0	164,5	2,50	34,25	82,50	38,00
105	145,3	5,00	112,75	214,50	45,25
210	106,5	3,75	122,50	214,25	49,12
315	98,0	3,50	200,50	188,75	50,50
420	78,0	3,25	208,75	172,25	54,25

Figura 2. Acúmulo de micronutrientes (B, Cu, Mn, Fe e Zn) pela parte aérea da couve-da-Malásia, em função de doses de nitrogênio. Uberlândia, UFU, 2003.

pelo apoio técnico, à Dra. Denise Garcia de Santana pelas sugestões na análise estatística dos dados, ao Sr. John David Bagnall pela revisão do abstract e aos anônimos revisores pelas sugestões e críticas construtivas.

LITERATURA CITADA

- BAILEY, L.H. The cultivated brassicas. *Gentes Herbarum*, v.2, n.5, p.209-267, 1930.
- BATAGLIA, O.C.; FURLANI, A.M.C.; TEIXEIRA, J.P.F.; FURLANI, P.R.; GALLO, J.R. *Métodos de análise química de plantas*. Campinas: Instituto Agrônomo, 1985. 48 p. (Boletim Técnico, 78).
- CASTELLANE, P.D.; SOUZA, A.F.; MESQUITA FILHO, M.V. Culturas olerícolas. In: FERREIRA, M.E.; CRUZ, M.C.P. (Ed.) *Micronutrientes na agricultura*. Piracicaba: Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fósforo, 1991. p.549-584.
- DANTAS, B.F. *Efeito do metanol na produtividade de couve-da-Malásia (Brassica chinensis var. parachinensis (Bailey) Sinskaja)*. 1997. 43 f. (Monografia graduação) - UFU, Uberlândia.
- FERREIRA, M.E.; CRUZ, M.C.P. Micronutrientes no solo. In: FERREIRA, M.E.; CRUZ, M.C.P. (Ed.) *Micronutrientes na agricultura*. Piracicaba: POTAFOS/CNPq, 1991. p.131-157.
- FERREIRA, W.R.; RANAL, M.A. Germinação de sementes e crescimento de plântulas de *Brassica chinensis* L. var. *parachinensis* (Bailey) Sinskaja (couve-da-Malásia). *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v.34, n.3, p.353-361, 1999.
- FERREIRA, W.R.; RANAL, M.A.; FILGUEIRA, F.A.R. Fertilizantes e espaçamento entre plantas na produtividade da couve-da-Malásia. *Horticultura Brasileira*, Brasília, v.20, n.4, p.635-640, 2002.
- FURLANI, A.C.M.; FURLANI, P.R.; BATAGLIA, O.C. Composição mineral de diversas hortaliças. *Bragantia*, Campinas, v.37, p.33-44, 1978.
- GALLACHER, D. *Chinese flowering cabbage*. Queensland, mai. 1999. Disponível em <<http://www.ahs.cqu.edu.au/info/science/psg/AsianVeg/ChinFicabb.html>> Acesso em: 20 out. 2003.
- HERKLOTS, G.A.C. *Vegetable in south-East Asia*. Hong Kong: George Allen & Unwin Ltda, 1972. 525 p.
- HILL, T.R. The effect of nitrogenous fertilizer and plant spacing on the yield of three Chinese vegetables - Kai lan, Tsoi sum and Pak choi. *Scientia Horticulturae*, v.45, p.11-20, 1990.
- KIMOTO, T. Nutrição e adubação de repolho, couve-flor e brócolo. In: FERREIRA, M.E.; CASTELLANE, P.D.; CRUZ, M.C.P. (Eds.). *Nutrição e adubação de hortaliças*. Piracicaba: Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fósforo, 1993. p.149-178.
- LEE, S.H. Vegetable crops growing in China. *Scientia Horticulturae*, v.17, p.201-209, 1982.
- MORAGHAN, J.T.; MASCAGNI JR., H.J. Environmental and soil factors affecting micronutrient deficiencies and toxicities. In: MORTVEDT, J.J.; COX, F.R.; SHUMAN, L.M.; WELCH, R.M. (Ed.) *Micronutrients in agriculture*. 2.ed. Madison: SSSA, 1991. p.371-425.
- MOTA, G.M.F. *Cultivo de Brassica chinensis var. parachinensis (Bailey) Sinskaja na ausência de micronutrientes*. 2001. 36 f. (Monografia graduação) - UFU, Uberlândia.
- OPEÑA, R.T.; KUO, C.G.; YOON, J.Y. *Breeding and seed production of Chinese cabbage in the Tropics and Subtropics*. Tainan, Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Center, 1988. 92 p. (Technical Bulletin, 17).
- RIBEIRO, A.C.; GUIMARÃES, P.T.G.; ALVAREZ V., V.H. *Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais: 5ª aproximação*. Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. Viçosa: UFV, 1999. 359 p.
- SILVA, F.C.; EIRA, P.A.; VAN RAIJ, B.; SILVA, C.A.; ABREU, C.A.; GIANELLO, C.; PÉREZ, D.V.; QUAGGIO, J.A.; TEDESCO, M.J.; ABREU, M.F.; BARRETO, W.O. Análises químicas para avaliação da fertilidade do solo. In: SILVA, F.C. (Ed.) *Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes*. Brasília: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia, 1999. p.75-169.
- SOUZA, E.R. *Efeito da nutrição mineral na produtividade de couve-da-Malásia (Brassica chinensis var. parachinensis (Bailey) Sinskaja)*. 1997. 29 f. (Monografia graduação) - UFU, Uberlândia.
- TRANI, P.E.; GRANJA, N.P.; BASSO, L.C.; DIAS, D.C.F.S.; MINAMI, K. Produção e acúmulo de nitrato pela rúcula afetados por doses de nitrogênio. *Horticultura Brasileira*, Brasília, v.12, n.1, p.25-29, 1994.
- YIP, S.M.; PAO, C.S.; TONG, T.C.; NG, Y.S. A note on some studies of chinese flowering cabbage (*Brassica parachinensis* Bailey). *Agric. Hong-Kong*, v.1, n.5, p.407-418, 1976.