Quão porosa deve ser uma rocha para que seja permeável?

(How porous must a rock be in order to become permeable?)

Andre Rafael Cunha¹, Celso Peres Fernandes, Luís Orlando Emerich dos Santos

Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

Recebido em 8/9/2012; Aceito em 2/2/2013; Publicado em 24/4/2013

Nesta breve nota, visamos a introdução de alguns conceitos e operações importantes sobre as aplicações das teorias da percolação e da renormalização ao estudo de meios porosos. A exposição em forma de problema/solução intenta um viés didático e não exaustivo. Referências mais abrangentes são fornecidas no fim.

Palavras-chave: meios porosos, percolação, renormalização.

In this short paper, we aim to introduce some important concepts and operations about the application of ideas from percolation and renormalization theories to the study of porous media. The exhibition in the form of problem/solution attempts an educational and non exhaustive view. References are provided at the end.

Keywords: porous media, percolation, renormalization.

1. Introdução e problema

Algumas vezes em física aplicada desejamos saber se determinado solo ou rocha é ou não permeável, e para tanto os interpretamos como sendo uma rede formada por sítios *aleatoriamente* ocupados, que simbolizam a fase sólida, e vazios que representam a fase porosa. A Fig. 1 exibe um exemplo para tal modelo.

Define-se a grandeza *porosidade* como a razão dos sítios vazios pelo total de sítios da rede. E interpretamos esse valor como a probabilidade p_0 de um sítio qualquer da rede assumir a condição de poro.

Propomos a seguinte questão: qual o valor de p_0 para que o meio poroso seja permeável?

Para que o meio poroso em questão seja permeável da esquerda para a direita, por exemplo, é necessário que haja um aglomerado percolante (em inglês, *percolate cluster*) de unidades porosas, *i.e.*, um caminho contínuo² formando sítios vazios entre as duas extremidades.

Sugestão: *divida a rede em sub-redes conforme a figura Fig. 1b.*

2. Solução

Adotando a sugestão proposta, vamos considerar as subdivisões das redes. De acordo com a Fig. 1b, a célula de 1ª ordem é formada por quatro sítios. A de 2ª ordem, formada por quatro células de 1ª ordem. E assim por diante.

A célula de 1ª ordem será permeável se também houver um caminho percolante (da esquerda para direita, por exemplo), ou seja, um arranjo adequado de sólidos e poros nos quatro sítios que a formam; assim, a probabilidade p_1 dessa célula ser permeável é uma função de p_0 .

A Fig 2 exibe todas as possíveis configurações para a célula de 1ª ordem. Em (a), os quatro sítios porosos formam um caminho percolante entre o lado esquerdo e o direito; essa configuração ocorre com probabilidade p_0^4 . Em (b), três dos quatro sítios são porosos, e em todas os casos a célula é permeável; a probabilidade é $4p_0^3(1-p_0)$. Em (c), apenas o primeiro e o sexto arranjo são permeáveis; e com probabilidade $2p_0^2(1-p_0)^2$. Em (d), a célula de 1ª ordem não é permeável; e a soma da probabilidade de tais estados é $4p_0(1-p_0)^3$. Por fim, a disposição exibida (e) também não é permeável e ocorre com probabilidade $(1-p_0)^4$.

¹E-mail: cunha@lmpt.ufsc.br.

²Como caminho contínuo estamos nos referindo a sítios que possuem um lado em comum e não apenas um vértice.

Figura 1 - a) Meio poroso interpretado como uma rede de sítios ocupados (fase sólida) e vazios (fase porosa). b) Dica de resolução. Fonte: Ref. [6].

Figura 2 - Configurações de células de 1ª ordem. O sinal “+” significa que a célula é permeável, e “-” o contrário. Fonte: Ref. [6].

Somando todas as possibilidades da célula de 1ª ordem ser permeável, temos

$$p_1 = p_0^4 + 4p_0^3(1 - p_0) + 2p_0^2(1 - p_0)^2, \\ = 2p_0^2 - p_0^4.$$

Se procedermos analogamente com esse processo de renormalização para a célula de 2ª ordem, concluiremos que

$$p_2 = 2p_1^2 - p_1^4,$$

e indutivamente encontra-se a seguinte relação recursiva para a célula de ordem $n + 1$

$$p_{n+1} = 2p_n^2 - p_n^4.$$

Para $n \rightarrow \infty$, vem que [2]

$$p_\infty = 2p_\infty^2 - p_\infty^4,$$

ou em uma notação mais concisa,

$$p = 2p^2 - p^4. \quad (1)$$

Podemos, por um instante, reinterpretar o lado direito da equação acima como uma função do parâmetro x , e escrever

$$f(x) = 2x^2 - x^4.$$

Logo, a Eq. (1) se traduz

$$x = 2x^2 - x^4,$$

i.e., busca-se o valor de x tal que a aplicação da função f o deixa inalterado, em outras palavras, a solução da equação é um ponto fixo. No intervalo $0 < x < 1$ (pois x equivale a uma probabilidade), temos as soluções $x_1^* = 0$, $x_2^* = 0.618$ e $x_3^* = 1$. Definindo $\lambda \equiv df/dx$, obtemos os valores de λ para os pontos fixos acima: $\lambda_1^* = 0$, $\lambda_2^* = 1,528$ e $\lambda_3^* = 0$, respectivamente. O fato de $|\lambda| < 1$ significa que x_1^* e x_3^* são pontos fixos estáveis, ou seja, aplicações sucessivas da função nas proximidades desse ponto fixo retornará ao próprio ponto, *i.e.*, $f(x^* + dx) \rightarrow x^*$. O inverso ocorre se $|\lambda| > 1$, e por isso dizemos que x_2^* é um ponto fixo instável (ver Fig. 3).