Alloimmunization in bone marrow failure

Silvia M. M. Magalhães

Nas últimas décadas verificou-se uma redução dramática na incidência de doenças transmissíveis por transfusão. A incidência de aloimunização parece decrescer com o uso mais disseminado de componentes leucorreduzidos, embora a aloimunização e a refratariedade à transfusão de plaquetas ainda sejam problemas clínicos significantes. O assunto é abordado nesse número da Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia por Arruda e col., com foco na aloimunidade contra antígenos HLA em pacientes com síndromes mielodisplásicas (SMD) e anemia aplástica (AA). Os autores, após estudo de 110 pacientes, detectaram anticorpos anti-HLA em 28,6% dos pacientes com SMD e 45% dos pacientes com AA.

A terapia de suporte transfusional permanece a abordagem padrão para pacientes com insuficiência medular, notadamente as síndromes mielodisplásicas e a anemia aplástica, nos casos severos e em que o transplante não é uma opção terapêutica possível. A maioria dos pacientes é transfundida em alguma fase durante o curso de sua doença, e um percentual significativo torna-se cronicamente dependente de transfusão. Nos pacientes com anemia, a transfusão de concentrados de hemácias promove aumento dos níveis de hemoglobina e oxigenação tecidual adequada, com conseqüente melhora da fadiga, da capacidade física e intelectual e da qualidade de vida. Múltiplas transfusões, no entanto, aumentam o risco de desenvolvimento de anticorpos contra antígenos eritrocitários e antígenos HLA e potencialmente resultam em hemossiderose transfusional (mais de 20 unidades de concentrados de hemácias transfundidas), importante causa de disfunção progressiva de vários órgãos, especialmente fígado, coração e sistema endócrino. Um estudo retrospectivo japonês recente estimou que, em média,

61,5 unidades de concentrados de hemácias são transfundidas em pacientes portadores de SMD e AA ao ano.¹ A aloimunização promove diminuição progressiva da efetividade da transfusão de plaquetas, aumentando os riscos e a mortalidade decorrentes de hemorragia. Num estudo de 50 pacientes portadores de SMD, aproximadamente 80% das transfusões se associaram a algum tipo de complicação: reações transfusionais, necessidade de pré-medicação, desenvolvimento de aloanticorpos e refratariedade a novas transfusões.² Na SMD, a dependência transfusional é atualmente considerada fator prognóstico independente, relacionada à diminuição da sobrevida global.

São questões de interesse: qual o impacto da aloimunização, quais seus efeitos na resposta à transfusão de plaquetas, que fatores têm influência e como ela pode ser minimizada? As evidências demonstram que o uso de componentes leucodepletados reduz os riscos de reações transfusionais febris não-hemolíticas, a transmissão de citomegalovírus e a aloimunização contra antígenos HLA, especialmente importante nos pacientes candidatos ao transplante de medula óssea.³ A terapia transfusional de longo prazo requer, com frequência, hemocomponentes especialmente testados e processados. Gupta e colaboradores, em estudo multicêntrico desenvolvido em hospitais de ensino, estimaram um custo unitário adicional de US\$100 para testes de compatibilidade para antígenos HLA em concentrado de plaquetas.²

Diretrizes internacionais (NCCN)⁴ e nacionais (Resoluções de Diretoria Colegiada – RDC) orientam a prática transfusional adequada evitando exposição desnecessária a riscos de infecção e aloimunização. Atualmente, mais de 1,5 milhões de componentes de plaquetas são transfundidos por ano nos EUA. Na Europa, esse número alcança 2,9 milhões de unidades.⁵ No Brasil, esses números ainda não são conhecidos. A definição do valor mínimo para indicação de transfusão profilática de plaquetas, ajustada aos quadros clínicos específicos, reduz a exposição, os custos e o potencial de aloimunização.

O nível alvo de hemoglobina para transfusão é função da idade, presença de co-morbidades e nível de atividade física e laboral. Os agentes estimulantes da eritropoese têm custo elevado, mas são capazes de induzir resposta satisfatória num subgrupo de pacientes portadores de SMD de baixo risco segundo o IPSS (International Prognostic Score System) e com eritropoetina endógena inferior a 500U/L, diminuindo ou abolindo a necessidade transfusional.⁵ O uso de fatores de crescimento associados ao tratamento da hemossiderose transfusional com a quelação do ferro têm, comprovadamente, prolongado a sobrevida desses pacientes.^{7,8} Novas opções terapêuticas, que incluem imunomoduladores, imunossuppressores, indutores de diferenciação e hipometilantes, trazem expectativas de redução ou abolição da necessidade transfusional.

A aloimunização e a refratariedade resultante permanecem um problema clínico comum e relevante, conforme demonstraram Arruda e col. em seu estudo. Uma contribuição importante para novos estudos e novas estratégias.

Referências Bibliográficas

1. Takatoku M, Uchiyama T, Okamoto S. Retrospective nationwide survey of Japanese patients with transfusion-dependent MDS and aplastic anemia highlights the negative impact of iron overload on morbidity/mortality. *Eur J Haematol* 2007;78:487-94.
2. Gupta P, Leroy SC, Luikart SD, Bateman A, Morrison VA. Long-term blood product transfusion support for patients with myelodysplastic syndromes (MDS): cost analysis and complications. *Leuk Res* 1999;23:953-9.
3. Bordin JO, Fabron JR A. Aplicação clínica de filtros leucocitários. *Rev Assoc Med Bras*. 1997;43:205-8.
4. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Myelodysplastic Panel Members. NCCN practice guidelines: myelodysplastic syndromes, version 2, 2008. Available at URL: http://nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/mds.pdf
5. Stroncek DF, Rebull P. Platelet transfusions. *Lancet* 2007;370: 427-38.
6. Mundle SD. Erythropoiesis-stimulating agents versus RBC transfusion in MDS: comparison of long-term outcomes. *Future Oncol* 2007; 397:397-403.
7. Jabbour E, Kantarjian HM, Koller C, Taher A. Red blood cell transfusions and iron overload in the treatment of patients with myelodysplastic syndromes. *Cancer* 2008 Jan 10 (Epub ahead of print).
8. Marsh JC, Ganser A, Stadler M. Hematopoietic growth factors in the treatment of acquired bone marrow failure states. *Semin Hematol* 2007;44:138-47.

Avaliação: O tema abordado foi sugerido e avaliado pelo editor

Recebido: 30/01/2008

Aceito: 30/01/2008

Professora adjunto da Universidade Federal do Ceará.

Correspondência: Silvia M. M. Magalhães

Av. José Bastos, 3390

60.440-261 – Fortaleza-CE

Tel.: (85) 3101 2272; Fax: 3101 2308

E-mail: silviamm@ufc.br