

RESUMO DE TESE

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DOS PORTADORES DE TUBERCULOSE E SOROLOGIA POSITIVA PARA O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) NO DISTRITO FEDERAL

Este trabalho estuda as características clínicas e epidemiológicas de pacientes com associação tuberculose-HIV, com a finalidade de oferecer dados para subsidiar uma possível melhoria no atendimento dos pacientes co-infectados nos serviços.

A partir de um levantamento realizado nas Unidades de Saúde do Distrito Federal, foram identificados 78 casos de pacientes com associação tuberculose-HIV. Destes, foram coletados os seguintes dados: nome, sexo, idade, local de residência, ocupação e categoria de exposição para o HIV.

Os resultados evidenciaram que a frequência da notificação dos casos com a associação tuberculose-HIV, variou de um caso, em 1986 e para 45, em 1992.

O grupo mais atingido pela co-infecção situa-se na faixa etária de 20-49 anos, com predominância masculina de 88,9%.

Quanto às formas clínicas de tuberculose, nos pacientes com associação tuberculose-HIV, a pulmonar atingiu 73,1% dos casos e a extrapulmonar 26,9%.

Observou-se que o diagnóstico da infecção pelo HIV geralmente precede à doença tuberculosa.

Verificou-se uma predominância da associação tuberculose-HIV entre os usuários de drogas com 37,2% dos casos.

O coeficiente de letalidade encontrado por tuberculose foi de 3,8%.

A eficácia do esquema de tratamento mostrou-se baixa, com somente 42,9% de cura e, quanto à eficiência, verificou-se um rendimento não satisfatório, em razão das elevadas taxas de abandono (21,8%).

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS INFECTED WITH TUBERCULOSIS AND SEROLOGICALLY POSITIVE FOR HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) IN THE FEDERAL DISTRICT

The purpose of this paper was to study the clinical and epidemiological characteristics of patients infected with the HIV/tuberculosis association. It's main goal was to offer measures of improvement in attending these patients. A survey was done in all the public health units of the Federal District.

Seventy eight HIV/tuberculosis infected patients were studied. Name, sex age, address, occupation and HIV type of contamination were some of the data noted.

The results showed that the association HIV/tuberculosis infection varied from one case in 1986 to forty five in 1992.

The most frequent group infected was aged between 20-49 years old, with a predominance of 88.9% of male patients.

The incidence of pulmonary tuberculosis was 73.1% while extrapulmonary was 25.9%.

It was observed that, in general, the HIV infection patients was diagnosed before of the tuberculosis disease was recognised.

There was a predominance of the HIV/tuberculosis association in drug-addicted patients of 37.2%.

The lethality coefficient from tuberculosis was 3.8%.

The efficiency of the clinical treatment was low, with 42.9% of cure. There was a high incidence of treatment abandonment (21.8%).

Resumo de Tese. Kusano MSE. Características clínicas e epidemiológicas dos portadores de tuberculose e sorologia positiva para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) no Distrito Federal. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 28:159-160, abr-jun, 1995.

Finalmente é proposto pela autora a integração dos dois programas a nível operacional.

Finally, the author proposes the integration of the two programs at a practical level.

Maria do Socorro Evangelista Kusano

Tese apresentada à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para obtenção do Título de Mestre.

Ribeirão Preto, Brasil, 1994.