Embolização pulmonar por cianoacrilato após obliteração de varizes gástricas

Cyanoacrylate pulmonary embolism after endoscopic sclerotherapy of gastric varices

Julliana dos Santos Frassei¹, Camila Soares Franco¹, Vinicius Roeffer Brambilla¹, Bruna Melo Coelho Loureiro¹, Carolina dos Santos Kiebert¹, Eduardo Kaiser Ururahy Nunes Fonseca¹, Sabrina de Mello Ando¹, Marcio Valente Yamada Sawamura¹

¹ Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

DOI: 10.31744/einstein_journal/2021AI5778

Figura 1. Tomografia sem contraste em corte axial do tórax (A) evidencia preenchimento de artérias pulmonares por material hiperatenuante (solução de cianoacrilato e Lipiodol®). Nota-se também material de mesma atenuação na topografia do estômago na janela óssea (B) e de abdome, onde previamente se caracterizavam varizes de fundo gástrico (C)

Como citar este artigo:

Frassei JS, Franco CS, Brambilla VR, Loureiro BM, Kiebert CS, Fonseca EK, et al. Embolização pulmonar por cianoacrilato após obliteração de varizes gástricas. *einstein* (São Paulo). 2021;19:eAI5778.

Autor correspondente:

Julliana dos Santos Frassei
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos,
75 – Cerqueira César
CEP: 07095-080 – São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (11) 97113-7842
E-mail: julliana.frassei@gmail.com

Data de submissão:

24/4/2020

Data de aceite:

23/10/2020

Copyright 2021

Esta obra está licenciada sob uma Licença *Creative Commons* Atribuição 4.0 Internacional.

Figura 2. Tomografia sem contraste no corte coronal, na janela de mediastino evidencia o preenchimento de múltiplas artérias pulmonares por material hiperatenuante (solução de cianoacrilato e Lipiodol®)

Figura 3. Tomografia sem contraste no corte sagital, na janela de mediastino, mostrando os mesmos achados

Paciente do sexo masculino de 65 anos, com cirrose hepática, apresentou dispneia súbita e dor torácica algumas horas após ser submetido à obliteração de varizes gástricas e esofágicas por meio de injeção de solução de cianoacrilato e Lipiodol®. Foi submetido à tomografia computadorizada do tórax (Figuras 1 a 3).

O tratamento endoscópico de varizes gástricas com cianoacrilato é eficaz no controle de sangramentos em pacientes hepatopatas, geralmente resultando na hemostasia imediata e diminuição do calibre das varizes na primeira aplicação.^(1,2) No entanto, não é isento de riscos: dentre as complicações inerentes ao procedimento, a embolização do polímero resultante para artérias pulmonares, coronárias, cerebrais e outros vasos tem sido descrita.⁽³⁻⁶⁾

O entendimento da fisiopatologia da embolização pulmonar por tal via perpassa o fato do cianoacrilato ser um monômero líquido que se polimeriza rapidamente quando em contato com o sangue, resultando em coagulação sanguínea e oclusão vascular quase imediata. Para evitar o risco de a agulha injetora aderir ao vaso e causar um sangramento grave ao ser retirada, geralmente o Lipiodol® é associado à injeção de cianoacrilato. Como resultado dessa mistura, ocorre

um atraso no processo de polimerização e coagulação do cianoacrilato, aumentando o risco de embolização do procedimento.^(4,5)

A incidência real dessa complicação não é conhecida, uma vez que a avaliação por exame de imagem não é sempre realizada. Acredita-se que o risco pode ser maior em pacientes com varizes extensas, que exigem maiores volumes de materiais esclerosantes. Associa-se, também, com a proporção dos outros constituintes, como o Lipiodol®.⁽⁵⁾

As complicações embólicas secundárias ao uso de cianoacrilato parecem ser infrequentes e apresentam um diverso espectro de sintomas, geralmente sem cursar com importante morbimortalidade para o paciente, sendo um procedimento seguro e eficaz para o objetivo proposto. No caso apresentado, o paciente foi encaminhado ao pronto atendimento do serviço, recebeu medidas de suporte e ficou em observação por 12 horas, recebendo alta estável e assintomático.

INFORMAÇÃO DOS AUTORES

Frassei JS: <http://orcid.org/0000-0002-6372-9259>
 Franco CS: <http://orcid.org/0000-0001-5397-1933>
 Brambilla VR: <http://orcid.org/0000-0003-1842-7144>
 Loureiro BM: <http://orcid.org/0000-0002-7270-2664>
 Kiebert CS: <http://orcid.org/0000-0003-4276-4255>
 Fonseca EK: <http://orcid.org/0000-0002-0233-0041>
 Ando SM: <http://orcid.org/0000-0002-5097-5282>
 Sawamura MV: <http://orcid.org/0000-0002-9424-9776>

REFERÊNCIAS

1. D'Amico G, Pagliaro L, Bosch J. The treatment of portal hypertension: a meta-analytic review. *Hepatology*. 1995;22(1):332-54.
2. Sarin SK, Jain AK, Jain M, Gupta R. A randomized controlled trial of cyanoacrylate versus alcohol injection in patients with isolated fundic varices. *Am J Gastroenterol*. 2002;97(4):1010-5.
3. Tsokos M, Bartel A, Schoel R, Rabenhorst G, Schwerk WB. [Fatal pulmonary embolism after endoscopic embolization of downhill esophageal varix]. *Dtsch Med Wochenschr*. 1998;123(22):691-5. German.
4. Türler A, Wolff M, Dorlars D, Hirner A. Embolic and septic complications after sclerotherapy of fundic varices with cyanoacrylate. *Gastrointest Endosc*. 2001;53(2):228-30.
5. Michael PG, Antoniadis G, Staicu A, Seedat S. Pulmonary glue embolism: an unusual complication following endoscopic sclerotherapy for gastric varices. *Sultan Qaboos Univ Med J*. 2018;18(2):e231-5.
6. Alexander S, Korman MG, Sievert W. Cyanoacrylate in the treatment of gastric varices complicated by multiple pulmonary emboli. *Intern Med J*. 2006;36(7):462-5.