SINTOMAS EXISTENCIAIS VERSUS SINTOMAS PATOLÓGICOS, UM PROBLEMA DE ROTULAGEM PSIQUIÁTRICA: INQUÉRITO SOBRE A VIVÊNCIA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE MENTAL.

Edna Paciência Vietta* Sônia Maria Villela Bueno**

RESUMO - A classificação psiquiátrica tem levado à degradação e a segregação social o indivíduo identificado como doente mental, contribuindo para a sua estigmatização. No presente trabalho objetivou-se verificar sintomas emocionais que os docentes de enfermagem consideram normais e anormais; como se percebem dentro deste referencial e como evidenciam o tratamento psiquiátrico. Os resultados evidenciaram que a população estudada considerou como sintomas normais vivenciados: ansiedade, desânimo, depressão, agressividade, angústia, sentimento de culpa, inferioridade e vontade de agredir; não vivenciados, anormais: delírio, alucinação, idéias obsessivas e vontade de matar. Apontaram como sintomas vivenciados com maior intensidade: depressão, sentimento de inferioridade, perseguição e desânimo; 50% da população considera-se equilibrada, a maioria não faz tratamento psicoterápico mas pensa em submeter-se a psicoterapia. Concluiu-se que os docentes foram coerentes com as respostas apresentando um conceito de normalidade dentro de um referencial, num continuum, dando portanto, ao conceito, uma conotação de flexibilidade e relatividade.

ABSTRACT - Psychiatric classification has led to the degradation and social segregation of individuals identified as mental patients, thus contributing to a stigmatizing process. The objective of the present study was to determine the emotional symptoms that Nursing teachers consider normal and abnormal, how they perceive themselves within this frame of reference and how they look upon psychiatric treatment. The results showed that the population studied considered the following symptoms to be part of normal day-to-day living: anxiety, discouragement, depression, aggressiveness, anguish, guilt feelings, inferiority and the wish to aggress others; and to be abnormal symptoms, not part of daily life, the following ones: delirium, hallucinations, obsessive ideas and the wish to kill. They pointed out as symptoms more intensely experienced in daily life: depression, feeling of inferiority, perscution and discouragement. Fifty percent of the participants consider themselves to be equilibrated. Most of them are not in psychoterapy but are thinking about starting psycotherapy. It was concluded that these Nursing teachers are coherent with their responses, presenting a concept of normality within a continuum, and thus investing the concept with a connotation of flexibility and relativity.

1. INTRODUÇÃO

A absoluta maioria da humanidade, tem problemas emocionais de maior ou menor importância. Esses problemas afetam a existência dos indivíduos, desencadeando sintomas físicos e emocionais os mais diversos possíveis. A vida competitiva da sociedade de consumo de nossos dias, a insegurança no trabalho e nas ruas, também contribuem fortemente com seu ônus para a ausência de higidez mental. Em conseqüência, não é

^{*} Prof. Assistente Dra. do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da

^{**} Prof. Assistente do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da EERP USP (pedagoga),

de se admirar que haja uma elevada incidência de pessoas com insônia, incapacidade para concentrar-se e de abstrair-se, com sintomas que provocam distúrbios digestivos, depressão, angústia, dores de cabeça, cansaço excessivo, perda da auto confiança e da capacidade de iniciativa, elevada irritabilidade emocional e muitos outros sintomas existenciais. Há por outro lado, uma tendência generalizada de se identificar tais "sintomas" como indícios de doença mental chegando, muitas vezes, ao cúmulo de enquadrá-los na clássica nosologia psiquiátrica engajando o seu portador na classificação de neurótico ou psicótico, quando não em quadros mais específicos como histéricos, hipocondríacos, deprimidos, obssesivos, fóbicos, esquisofrênicos, paranóicos e assim por diante. Assim sendo, temse observado que, desde os tempos mais remotos, o ser humano vem sendo classificado de acordo com valores, crencas, sintomas e comportamentos diversos. A esse respeito SZASZ (1977), lembrando que o homem é o único animal que classifica, comenta que vivemos numa era científica e na qual depositamos fé ilimitada nos métodos das Ciências Físicas, levando seu pensamento mais longe, assevera que, apoiado nesta certeza, o homem extrapola e afirma que, se podemos classificar o comportamento de estrelas e animais, porquê não o comportamento dos homens? A esta pergunta é o próprio autor quem responde não ser admissível tal relação, na medida em que a lógica da Ciência Física é patentemente falsa diante da Ciência do Comportamento: negligencia as diferenças entre as pessoas e coisas e os efeitos da linguagem em cada uma delas.

A linguagem da Física nos ajuda a compreender e manipular objetos físicos. Se a concebermos para a Psiquiatria (ou Psicologia), sua linguagem especial deverá servir a um propósito semelhante; ajudar-nos a compreender e controlar pessoas. Mas, seria moralmente legítimo controlar ou manipular seres humanos?

A verdade é que enquadrar pessoas em determinadas classes as afetam profundamente, fato este não observado no caso dos animais e coisas. Por exemplo, o rótulo de esquisofrênico é algo que estigmatiza a pessoa. O rótulo de "quiróptero" ao morcego ou o de "granito" a uma rocha, em nada os afeta. Em outras palavras, em psiquiatria e em questões humanas, o ato de classificação é um evento basicamente significativo. Uma vez imprimida a rotulação, as outras particularidades da pessoa, sobretudo as positivas, deixam de ser consideradas e ela é degradada e desumanizada, reduzida mesmo a uma coisa (Jaccard, 1981).

Para BARRETO (1978), os nomes usados para classificar as doenças mentais, são puramente descritivos e não abrangem, de modo algum explicações etiológicas, constituem apenas rótulos. A classificação é um ato humano e social. A classificação de indivíduos ou grupos acarreta a participação de pelo menos três tipos distintos de pessoas: aquele que classifica, o classificado e um público a quem cabe aceitar ou rejeitar uma determinada classificação. Um indivíduo pode

classificar a si mesmo e aos outros e, por sua vez, pode ser classificado por outros. Em cada caso, a categorização proposta por aquele que classifica pode ser aceita ou rejeitada pelos outros. Para que uma classificação de si ou de outros seja aceita, é necessário, em geral, uma medida de poder sobre os outros; este poder pode ser intelectual (científico) ou político (coercitivo).

Como classificador, o homem também ataca o objeto de seu interesse classificatório, não para devorálo mas para controlá-lo. A ciência pode ser vista como a soma total do esforço humano para compreender a natureza e desse modo obter uma medida do controle sobre ela. Na realidade, a classificação psiquiátrica leva os indivíduos rotulados à segregação social. A partir do momento em que o paciente é classificado numa nosografia, ele deixa sua situação de sujeito a quem se fala para a de objeto do qual se fala e do qual se dispõe.

Na, relativamente curta, história da psiquiatria de trezentos anos, a condição agora chamada de doença mental foi rotulada e re-rotulada como loucura, insanidade, esquisofrenia, neurose, psiconeurose, psicose, descontrole do ego, desordem emocional e assim por diante. Na procura de alívio para a carga de suas responsabilidades morais, o homem moderno mistifica e torna técnicos seus problemas de vida.

A conquista da existência humana ou do processo vital pelas profissões ligadas à saúde mental começou com a identificação e classificação das chamadas doencas mentais e culminou em nossos dias, com a afirmação de que tudo na vida é um problema psiquiátrico, que a ciência do comportamento deve resolver. A partir do início do século, especialmente depois de cada uma das duas grandes guerras mundiais, o ritmo da conquista psiquiátrica cresceu rapidamente. O resultado é que hoje todas as dificuldades e problemas da vida são considerados doenças psiquiátricas e todos (exceto aqueles que diagnosticam) são considerados doentes mentais. Esse processo de tornar, médicos, psiquiátricos e, em geral, técnicos, os problemas pessoais, sociais e políticos tem sido uma característica dominante na era moderna e burocrática.

Essa tendência classificatória tem sido de tal forma difundida, que ao simples sinal ou sintoma da presença de um problema, as pessoas se angustiam, supondo estarem com transtornos mentais graves. Sintomas como apatia, ansiedade, depressão, insônia, tão comuns na sociedade capitalista, onde as preocupações, a busca incessante de "status", a competição, a supervalorização do poder aquisitivo, os problemas financeiros, refletem situações existenciais, as pessoas procuram nas drogas, soluções para o seu alívio. Até mesmo os profissionais da área da saúde, têm sido incoerentes e contraditórios ao classificarem de doentes mentais, indivíduos com sintomas existenciais (SZASZ, 1977).

A classificação pressupõe um diagnóstico diferencial entre o que é não patológico e o que é patológico.

O que é doença e o que é saúde? O que é normal e o que é anormal? Quem é o doente mental?

O fato de um desvio em particular, ser classificado como doença, numa dada sociedade, depende basicamente de ser percebido pelas pessoas como um desvio de saúde e, como tal, de pertencer ao domínio dos profissionais especializados na cura, assim como depende da aceitação do desvio, por parte destes, como sendo de sua alçada. Por outro lado, a classificação dos desvios na sociedade, é um processo contínuo, sendo muitos tipos reclassificados de tempos em tempos, de acordo com as alterações nos conceitos acerca de sua natureza.

A principal controvérsia contemporânea em torno da questão de quem deve ser considerado mentalmente enfermo, foi iniciada por alguns psiquiatras e cientistas sociais, que argumentaram que a tendência a encarar um número cada vez maior de desvios como doença mental já estava indo longe demais (MILLES, 1982).

Nossa preocupação atual tem sido a de contribuir para que tal tendência não se difunda ainda mais, agravando o problema do rótulo em psiquiatria.

Neste intuito, entendemos ser de fundamental importância pesquisar o que os profissionais da saúde entendem como sintomas patológicos e sintomas existenciais, pois que, deste entendimento, pensamos ser possível identificar o conceito de saúde e doença, os quais utilizam para suas avaliações pessoais que, com certeza, refletem em seu proceder, como pessoa e como profissional, supondo que ele utilize os mesmos critérios para classificar outros

2. OBJETIVOS

O presente trabalho objetiva investigar, como os conceitos de normalidade e anormalidade interferem na atuação dos docentes em enfermagem. Isto impli-

- 1. Identificar quais sintomas os docentes de enfermagem consideram normais ou anormais.
- 2. Verificar como o docente de enfermagem se percebe dentro do referencial normal e anormal.

3. METODOLOGIA

População:

Trabalhou-se com docentes de enfermagem de diferentes áreas, de cinco Escolas de Enfermagem de cidades do interior de São Paulo: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP; FEO de Saúde Barão de Mauá - Ribeirão Preto; Escola de Enfermagem F.E.F.O.F. - Fernandópolis; Departamento de Enfermagem da FCM-

UNICAMP - Campinas; Departamento de Enfermagem F.A.M.E.M.A. - Marília. Esta população teve como critério de seleção, a representação de cada um dos alunos, matriculados na disciplina "Enfermagem Psiquiátrica dirigida a pacientes internados" do Curso de Pós-Graduação - Área Enfermagem Psiquiátrica do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP

Amostra:

Seis (6) docentes de cada uma das instituições selecionadas aos quais foram incluídos seis (6) alunos do referido curso, totalizando 36 sujeitos.

Instrumentos:

O questionário constou fundamentalmente de duas partes: Dados de identificação e questões mistas (abertas e fechadas) relacionadas ao tema proposto, elaboradas a partir de uma listagem de sintomas. (21 itens) composto por 13 questões, sendo quatro (4) relativas ao conceito de normalidade e anormalidades e seis (6) sobre tratamento psiquiátrico; duas (2) sobre critérios de conduta e duas (2) sobrevivências terapêuticas. Dado a riqueza de dados e da necessidade de uma análise psicodinâmica mais profunda, tendo em vista a precariedade de tempo, analisaremos os dados correspondentes apenas as 9 (nove) primeiras questões.

Procedimento:

O questionário foi aplicado inicialmente aos alunos de pós graduação cujos resultados serviram para aferir o instrumento, servindo também como plano piloto. Esta etapa serviu para motivar o grupo o qual decidiu colaborar na investigação, assumindo juntamente com as coordenadoras do curso a responsabilidade pela aplicação do instrumento como execução de tarefa para avaliação didática.

Os questionários foram distribuídos entre os docentes das referidas escolas, entregues ao acaso, seguidos de orientação e esclarecimentos oral, individual, sobre os objetivos da pesquisa, ficando o entrevistador a disposição dos entrevistados para quaisquer dúvidas. Estabeleceu-se um período de tempo flexível baseado no tempo em que os entrevistadores levaram em média para preenchimento do referido questionário (30').

Definição Operacional:

No presente trabalho considera-se cada um dos sintomas listados no instrumento como situados numa escala representada por um continuum delimitados pelos extremos: "normalidade" - "anormalidade" e cuja localização do sintoma, nesta escala, dependerá da intensidade, freqüência, situação e momento em que está sendo vivenciado.

4. RESULTADOS

TABELA 1- Distribuição numérica e percentual da opinião da população referente à vivência ou não dos sintomas emocionais.

	1	RESPOSTAS									
SINTOMAS EMOCIONAIS		VIVEN- CIADOS		NÃO VIVEN- CIADOS		BRANCO		NULO		TOTAL	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	
ansiedade	36	100	-	-	-	-	-	-	36	100	
angústia	33	92	2	5	1	3	-	-	36	100	
depressão	35	97	1	3	-	-	-	-	36	100	
fobia	13	36	23	64	-	-	-	-	36	100	
idéias obsessivas	9	25	24	75	-	-	-	-	36	100	
agitação	27	75	9	25	-	-	-	-	36	100	
agressividade	30	83	6	17	-	-	-	-	36	100	
apatia	26	72	10	28	-	-	-	-	36	100	
insônia	28	78	8	22	-	-	-	-	36	100	
alucinação	1	3	35	97	1	3	-	-	36	100	
delírio	2	5	33	92	-	-	-	-	36	100	
sentimento de culpa	35	97	1	3	-	-	-	-	36	100	
sentimento de inferioridade	34	94	2	5	-	-	-	-	36	100	
sentimento de perseguição	11	30	25	69	-	-	-	-	36	100	
sensação de pânico	14	39	20	55	2	5	-	-	36	100	
desanimo	36	100	-	-	-	-	-	-	36	100	
vontade de morrer	18	50	18	50	-	-	-	-	36	100	
desespero	22	61	14	39	-	-	-	-	36	100	
vontade de agredir	26	72	10	28	-	-	-	-	36	100	
vontade de matar	7	19	28	78	1	3	-	-	36	100	

NOTA: apareceu na alternativa outros: rejeição (± vivenciado); solidão (1 vivenciado) e euforia (1 vivenciado).

TABELA 2 — Distribuição numérica e percentual da opinião da população referente a questão "Qual desses sintomas considera normais e anormais".

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	1 100	RESPOSTAS								
SINTOMAS EMOCIONAIS	NOF	RMAL	ANORMAL		EM BRANCO		TOTAL			
	nº	%	nº	%	nº.	%	nº.	%		
ansiedade	30	83	-	-	6	17	36	100		
angústia	24	67	5	14	7	19	36	100		
depressão	22	61	4	11	10	28	36	100		
fobia	6	17	11	30	19	53	36	100		
idéias obsessivas	4	11	16	44	16	44	36	100		
agitação	22	61	3	8	11	30	36	100		
agressividade	15	42	7	19	14	39	36	100		
apatia	16	44	4	11	16	44	36	100		
insônia	18	50	6	17	12	33	36	100		
alucinação	4	11	20	55	12	33	36	100		
delírio	3	8	18	50	15	42	36	100		
sentimento de culpa	20	55	6	17	10	28	36	100		
sentimento de inferioridade	21	58	3	8	12	33	36	100		
sentimento de perseguição	10	28	13	36	13	36	36	100		
sensação de pânico	13	36	10	28	13	36	36	100		
desãnimo	25	69	2	5	9	25	36	100		
vontade de morrer	11	30	13	36	12	33	36	100		
desespero	18	50	4	11	14	39	36	100		
vontade de agredir	17	47	5	14	14	39	36	100		
vontade de matar	8	22	14	39	14	39.	36	100		

NOTA: em outros aparecem rejeição, solidão e euforia como normais.

TABELA 3 — Distribuição numérica e percentual da opinião da população referente a questão "Em que intensidade você os vivenciou".

	ed also	RESPOSTAS									
SINTOMAS EMOCIONAIS		X		XX		XXX		EM BRANCO		TOTAL	
	nº	%	nº	%	nº.	%	nº	%	nº	%	
ansiedade	8	22	10	28	18	50	-	-	36	100	
angústia	13	36	17	47	4	11	2	5	36	100	
depressão	20	55	10	28	5	14	1	3	36	100	
fobia	9	25	1	3	2	5	24	67	36	100	
idéias obsessivas	5	14	4	11	-	-	27	75	36	100	
agitação	11	30	9	25	6	17	10	28	36	100	
agressividade	13	36	12	33	3	8	8	22	36	100	
apatia	14	39	10	28	-	-	12	23	36	100	
insônia	16	44	6	17	4	11	10	28	36	100	
alucinação	-	-	-	-	-	-	36	100	36	100	
delírio	1*	3	-	-	-	-	35	97	36	100	
sentimento de culpa	19	53	13	36	1	3	3	8	36	100	
sentimento de inferioridade	19	53	10	28	4	11	3	8	36	100	
sentimento de perseguição	9	25	2	5	-	-	25	69	36	100	
sensação de pânico	9	25	2	5	2	5	23	64	36	100	
desânimo	19	53	11	30	6	17	-	-	36	100	
vontade de morrer	9	25	4	11	1	3	22	61	36	100	
desespero	7	19	5	14	1	3	23	64	36	100	
vontade de agredir	12	33	11	30	4	11	9	25	36	100	
vontade de matar	6	17	3	8	1	3	26	72	36	100	

NOTA: em outros apareceu: 1 solidão (X); 1 euforia (XX); 2 rejeição (XXX).

Às intensidades, estabeleceu-se as seguintes graduações: X (leve), XX(moderada), XXX(intenso).

TABELA 4 — Distribuição numérica e percentual de resposta da população quanto a 4ª questão: "Você se considera um indivíduo: equilibrado; mais ou menos equilibrado ou muito equilibrado?"

RESPOSTAS	Nº	%
Equilibrado	19	52,7
• Mais ou menos equilibrado	16	44,5
• Muito equilibrado	1	2,8
TOTAL GERAL	36	100,0

TABELA 5a — Distribuição numérica e percentual da resposta da população quanto a 5ª questão: "Você fez ou está fazendo algum tratamento psicoterápico?"

RESPOSTAS	Nº	%	
• Sim • Não	9 27	25 75	
TOTAL	36	100	

TABELA 5b — Distribuição numérica e percentual da resposta da população quanto a 5ª questão: "Se não faz tratamento psicoterápico, já pensou em submeter a esse tratamento?"

RESPOSTAS	Nº	%
• Sim • Não	16 11	59,3 40,7
TOTAL	27	100,0

^{*} O total não corresponde ao total 36 porque esta questão complementa a tabela anterior.

TABELA 6 — Distribuição numérica e percentual da resposta da população quanto a 6ª questão: "Você fez ou está fazendo uso de alguma droga psicoterápica: ansiolítico, tranquilizante ou anti-depressivo?"

RESPOSTAS	Nº	%
• Sim	4	11,1
• Não	32	88,9
TOTAL	36	100,0

^{*} Em caso positivo: NOAM AD: LORIUM: LEXIL; EQUI-LID.

5. DISCUSSÕES

Os resultados apresentados na Tabela 1 revelam que a grande maioria dos sujeitos da amostra estudada já vivenciou a maioria dos sintomas da lista apresentada. Alguns deles indicados com maior frequência como ansiedade, desânimo, depressão, sentimentos de culpa, angústia, sentimento de inferioridade, agressividade, com predominância da ansiedade e do desânimo com 100% de indicação. Estes dois sintomas são referidos por MAY (1977), como integrantes do círculo vicioso da condição humana: neste processo "impotência diante do ser resulta de uma ameaça ou de perda, o que vem a converter-se em ansiedade: esta resulta em regressão e apatia, daí à hostilidade e esta numa alienação do homem em relação ao homem: a despersonalização, com todos os sintomas característicos de nossa cultura com sentimentos de inferioridade, culpa e depressão". Se considerarmos ansiedade como sinônimo de angústia, se incluirmos o desânimo com a depressão, diríamos que estes sintomas foram vivenciados pela totalidade da população. O que corresponde a afirmação de que tais sintomas são inerentes ao homem contemporâneo no enfoque existencialista.

Outros sintomas bastante indicados foram insônia (28%), agitação (27%), apatia (26%), vontade de agredir (26%) e o desespero (22%). Estes sintomas se relacionados com os anteriores, também terão suas porcentagens alteradas. Por exemplo, a agitação e o desespero com a depressão ou agressividade, a insônia com a ansiedade e depressão e o sentimento de culpa ou a vontade de agredir, com a agressividade ou ainda sentimento de inferioridade com a ansiedade e depressão. Na realidade, psicodinamicamente, todos esses sintomas são extremamente interdependentes e inter-relacionados.

Os sintomas vivenciados pela amostra foram considerados pelos sujeitos como sintomas normais, quando vivenciados com intensidades moderadas. Estes foram, segundo Tabela 2, depressão, sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, desânimo, apatia, agressividade, angústia e vontade de agredir.

A ansiedade, embora vivenciada com bastante intensidade por alguns docentes, 50% a vivenciou em grau intenso, 28% em grau moderado e apenas 22% em grau leve, ainda foi considerada um sintoma normal (Tabela 2 e 3).

Atacando especificamente o problema da ansiedade, Kierkegaard observou que escapamos à ansiedade neurótica à medida que nos tornamos livres como indivíduos e, ao mesmo tempo que realizamos a comunidade com os nossos semelhantes. A ansiedade, como ele expressou epigramaticamente, é ''a vertigem da liberdade''. Para Kierkegaard, liberdade significa uma expansão da autoconsciência e da capacidade de atuar responsavelmente como um Eu. Significa uma capacidade crescente de fazer face às nossas possibilidades,

tanto no desenvolvimento individual como no aprofundamento das relações com os nossos semelhantes, juntamente com uma concretização dessas possibilidades. Essa realização das possibilidades é um aventurar contínuo em novas áreas.

Convém salientar que Kierkgaard concebeu essa ansiedade como "normal", "não neurótica". O seu conceito era precursor do que Ranck descreveria, mais tarde, com a ansiedade inerente à individualização e o que Goldstein descreveu com a ansiedade normal quando o indivíduo se defronta com os inevitáveis choques do crescimento e da experiência (MAY, 1980).

Não queremos com esta análise negar a existência da ansiedade neurótica. Esta estará determinada entre inúmeros fatores pela intensidade em que ela aparecer e o nível em que o indivíduo a suportar.

Os sintomas considerados como normais na amostra são classificados como sintomas neuróticos pela classificação nosológica e, portanto, mais admissíveis e toleráveis pelos indivíduos, sendo talvez mais fáceis de serem admitidos.

Os sintomas não vivenciados (Tabela 1) indicados pela amostra foram: alucinação, delírio, vontade de matar, idéias obsessivas, sentimento de perseguição, fobias, sensação de pânico, vontade de morrer que coincidem com os sintomas indicados como anormais (Tabela 2) por um número razoável da amostra. A alucinação e o delírio foram sintomas vivenciados por apenas 3% e 5% respectivamente. No entanto, deixaram de opinar quanto a normalidade ou anormalidade dos sintomas (Tabela 2); fobia 53%; apatia e idéias obsessivas 44%; delírio 42%; vontade de matar, vontade de agredir, desespero, agressividade 30%, sentimento de perseguição, sensação de pânico 36%, e vontade de morrer, sentimento de inferioridade, alucinação, insônia 33%, resultados para os quais não temos elementos para análise. Podemos no entanto inferir como resistências ou dificuldades de compreensão. Sintomas neuróticos pela classificação internacional como a fobia e idéias obsessivas; sintomas enquadrados como psicóticos na referida nosologia psiquiátrica como delírio, alucinação, e sentimento de perseguição ou são logo identificados como anormais ou podem ser dificilmente admitidos como vivenciados. Outra possibilidade é a de que o indivíduo possa não ter consciência de sintomas como alucinação e delírio. Outros sintomas que envolvem agressão ou auto agressão parecem ser pouco aceitos na nossa sociedade tanto que geralmente são fortemente reprimidos (vontade de matar e vontade de morrer) e, portanto, também difíceis de serem admitidos.

Do total da amostra, conforme a Tabela 4, 52,7% dos sujeitos estudados consideram-se equilibrados, portanto significando a metade da amostra; 44,5% consideram-se mais ou menos equilibrados, apenas 2,8% consideram-se muito equilibrados, confirmando, assim, a indicação de vivências de sintomas admitidos

pela maioria, conforme a Tabela 3, como sintomas normais quando vivenciados em grau leve ou moderado ou quando considerado normal mesmo em grande intensidade como no caso do sintoma de ansiedade. Coincide ainda com a indicação de sintomas patológicos ou anormais, não vivenciados pela amostra ou não referido pelo percentual de respostas em branco que, haja visto, teve elevada freqüência nos sintomas fobias, idéias obsessivas, alucinações, delírio, sentimento de perseguição. Sabe-se, no entanto, que nem sempre estes sintomas são indícios de anormalidade. Por exemplo, uma pessoa normal pode ter alucinações sob condições excepcionais como na hipnose, excitação intensa, ingestão de drogas, redução acentuada dos estímulos sensoriais e até numa simples febre. A imaginação, uma experiência com a característica da percepção sensorial (visão, sons, gosto, tato e assim por diante) pode ser evocada por condições tóxicas, tumores e substâncias químicas. A pessoa não consegue distinguir esta experiência das que foram evocadas por processos sensoriais naturais, mesmo que a experiência se apresente bastante bizarra. A percepção é experimentada como real. Daí não poder ser identificada como anormal. Além disso as alucinações podem ser evocadas por uma severa tensão emocional e física.

A Tabela 5 evidencia que a grande maioria dos sujeitos da amostra (75%) informa não estar sendo submetido a nenhum tipo de tratamento psicoterápico, porém 59,3% já pensou em se submeter a um tratamento desta natureza, Coerentes portanto com a afirmação de que a maioria 52,7% se considera equilibrada e 44,5% mais ou menos equilibrados. No entanto, conforme resultados apresentados na Tabela 5b, 59,3%, já pensou em se submeter a tratamento psicoterápico. Quanto a utilização de drogas psicotrópicas, 88% dos sujeitos informam não utilizar nenhum tipo de medicação desta natureza, enquanto uma minoria 11,1% informa fazer uso frequente das seguintes medicações: NOAN, AD, LEXIL, LORIUM e EQUILID, medicamentos estes classificados como tranquilizantes menores ou ansiolíticos. O que nos leva a pensar que o grau de tensão ou ansiedade a ser tolerado varia de indivíduo para indivíduo. Em condições de ameaça, moderada ou intensa, as pessoas podem sentir a necessidade de procurar ajuda terapêutica e ou medicamentosa, enquanto outras sob provocação semelhante são capazes de tolerar altos níveis de tensão e ansiedade e portanto funcionar de maneira ajustada. No decurso do desenvolvimento normal, o ser humano aprende a defender-se contra o sentimento de ansiedade e a manter a sua integridade contra a ameaça externa.

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES

Conclui-se que a grande maioria dos sujeitos estudados:

- Admitiram vivenciar a maior parte dos sintomas listados considerando-os normais, sendo eles: ansiedade, desânimo, depressão, sentimento de inferioridade, angústia, agressividade, vontade de agredir, insônia, agitação, apatia.
- Evidenciaram, como sintomas não vivenciados e como anormais: alucinação, delírio, vontade de matar, idéias obsessivas, sentimento de perseguição, fobia.
- Apresentaram dúvidas em enquadrar os sintomas: alucinação, delírio, fobia, depressão, etc., como normais ou anormais, deixando as lacunas em branco.
- Enquadraram-se como indivíduo equilibrado, considerando-se como normais e dando ao conceito uma conotação de flexibilidade e relatividade.

Torna-se difícil afirmar a coerência da classificação quando o próprio indivíduo se classifica, na medida em que se constata a tendência a ser neste caso, mais condescentemente e criterioso (uma coisa é rotular, outra é ser rotulado ou aceitar a rotulação). É importante que o que classifica o outro possa sentir em si mesmo, o efeito e o incômodo de ser classificado, e embora isto não apareça explicitamente, esta foi uma queixa freqüente por parte dos participantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1. BARRETO, D. O alienista, o louco e a lei. Petrópolis, Vozes, 1978.
- 2. JACCARD, R. A loucura. Rio de Janeiro, Zahar, 1981.
- 3. MAY, R. *Psicologia e dilema humano*. Rio de Janeiro, Zahar, 1977
- 4. _____ Psicologia existencial. Porto Alegre, Globo, 1980.
- 5. MILES, A. O doente mental na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro, Zahar, 1982.
- SZASZ, S.T. Ideologia e doença mental: ensaios sobre a desumanização psiquiátrica do homem. Rio de Janeiro, Zahar, 1977
- 7. _____ O mito da doença mental. Rio de Janeiro, Zahar, 1979.