

Atualização em doença de Crohn

SÉRGIO EDUARDO ALONSO ARAUJO, WANDERLEY MARQUES BERNARDO

1. São características clínicas associadas à doença de Crohn, exceto:

- A conjuntivite ou uveíte podem ser manifestações associadas
- A retocolite ulcerativa faz parte do diagnóstico diferencial
- O megacólon tóxico é frequente e autolimitado
- A ileíte aguda deve ser diferenciada da apendicite aguda

2. A principal indicação do uso de ressonância magnética é:

- Detectar fístulas anais
- Orientar as biópsias
- Fazer o diagnóstico diferencial com retocolite ulcerativa
- Está indicada, sobretudo, nas crises e exacerbações

3. Com relação ao Índice de Atividade da Doença de Crohn, é verdade:

- É considerada em remissão quando o índice é inferior a 150
- É considerada grave quando o índice é superior a 150
- É considerada leve quando o índice é inferior a 450
- É considerada moderada quando índice é superior a 220

4. Está correto sobre o tratamento da doença de Crohn:

- A doença ileocecal pode ser tratada pela messalazina VO na dose de 3 a 4 g/dia
- A colite deve ser primariamente tratada com imunossuppressores
- Os corticosteroides devem ser associados aos salicilatos
- Nunca utilizar o metronidazol antes de corticosteroides

5. O tratamento de manutenção da doença deve ser realizado:

- Em todos os pacientes
- Apenas em pacientes com fístula anal
- Em pacientes submetidos à corticoterapia
- Somente após o primeiro episódio de sintomas

RESPOSTAS AO CENÁRIO CLÍNICO: DOADORES LIMÍTROFES NO TRANSPLANTE DE FÍGADO

[PUBLICADO NA RAMB 2011; 57(1)]

- Aqueles com idade inferior a 30 anos (**Alternativa A**).
- A possibilidade do uso de doador vivo com resultados comparáveis em sobrevida do enxerto e do receptor (**Alternativa D**).
- A infecção por citomegalovírus é comum no pós-operatório de transplante de fígado (**Alternativa A**).
- A utilização de enxertos anti-HBc positivo em receptores também soropositivos não altera a sobrevida destes (**Alternativa B**).
- A presença de ascite pode aumentar a margem de segurança para utilização de enxertos maiores (**Alternativa B**).