

Espécies de Cerambycidae, Disteniidae e Vesperidae (Insecta, Coleoptera) registradas no Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil

Miguel Angel Monné¹, Marcela Laura Monné^{1,2}, Juan Pablo Botero¹,
Vanessa Souza Machado¹, Allan Carelli¹, Mario Cupello¹ & Rodrigo Souza¹

1. Departamento de Entomologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, 20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. (monne@uol.com.br)

Recebido 21 novembro 2016

Aceito 6 fevereiro 2017

DOI: 10.1590/1678-4766e2017119

ABSTRACT. *Cerambycidae, Disteniidae and Vesperidae species (Insecta, Coleoptera) recorded from Mato Grosso do Sul State, Brazil.* A survey of the Cerambycidae, Disteniidae and Vesperidae species recorded from Mato Grosso do Sul state, Brazil, is presented. The data were based on literature and in the collection of the Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Two hundred and twenty nine species are registered to Cerambycidae, distributed in five subfamilies. Two species of Disteniidae and two of Vesperidae, are registered.

KEYWORDS. Checklist, inventory, Neotropical, Biota-MS Program.

RESUMO. É apresentado um levantamento das espécies de Cerambycidae, Disteniidae e Vesperidae que ocorrem no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Os dados foram baseados na literatura e no acervo da coleção do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. São registradas 229 espécies de Cerambycidae, distribuídas em cinco subfamílias. São registradas duas espécies de Disteniidae e duas de Vesperidae.

PALAVRAS-CHAVE. Lista, Inventário, Neotropical, Programa Biota-MS.

O estudo da sistemática de Cerambycidae e famílias afins é fundamental para profissionais das áreas florestal, frutícola e conservacionista, pois constituem uma família cujas larvas são xilófagas e broqueiam troncos e galhos, podendo causar danos econômicos. Além disso, são fundamentais no processo de decomposição da madeira morta, incorporando ao solo as partes vegetais e permitindo a renovação das florestas através da abertura de espaços e consequente germinação das sementes. Outro ponto importante é que existe uma complexidade de formas e padrões evolutivos que começam a ser explorados e estes padrões estão representados nas relações filogenéticas (NAPP, 1994; LINGAFELTER, 1998; MONNÉ & NAPP, 2005) e biogeográficas (PHILIPS & IVIE, 1998; MONNÉ, 2005).

Este trabalho tem como objetivo fornecer, pela primeira vez, uma lista das espécies de Cerambycidae, Disteniidae e Vesperidae registradas para o estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, com base em dados da literatura e da coleção de Coleoptera do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram estudados os exemplares da coleção de Coleoptera do Museu Nacional, Universidade Federal do

Rio de Janeiro com registro para o estado do Mato Grosso do Sul e a literatura pertinente foi examinada com intuito de complementar o estudo.

A lista é apresentada em ordem alfabética de família, subfamília, tribo, subtribo, gênero e espécie e as referências sob cada espécie restringem-se à descrição original e à dos autores que citaram a espécie para o estado do Mato Grosso do Sul. O item distribuição, em cada espécie, foi obtido de MONNÉ (2005; 2006) e todos os trabalhos posteriores, até julho de 2012. O item material examinado foi incluído quando existia registro na coleção do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sigla utilizada no texto: MNRJ, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

RESULTADOS

São registradas 229 espécies de Cerambycidae, em cinco subfamílias. A subfamília Cerambycinae foi a que apresentou mais registros, 166 espécies, seguida de Lamiinae com 57 espécies; em Prioninae registramos apenas quatro espécies: *Prionapterus travassosi* Lane, 1938, *Calocomus morosus* White, 1850, *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857 e *Pyrodes nitidus* (Fabricius, 1787); em Lepturinae apenas *Strangalia melanophthisis* (Berg, 1889); e em Parandrinae

somente *Parandra (Parandra) glabra* (DeGeer, 1774).

Em Disteniidae registramos *Cometes hirticornis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 e *Distenia (Basisvallis) striaticollis* Villiers, 1959, e em Vesperidae *Anoploderma breueri* Lameere, 1912 e *Migdolus spitzii* Lane, 1937.

CERAMBYCIDAE

CERAMBYCINAE

ACHRYSONINI

1. *Achryson maculatum* Burmeister, 1865. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Espírito Santo ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Corumbá, Corumbá (Serra do Urucum); Três Lagoas (Fazenda Canaã, margem esquerda do Rio Sucuriú).

CALLICHROMATINI

2. *Cnemidochroma phyllopoides* (Schmidt, 1924). Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás). Mato Grosso do Sul: Corumbá.

3. *Cnemidochroma phyllopus* (Guérin-Méneville, 1844). Distribuição: Brasil (Bahia a Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones, Santa Fé, Entre Ríos), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá – 400m).

4. *Mionochroma equestre* (Gounelle, 1911). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais ao Rio de Janeiro), Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu) (NAPP & MARTINS, 2009:29).

CERAMBYCINI

CERAMBYCINA

5. *Hamaticherus bellator* Audinet-Serville, 1834. Distribuição: Equador, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Brasil (Amazonas, Pará, Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo). Mato Grosso do Sul - Miranda (Salobra).

6. *Plocaederus confusus* Martins & Monné, 2002. Distribuição: Brasil (Ceará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Paraná), Bolívia.

Mato Grosso do Sul - Bataguassu (Rio Caraguatá – 400m); Brasilândia (Rio Taquarussu).

SPHALLOTTRICHINA

7. *Coleoxestia cinnamomea* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Paraguai, Argentina (Corrientes, Entre Ríos). Mato Grosso do Sul: Maracaju; Porto Murtinho (MARTINS & MONNÉ, 2005:148).

8. *Coleoxestia corvina* (Germar, 1824). Distribuição: Brasil (Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Pernambuco ao Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Chaco, Corrientes), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Costa Rica (Fazenda Santo Antônio); Coxim; Miranda (Salobra); Porto Murtinho (MARTINS & MONNÉ, 2005:131).

9. *Coleoxestia denticornis* (Gahan, 1892). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: Porto Murtinho (MARTINS & MONNÉ, 2005:152).

10. *Coleoxestia ebenina* Melzer, 1935. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo), Bolívia, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Porto Murtinho (Fazenda Várzea Alegre) (localidade-tipo) (MARTINS & MONNÉ, 2005:149).

11. *Coleoxestia pubicornis* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco ao Rio Grande do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Porto Murtinho (MARTINS & MONNÉ, 2005:174).

12. *Criodion torticolle* Bates, 1870. Distribuição: Colômbia, Venezuela, Peru, Guiana Francesa, Brasil (Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Bolívia, Paraguai, Argentina (Formosa, Santiago del Estero). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (MARTINS & MONNÉ, 2005:203).

13. *Poeciloxestia lanei* Fragoso, 1978. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Ladário. Material examinado: BRASIL, Mato Grosso do Sul: Ladário, ♂ (holótipo), X.1969, A. Azevedo col. (MNRJ).

14. *Poeciloxestia parallela* Fragoso, 1978. Distribuição: Brasil (Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais a São Paulo). Mato Grosso do Sul: Costa Rica (MARTINS & MONNÉ, 2005:99).

15. *Poeciloxestia suturalis* (Perty, 1832). Distribuição: Brasil (Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Porto Murtinho (MARTINS & MONNÉ, 2005:94).

CLYTINI

16. *Cotyclytus curvatus* (Germar, 1821). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu) (MARTINS & GALILEO, 2011:138).

17. *Megacyllene acuta* (Germar, 1821). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Mendoza, Santa Fé, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Bataporã (Porto Primavera); Caarapó (Fazenda Pai Cué); Corumbá (Santa Branca); Iguatemi; Nova Andradina; Três Lagoas (Fazenda Floresta) (MARTINS & GALILEO, 2011:28).

COMPSOCERINI

18. *Aglaoschema dulce* (Napp & Martins, 1988). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul); Bolívia. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Urucum) (localidade-tipo).

19. *Aglaoschema ventrale* (Germar, 1824). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Dourados (NAPP, 2007a:802)

20. *Chlorethe brachyptera* Zajciw, 1963. Distribuição - Brasil (Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá – 400m). Material examinado: BRASIL, Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá – 400m, 21°48' B 52°27' L), ♂ (parátipo), II.1953, F. Plaumann col.; ♀ (parátipo), XII.1953, mesma localidade e coletor (MNRJ).

21. *Chlorethe scabrosa* Zajciw, 1963. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul), Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá – 400m). Material examinado: BRASIL, Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá – 400m, 21°48' B 52°27' L), ♂ e 4 ♀ (parátipos) III.1953 F. Plaumann col. (MNRJ).

22. *Cosmoplatidius simulans* (Bates, 1870). Distribuição: Equador, Peru, Brasil (Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Corumbá (NAPP & MARTINS, 2006:472).

23. *Orthostoma abdominale* (Gyllenhal, 1817). Distribuição: Colômbia, Equador, Peru, Brasil (Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Santiago del Estero, Misiones). Mato Grosso do Sul: Três Lagoas (Fazenda Beija-Flor).

DIORINI

24. *Diorus biapiculatus* White, 1853. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

EBURIINI

25. *Beraba cheilaria* (Martins, 1967). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil) (localidade-tipo).

26. *Cupanoscelis heteroclitia* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo), Bolívia, Paraguai, Argentina (Santiago del Estero, Córdoba). Mato Grosso do Sul: Três Lagoas (Fazenda Beija-Flor).

27. *Eburella pumicosa* Monné & Martins, 1973. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo); Porto Murtinho (Joaquim Murtinho); Selvíria (Fazenda da Uesnp).

28. *Eburodacrys assimilis* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Três Lagoas (Fazenda Beija-flor), Fazenda Yamaguti, Córrego da Onça.

29. *Eburodacrys crassimana* Gounelle, 1909. Distribuição: Suriname, Brasil (Pará, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí a Santa Catarina), Bolívia, Paraguai, Argentina (Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Chaco). Mato Grosso do Sul: Coxim; Miranda (Salobra).
30. *Eburodacrys cunusaia* Martins, 1997. Distribuição: Brasil (Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Bahia, Minas Gerais), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
31. *Eburodacrys dubitata* White, 1853. Distribuição: Brasil (Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Misiones, Buenos Aires), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Três Lagoas (Fazenda Beija-Flor).
32. *Eburodacrys elegantula* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Porto Murinho (Joaquim Murinho).
33. *Eburodacrys flexuosa* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba a São Paulo), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Chaco). Mato Grosso do Sul: Campo Grande; Miranda (Salobra).
34. *Eburodacrys fortunata* Lameere, 1884. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Piauí a Santa Catarina), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
35. *Eburodacrys havanensis* Chevrolat, 1862. Distribuição: Cuba, México a Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Bolívia, Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Piauí a Santa Catarina), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
36. *Eburodacrys punctipennis* White, 1853. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia ao Paraná), Paraguai. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.
37. *Eburodacrys sexmaculata* (Olivier, 1790). Distribuição: Venezuela, Equador, Suriname, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Bolívia, Brasil (Amazonas ao Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.
38. *Eburodacrys stahli* Aurivillius, 1893. Distribuição: Bolívia, Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Minas Gerais ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Argentina (Misiones), Paraguai, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
39. *Eburodacrys truncata* Fuchs, 1956. Distribuição: Brasil (Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí ao São Paulo), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá) (localidade-tipo); Caarapó (Santa Luzia, ex-Juti); Miranda (Salobra).
40. *Eburodacrys tuberosa* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo), Argentina. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
41. *Eburodacrys vittata* (Blanchard, 1846). Distribuição: Brasil (Paraíba a Santa Catarina, Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
42. *Erosida formosa* (Blanchard, 1846). Distribuição: Brasil (Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum).
43. *Erosida lineola* (Fabricius, 1781). Distribuição: Brasil (Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais a Santa Catarina), Paraguai, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Miranda (Salobra).
44. *Pronuba lenkoi* Monné & Martins, 1974. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum) (localidade-tipo).
45. *Susucanga octoguttata* (Germar, 1821). Distribuição: Peru, Brasil (Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Misiones). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
46. *Uncieburia nigricans* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Piauí, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

ECTENESSINI

47. *Ectenessa argodi* Belon, 1902. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo). Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum); Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil).
48. *Ectenessa guttigera* (Lucas, 1857). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
49. *Ectenessa ocellata* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Piauí, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Coxim; Porto Murinho; Miranda (Salobra).
50. *Ectenessa quadriguttata* (Burmeister, 1865). Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná), Bolívia, Argentina (Salta, Tucumán). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil).
51. *Ectenessa villardi* Belon, 1902. Distribuição: Brasil (Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Corumbá.
52. *Ectenessidia nigriventris* (Belon, 1902). Distribuição: Bolívia, Brasil (Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum); Miranda (Salobra); Porto Murinho.
53. *Ectenessidia varians* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Maranhão, Piauí ao Goiás e Mato Grosso do Sul e Minas Gerais a São Paulo), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
54. *Eurymerus eburioides* Audinet-Serville, 1833. Distribuição: Brasil (Pernambuco, Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina (Salta a San Juan e Buenos Aires). Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.
55. *Tricheurymerus quadristigma* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Rondônia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Guiana Francesa, Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Buenos Aires). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil).

ELAPHIDIINI

56. *Ambonus distinctus* (Newman, 1840). Distribuição: Guiana Francesa, Brasil (Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Misiones, Tucumán a San Luis), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Mutum), (Rio Taquarussu); Miranda (Salobra); Três Lagoas (Fazenda Beija-flor) (MARTINS, 2005b:274).
57. *Ambonus electus* (Gahan, 1903). Distribuição: Colômbia, Suriname, Brasil (Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba a Santa Catarina), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Jujuy, Córdoba). Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum); Três lagoas (Fazenda Canaã) (MARTINS, 2005b:277).
58. *Ambonus interrogationis* (Blanchard, 1846). Distribuição: Brasil (Amazonas, Maranhão, Ceará ao Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Corumbá (Serra do Urucum); Miranda (Salobra); Três Lagoas (Fazenda Beija-Flor) (MARTINS, 2005b:280).
59. *Appula eduardae* Franceschini, 2002. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás). Mato Grosso do Sul: Porto Murinho (MARTINS, 2005b:45).
60. *Appula lateralis* (White, 1853). Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia a Santa Catarina). Mato Grosso do Sul: Bataguassú; Brasilândia (Rio Taquarussu).
61. *Eurysthea hirta* (Kirby, 1818). Distribuição: Brasil (Paraíba ao Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Dourados (MARTINS, 2005b:349).
62. *Mallocera umbrosa* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais a São Paulo), Bolívia, Paraguai, Argentina (Jujuy). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (MARTINS, 2005b:60).

63. *Pantonyssus bitinctus* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (MARTINS, 2005b:149).
64. *Periboeum acuminatum* (Thomson, 1861). Distribuição: Brasil (Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais a Santa Catarina), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Três Lagoas (MARTINS, 2005b:227).
65. *Periboeum ocellatum* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.
66. *Periboeum paucispinum* (Lameere, 1890). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Paraná), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu) (MARTINS, 2005b:238).
67. *Periboeum piliferum* (Erichson, 1847). Distribuição: Peru, Guiana Francesa, Brasil (Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais ao São Paulo), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Porto Murtinho (MARTINS, 2005b:240).
68. *Periboeum terminatum* (Perroud, 1855). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina. Mato Grosso do Sul: Ponta Porã (MARTINS, 2005b:244).
69. *Periboeum umbrosum* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (MARTINS, 2005b:245).
70. *Piezophidion intricatum* Galileo & Martins, 1992. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Selvíria (Fazenda da UNESP) (MARTINS, 2005b:91).
71. *Sphaerioeme rubristerna* Martins & Napp, 1992. Distribuição: Suriname, Brasil (Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná). Mato Grosso do Sul: Coxim; Rio Brilhante (MARTINS, 2005b:293).
72. *Sphaerion inerme* White, 1853. Distribuição - Brasil (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Jujuy, Salta), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Bodoquena; Corumbá (Serra do Urucum); Miranda (Salobra); Porto Murtinho (MARTINS, 2005b:110).
73. *Sphaerion lentiginosum* Berg, 1889. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Argentina (Córdoba, Corrientes), Paraguai, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (MARTINS, 2005b:113).
74. *Sphaerion sladeni* Gahan, 1903. Distribuição: Brasil (Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum) (MARTINS, 2005b:114).
75. *Stizocera armata* Audinet-Serville, 1834. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Argentina. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (MARTINS, 2005b:162).
76. *Stizocera consobrina* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Bahia ao Rio Grande do Sul), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum) (MARTINS, 2005b:164).
77. *Stizocera elegantula* (Perroud, 1855). Distribuição: Colômbia, Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia ao Rio de Janeiro), Paraguai. Mato Grosso do Sul – Brasilândia (Rio Taquarussu) (MARTINS, 2005b:169).
78. *Stizocera lissnota* (Bates, 1870). Distribuição: Panamá?, Brasil (Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás), Guiana Francesa, Bolívia. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum) (MARTINS, 2005b:176).
79. *Stizocera tristis* (Guérin-Méneville, 1844). Distribuição: Brasil (Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo), Bolívia, Paraguai, Argentina. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum); Miranda (Salobra) (MARTINS, 2005b:195).

HESPEROPHANINI

80. *Anoplomerus buqueti* Belon, 1890. Distribuição: Brasil (Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo), Paraguai, Argentina (Formosa), Uruguai?. Mato Grosso

do Sul: Corumbá (Serra do Urucum); Costa Rica (Fazenda Santo Antonio); Miranda (Salobra).

81. *Eusapia amazonica* (White, 1855). Distribuição: Guiana Francesa, Suriname, Brasil (Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais a Santa Catarina), Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

82. *Phrynocris notabilis* Bates, 1867. Distribuição: Costa Rica, Guiana Francesa, Brasil (Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil).

HETEROPSINI

83. *Allodemus tricolor* (Perty, 1832). Distribuição: Brasil (Paraíba a São Paulo, Mato Grosso do Sul), Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

84. *Chrysoprasis aeneiventris* Bates, 1870. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Jujuy, Tucumán), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Dourados.

85. *Chrysoprasis auriventris auriventris* Redtenbacher, 1867. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Espírito Santo ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu).

86. *Chrysoprasis basalis* Chevrolat, 1859. Distribuição: Brasil (Ceará ao Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso), Bolívia, Paraguai, Argentina. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Porto Murtinho.

87. *Chrysoprasis chalybea* Redtenbacher, 1867. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais ao Paraná). Mato Grosso do Sul: Porto Murtinho; Três Lagoas.

88. *Chrysoprasis collaris* Chevrolat, 1859. Distribuição: Brasil (Espírito Santo, Mato Grosso do Sul), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Dourados.

89. *Chrysoprasis concolor* Redtenbacher, 1867. Distribuição: Brasil (Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Misiones, Catamarca, Salta, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Dourados.

90. *Chrysoprasis nigrina* Bates, 1870. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Bahia ao São Paulo). Mato Grosso do Sul: Dourados.

91. *Chrysoprasis sapphirina* Gounelle, 1911. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Rio Paraná.

92. *Chrysoprasis valida* Bates, 1870. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Minas Gerais a Santa Catarina), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Dourados.

HEXOPLONINI

93. *Hexoplon praetermissum* Bates, 1870. Distribuição: Colômbia, Brasil (Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco ao Espírito Santo). Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu) (MARTINS, 2006:109).

94. *Stenygra conspicua* (Perty, 1832). Distribuição: Brasil (Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones, Corrientes). Mato Grosso do Sul: Corumbá (Fazenda Santa Blanca) (MARTINS, 2006:36).

95. *Tetroplon caudatum caudatum* Aurivillius, 1899. Distribuição: Peru (?), Brasil (Amazonas (?), Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo a Santa Catarina), Paraguai, Argentina (Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes). Mato Grosso do Sul: Corumbá, Corumbá (Serra do Urucum); Sidrolândia (Vacaria); Três Lagoas (Fazenda Beija-flor). (Rio Paraná).

METHIINI

96. *Methia fischeri* Melzer, 1923. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Espírito Santo ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Tucumán). Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum). Miranda (Salobra). NEOCORINI

97. *Neocorus ibidionoides* (Audinet-Serville, 1834). Distribuição: Guiana Francesa, Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Misiones).

Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Três Lagoas (Fazenda Beija-flor) (MARTINS, 2005a:246).

NEOIBIDIONINI

NEOIBIDIONINA

98. *Coleroidion leucotrichum* (Martins, 1960). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Argentina (Formosa, Chaco). Mato Grosso do Sul: Bodoquena; Corumbá; Miranda (Salobra) (localidade-tipo) (MARTINS & GALILEO, 2007:213)

99. *Compsibidion campestre* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba a Minas Gerais e São Paulo), Bolívia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero). Mato Grosso do Sul: Bodoquena; Corumbá (Serra do Urucum); Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil).

100. *Compsibidion crassipede* Martins, 1971. Distribuição: Brasil (São Paulo, Mato Grosso do Sul), Paraguai, Argentina (Salta). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil) (localidade-tipo).

101. *Ophthalmibidion luscum* Martins, 1971. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Espírito Santo). Mato Grosso do Sul: Corumbá (localidade-tipo).

COMPSINA

102. *Hadroibidion pullum* (Martins, 1962). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul).

Mato Grosso do Sul: Campo Grande. Material examinado: BRASIL, Mato Grosso do Sul: Campo Grande, ♂ (holótipo), 9.X.1952, M. Alvarenga col. (MNRJ).

103. *Heterachthes flavicornis* (Thomson, 1865). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá - 21°48'S, 52°27'W, 400m).

104. *Kolonibidion femoratum* (Martins, 1971). Distribuição: Brasil (Maranhão, Mato Grosso do Sul), Bolívia, Argentina (Chaco). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

105. *Neocompsa serrana* (Martins, 1962). Distribuição: Brasil (Alagoas, Mato Grosso do Sul), Argentina (Chaco). Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum).

TROPIDINA

106. *Diasporidion argentinense* (Martins, 1962). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia, Argentina (Jujuy). Mato Grosso do Sul: Bodoquena.

107. *Diasporidion duplicatum* (Gounelle, 1909). Distribuição: México (Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas) ao Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Brasil (Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil).

108. *Gnomibidion translucidum* (Martins, 1960). Distribuição: Guiana Francesa, Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil) (localidade-tipo).

109. *Perissomerus hilairei hilairei* Gounelle, 1909. Distribuição: Peru, Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum).

110. *Perissomerus hilairei bimaculatus* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Bahia ao Paraná). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá - 21°48'S, 52°27'W, 400m).

111. *Thoracibidion flavopictum* (Perty, 1832). Distribuição: Brasil (Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte a Santa Catarina), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta). Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Corumbá; Coxim; Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil); Três Lagoas (Fazenda Beija-Flor).

112. *Tropidion castaneum* Martins, 1968. Distribuição: Brasil (Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil) (localidade-tipo).

113. *Tropidion flavipenne* (Martins, 1964). Distribuição - Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).

114. *Tropidion inerme* (Martins, 1962). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro ao Paraná). Mato Grosso do Sul - Bataguassu (Rio Caraguatá - 21°48'S, 52°27'W, 400m).

115. *Tropidion signatum punctatum* Martins, 1968. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: Aquidauana; Corumbá (localidade-tipo), (Serra do Urucum); Três Lagoas (Fazenda Yamaguti).

116. *Tropidion zonapterum* (Martins, 1962). Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum); Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil); Três Lagoas (Fazenda Yamaguti - Córrego da Onça), (Fazenda Dr. José Mendes).

OBRINI

117. *Obrium cicatricosum* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Chaco, Tucumán). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Três Lagoas (Fazenda Beija-Flor).

118. *Obrium multifarium* Berg, 1889. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Paraguai, Argentina (Salta, Catamarca, Misiones). Mato Grosso do Sul: Porto Murinho; Três Lagoas (Fazenda Yamaguti - Córrego da Onça).

119. *Obrium vicinum* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta). Mato Grosso do Sul - Miranda (Salobra); Porto Murinho.

OEMINI

OEMINA

120. *Aponoeme castanea* Martins & Galileo, 1997. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Três Lagoas (Horto Barra do Moeda, Três Lagoas Agroflorestal).

121. *Argentinoeme schulzi* Bruch, 1911. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Córdoba). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra - Estrada de Ferro Noroeste do Brasil).

122. *Macroeme priapica* (Thomson, 1857). Distribuição: Brasil (Pará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina (Salta, Tucumán a Buenos Aires). Mato Grosso do Sul: Coxim; Miranda (Salobra); Três Lagoas.

123. *Macroeme sobrina* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Coxim.

124. *Neoeme bouvieri* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná), Guiana Francesa, Peru, Bolívia. Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá - 21°48'S, 52°27'W, 400m).

125. *Sphagoeme aurivillii* Gounelle, 1909. Distribuição: Brasil (Maranhão, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais ao Paraná), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

126. *Temnopis castanea* Martins, 1978. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais), Bolívia, Argentina (Salta). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

METHIOLIDINA

127. *Methioeme brevipennis* Zajciw, 1963. Distribuição: Brasil (Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo). Mato Grosso do Sul: Camapuã.

PIEZOCERINI

PIEZOCERINA

128. *Gorybia pilosa* Martins, 1976. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

129. *Gorybia ruficauda* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá - 21°48'S, 52°27'W, 400m); Brasilândia (Fazenda Barma), (Rio Taquarussu); Camapuã; Miranda (Salobra); Porto Murinho.

130. *Gorybia suturella* Martins, 1976. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão), Guiana Francesa, Bolívia. Mato Grosso do Sul: Coxim.

131. *Piezarina smaragdina* Martins, 1976. Distribuição: Costa Rica, Panamá, Brasil (Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal), Guiana Francesa. Mato Grosso do Sul: Coxim.

132. *Piezocera costula* Martins, 1976. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Corumbá; Três Lagoas (Horto Barra do Moeda, Três Lagoas Agroflorestal).

133. *Thyellocerus fulgidipennis* (Gounelle, 1909). Distribuição: Brasil (Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Misiones). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

PTEROPLATINI

134. *Deltosoma xerophila* Di Iorio, 1995. Distribuição: Brasil (São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Maranhão), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba). Mato Grosso do Sul: Três Lagoas (Horto Barra do Moeda) (MARTINS & NAPP, 2006).

RHINOTRAGINI

135. *Eclipta nigriventris* (Melzer, 1934). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Santa Catarina). Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

136. *Epimelitta triangularis* Fuchs, 1961. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá) (localidade-tipo).

137. *Ischasioides crassitarsis* (Gounelle, 1911). Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá).

138. *Odontocera globicollis* Zajciw, 1971. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul).

Mato Grosso do Sul: Nhambiquara. Material examinado: BRASIL, Mato Grosso do Sul: Nhambiquara, ♀ (holótipo), IX-1960, M. Alvarenga col. (MNRJ).

139. *Tomopterus larroides* White, 1855. Distribuição: Trinidad e Tobago, Brasil (Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Tucumán, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos), Uruguai. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

140. *Tomopterus quadratipennis* Bates, 1873. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Bahia a Santa Catarina). Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

RHOPALOPHORINI

141. *Cosmisoma chalybeipenne* Zajciw, 1962. Distribuição: Brasil (São Paulo, Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá).

142. *Cosmisoma cyaneum rubriventre* Monné & Magno, 1988. Distribuição: Brasil (Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), Paraguai, Argentina. Mato Grosso do Sul: Campo Grande (Guaicurus); Maracaju.

143. *Dirocoremia simplicipes* (Gounelle, 1911). Distribuição: Brasil (Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta). Mato Grosso do Sul: Bodoquena.

144. *Haenkea atra* (Chevrolat, 1855). Distribuição: Brasil (Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Dourados.

145. *Ischionodonta smaragdina* (Martins & Napp, 1989). Distribuição: Brasil (Espírito Santo, Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Dourados.

146. *Parozodes pilosus* Fuchs, 1956. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá) (localidade-tipo).

TILLOMORPHINI

147. *Epropetes metallica* Martins, 1975. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá – 21°48'S, 52°27'W, 400m) (localidade-tipo).

TORNEUTINI

148. *Praxithea borgmeieri* Lane, 1938. Distribuição: Guiana Francesa, Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais). Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

149. *Praxithea travassosi* Lane, 1939. Distribuição: Costa Rica,

Venezuela, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Brasil (Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).

150. *Psygmatoцерus wagneri* Perty, 1828. Distribuição: Brasil (Maranhão, Alagoas ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Misiones, Tucumán, Chaco, Corrientes). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

TRACHYDERINI

TRACHYDERINA

151. *Andraegoidus rufipes* (Fabricius, 1787). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

152. *Andraegoidus fabricii* Dupont, 1838. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão ao Espírito Santo e São Paulo), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Bodoquena; Miranda (BOTERO & MONNÉ, 2012).

153. *Andraegoidus variegatus* (Perty, 1832). Distribuição: Brasil (Pará, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Ceará ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Bodoquena; Miranda (BOTERO & MONNÉ, 2012).

154. *Batus hirticornis* (Gyllenhal, 1817). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

155. *Martinsellus signatus* (Gyllenhal, 1817). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

156. *Metopocoilus corumbaensis* Lane, 1956. Distribuição: Brasil (Pará, Tocantins, Mato Grosso, Paraíba, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Corumbá (localidade-tipo).

157. *Neochrysopraxis zajciwi* Franz, 1969. Distribuição: Bolívia, Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Paraguai. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

158. *Oxymerus aculeatus aculeatus* Dupont, 1838. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia ao São Paulo, Paraná). Mato Grosso do Sul: Aquidauana (QUINTINO *et al.*, 2010:365).

159. *Oxymerus aculeatus meridionalis* Huedepohl, 1979. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fé, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

160. *Oxymerus bruchi bruchi* Gounelle, 1913. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Chaco). Mato Grosso do Sul: Sem localidade específica para o estado.

161. *Oxymerus luteus luteus* (Voet, 1778). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Espírito Santo ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Santa Fé, Misiones, Chaco). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá).

162. *Retrachydes thoracicus thoracicus* (Olivier, 1790). Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Sem localidade específica para o estado.

163. *Retrachydes thoracicus sulcatus* (Burmeister, 1865). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Guaicurus); Miranda.

164. *Trachelissa maculicollis* (Audinet-Serville, 1834). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

165. *Trachyderes (Trachyderes) succinctus melzeri* Schwarzer, 1929. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Paraguai, Argentina (Salta, Chaco, Corrientes). Mato Grosso do Sul: Corumbá; Miranda, Miranda (Salobra).

UNXIINI

166. *Parunxia scopifera* (Klug, 1825). Distribuição: Brasil (Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Dourados (NAPP, 2007b:315).

LAMIINAE

ACANTHOCININI

167. *Lepturgantes prolatus* Monné & Monné, 2008. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Corumbá (Serra do Urucum) (MONNÉ & MONNÉ, 2008).
168. *Paratenthras martinsi* Monné, 1998. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

ACANTHODERINI

169. *Alphus similis* Martins, 1985. Distribuição: Brasil (Bahia ao Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Formosa). Mato Grosso do Sul: Bataguassu.
170. *Nesozineus bucki* (Breuning, 1954). Distribuição: México, Guatemala ao Panamá, Brasil (Mato Grosso do Sul, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.
171. *Nesozineus lineolatus* Galileo & Martins, 1996. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Maranhão, Alagoas, Sergipe), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Três Lagoas (Porto Rio Verde) (localidade-tipo).
172. *Nesozineus triviale* Galileo & Martins, 1996. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia a Santa Catarina), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu).
173. *Oreodera occulta* Monné & Fragoso, 1988. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia, Argentina (Formosa). Mato Grosso do Sul: Miranda. Material examinado: BRASIL, Mato Grosso do Sul: Miranda, ♂ (holótipo), X.1942, H. Zellibor col. (MNRJ).
174. *Psapharochrus plaumanni* (Fuchs, 1958). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Santa Catarina), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá) (MONNÉ & MONNÉ, 2006).
175. *Steirastoma genisspina* Schwarzer, 1923. Distribuição: Equador, Guiana Francesa, Brasil (Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Corumbá.

AERENICINI

176. *Aerenica canescens* (Klug, 1825). Distribuição: Brasil (Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Jujuy, Chaco, Misiones). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Porto Murtinho.
177. *Aerenicopsis perforata* Lane, 1939. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba a Santa Catarina), Guiana Francesa, Bolívia, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).
178. *Arenomera boliviensis* Gilmour, 1962. Distribuição: Bolívia, Brasil (Pernambuco, Paraíba, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo.), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Ponta Porã; Porto Murtinho.
179. *Antodilanea modesta* (Lane, 1939). Distribuição: Brasil (Minas Gerais, Mato Grosso do Sul), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).
180. *Eponina flava* Lane, 1939. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).
181. *Holoaerenica punctata* (Gilmour, 1962). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, São Paulo), Bolívia, Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
182. *Hoplistonychus bondari* Melzer, 1930. Distribuição: Guiana Francesa, Peru, Brasil (Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo), Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
183. *Phaula atyroa* Galileo & Martins, 2007. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Selvíria (localidade-tipo).
184. *Phaula bullula* Martins, 1984. Distribuição: Brasil (Mato

Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Maracaju (localidade-tipo).
185. *Phaula microsticta* (Lane, 1973). Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná), Argentina (Formosa). Mato Grosso do Sul: Costa Rica (Fazenda Santo Antônio).

186. *Phaula thomsoni* Lacordaire, 1872. Distribuição: Brasil (Pará ao Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Minas Gerais ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Corumbá (Fazenda Santa Blanca).

187. *Pseudomecas femoralis* Aurivillius, 1920. Distribuição: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo), Paraguai, Argentina (Santiago del Estero, Córdoba). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Três Lagoas.

188. *Recchia acutipennis* (Gahan, 1889). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Porto Murtinho (Várzea Alegre).

189. *Recchia albicans* (Guérin-Méneville, 1831). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais a Santa Catarina), Bolívia, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu).

190. *Recchia distincta* (Lane, 1939). Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Jujuy, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Santa Fé). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).

191. *Recchia flaveola* Martins & Galileo, 1985. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Porto Murtinho.

192. *Recchia gemignanii* (Lane, 1939). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná), Bolívia, Paraguai, Argentina (Chaco, Tucumán). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).

193. *Recchia goiana* Martins & Galileo, 1985. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo), Bolívia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: Aquidauana.

194. *Recchia hirticornis* (Klug, 1825). Distribuição: Venezuela, Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Brasilândia (Rio Taquarussu); Campo Grande; Miranda (Salobra).

195. *Recchia moema* Martins & Galileo, 1998. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul), Argentina (Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).

196. *Recchia parvula* (Lane, 1938). Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Aquidauana.

197. *Recchia piriana* Martins & Galileo, 1998. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul), Paraguai. Mato Grosso do Sul: Porto Murtinho (localidade-tipo).

198. *Recchia procera* Martins & Galileo, 1985. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais ao Rio Grande do Sul), Bolívia, Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguatá).

AGAPANTHIINI

199. *Hippopsis (Hippopsis) prona* Bates, 1866. Distribuição: Equador, Peru, Brasil (Amazônia, Goiás, Maranhão, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais ao Paraná), Bolívia, Paraguai, Argentina (Chaco). Mato Grosso do Sul: sem localidade específica para o estado.

200. *Trichohippopsis magna* Martins & Carvalho, 1983. Distribuição: Brasil (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).

APOMECYNINI

201. *Catuaba sanguinolenta* Martins & Galileo, 2003. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Sidrolândia (Vacaria) (localidade-tipo).

202. *Ptericoptus corumbaensis* Galileo & Martins, 2003. Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Corumbá (localidade-tipo).

203. *Ptericoptus dorsalis* Audinet-Serville, 1835. Distribuição:

- Brasil (Pará, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), Bolívia. Mato Grosso do Sul: Rio Paran.
- CALLIINI**
204. *Callia cyanea* Melzer, 1931. Distribuio: Brasil (Gois, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais). Mato Grosso do Sul: Sidrolndia (Vacaria).
205. *Callisema rufipes* Martins & Galileo, 1990. Distribuio: Brasil (Rondnia, Maranho, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Gois, Minas Gerais, Esprito Santo, So Paulo), Bolvia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra); Trs Lagoas.
- COMPSOSOMATINI**
206. *Aerenea quadriplagiata* (Boheman, 1859). Distribuio: Brasil (Gois, Mato Grosso do Sul, So Paulo ao Rio Grande do Sul), Bolvia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Campo Grande; Miranda, Miranda (Salobra); Porto Murtinho.
- DESMIPHORINI**
207. *Acaua exotica* Martins & Galileo, 1995. Distribuio: Brasil (Par, Mato Grosso do Sul), Peru, Bolvia. Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).
208. *Cicatrisesstola flavicans* Breuning, 1947. Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul, Santa Catarina), Bolvia, Paraguai, Argentina (Chaco, Formosa). Mato Grosso do Sul: sem localidade especfica para o estado.
209. *Cicuiara striata* (Bates, 1866). Distribuio: Venezuela, Brasil (Par, Mato Grosso do Sul, Gois, Minas Gerais), Bolvia. Mato Grosso do Sul: Corumb (Serra do Urucum).
210. *Cotycicuiara multifasciata* Galileo & Martins, 2008. Distribuio: Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais). Mato Grosso do Sul: Corumb (Serra do Urucum) (localidade-tipo) (GALILEO & MARTINS, 2008:3).
211. *Euestola basidensepunctata* Breuning, 1943. Distribuio: Brasil (Maranho, Gois, Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Trs Lagoas (Fazenda Retiro de Telhas).
212. *Stereomerus lineatus* (Breuning, 1940). Distribuio: Brasil (Gois, Mato Grosso do Sul, Bahia, So Paulo), Bolvia. Mato Grosso do Sul: Trs Lagoas (Fazenda Beija-Flor).
- HEMILOPHINI**
213. *Adesmus hemispilus* (Germar, 1821). Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul, Minas Gerais ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Corumb.
214. *Adesmus sexlineatus* (Bates, 1881). Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul, Esprito Santo ao Rio Grande do Sul), Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Corumb.
215. *Canarana marceloi* Martins & Galileo, 1992. Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolvia, Paraguai. Mato Grosso do Sul: Corumb (Serra do Urucum) (localidade-tipo).
- ONCIDERINI**
216. *Cylicasta parallela* (Melzer, 1934). Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolvia, Argentina (Tucumn). Mato Grosso do Sul: Campo Grande (Imbirussu); Corumb.
217. *Hesycha clavata* Martins & Galileo, 1990. Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Dourados (localidade-tipo).
- PHACELLINI**
218. *Neobrachychilus consobrinus* (Lane, 1939). Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolvia, Argentina (Salta). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra) (localidade-tipo).
219. *Piola quiabentiae* Marinoni, 1974. Distribuio: Brasil (Maranho, Mato Grosso do Sul, So Paulo), Bolvia, Paraguai, Argentina (Salta, Formosa). Mato Grosso do Sul: Miranda (Salobra).
- POLYRHAPHIDINI**
220. *Polyrhaphis grandini* Buquet, 1853. Distribuio: Brasil (Gois, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais to Santa Catarina). Mato Grosso do Sul: Ponta Por (SANTOS-SILVA *et al.*, 2010:491).
221. *Polyrhaphis spinipennis* Laporte, 1840. Distribuio: Brasil (Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina, Uruguai. Mato Grosso do Sul: Bataipor (Fazenda Primavera); Miranda (Salobra) (SANTOS-SILVA *et al.*, 2010:474).
- TAPEININI**
222. *Tapeina melzeri* Zajciw, 1966. Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran), Bolvia, Paraguai, Argentina. Mato Grosso do Sul: Bodoquena; Miranda (Salobra).
- XENOFREINI**
223. *Xenofrea anoreina* Tavakilian & Nouze, 2006. Distribuio: Venezuela, Brasil (Par, Gois, Maranho, So Paulo, Mato Grosso do Sul), Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Porto Murtinho (Fazenda Vrzea Alegre) (TAVAKILIAN & NOUZE, 2006:281).
- LEPTURINAE**
- LEPTURINI**
224. *Strangalia melanophthisis* (Berg, 1889). Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul, So Paulo ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones, Entre Ros), Uruguai. Mato Grosso do Sul: Campo Grande.
- PARANDRINAE**
- PARANDRINI**
225. *Parandra (Parandra) glabra* (DeGeer, 1774). Distribuio: Mxico  Argentina, Antilhas (Dominica, Guadalupe, Santa Lcia, So Vicente). Na Amrica do Sul, Trinidad e Tobago, Venezuela, Equador, Colmbia, Peru, Bolvia, Brasil (Amazonas, Par, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Esprito Santo, Rio de Janeiro, So Paulo ao Rio Grande do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Cassilndia; Costa Rica (Fazenda Santo Antonio) (SANTOS-SILVA & GALILEO, 2011:22).
- PRIONINAE**
- ANACOLINI**
226. *Prionapterus travassosi* Lane, 1938. Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Maracaj (localidade-tipo).
- CALOCOMINI**
227. *Calocomus morosus* White, 1850. Distribuio: Brasil (Gois, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, So Paulo), Bolvia, Paraguai, Argentina (Jujuy a Rio Negro). Mato Grosso do Sul: Terenos (Jaragu).
228. *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857. Distribuio: Brasil (Gois, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, So Paul), Argentina (Salta, Jujuy). Mato Grosso do Sul: Porto Murtinho; Terenos (Jaragu) (SANTOS-SILVA *et al.*, 2010:69).
- MALLASPINI**
229. *Pyrodes nitidus* (Fabricius, 1787). Distribuio: Brasil (Alagoas ao Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Bataguassu (Rio Caraguat).
- DISTENIIDAE**
- DISTENIINI**
1. *Cometes hirticornis* Lepelletier & Audinet-Serville, 1828. Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul, Bahia a Santa Catarina), Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Bataguassu; Bataipor (Porto Primavera -Rio Paran) (SANTOS-SILVA & MARTINS, 2011:117).
2. *Distenia (Basisvallis) striaticollis* Villiers, 1959. Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: sem localidade especfica para o estado (SANTOS-SILVA & MARTINS, 2011:252).
- VESPERIDAE**
- ANOPLODERMATINAE**
- ANOPLODERMATINI**
1. *Anoploderma breueri* Lameere, 1912. Distribuio: Bolvia, Brasil (Mato Grosso do Sul), Paraguai, Argentina. Mato Grosso do Sul: sem localidade especfica para o estado.
2. *Migdolus spitzii* Lane, 1937. Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul). Mato Grosso do Sul: Coxim; Porto Murtinho; Trs Lagoas (Fazenda Cana, margem esquerda do Rio Sucuri).
- MYSTERIINI**
3. *Pseudopathocerus humboldti* (Lameere, 1912). Distribuio: Brasil (Mato Grosso do Sul), Paraguai, Argentina (Misiones). Mato Grosso do Sul: Campo Grande; Porto Murtinho (localidade-tipo), Porto Murtinho (Vrzea Alegre).

Agradecimentos. À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciências e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) e a Superintendência de Ciências e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Sucitec/MS) pelo convite de participação neste fascículo especial da Iheringia, Série Zoologia e o suporte financeiro para sua publicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOTERO, J. P. & MONNÉ, M. L. 2012. Revision of the genus *Andraegoidus* Aurivillius (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae). *Zootaxa* **3169**:1-60.
- GALILEO, M. H. M. & MARTINS, U. R. 2008. Novo gênero de Desmiphorini com cinco espécies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes* **83**:1-10.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The genera of Elaphidiini Thomson, 1864 (Coleoptera: Cerambycidae). *Memoirs of the Entomological Society of Washington* **20**:1-118.
- MARTINS, U. R. 2005a. Tribo Neocorini. In: MARTINS, U. R. org. **Cerambycidae Sul-americanos (Coleoptera): Taxonomia**. São Paulo, Sociedade Brasileira de Entomologia. Vol. 5, p. 239-270.
- MARTINS, U. R. 2005b. Tribo Elaphidionini. In: MARTINS, U. R. org. **Cerambycidae Sul-americanos (Coleoptera): Taxonomia**. Curitiba, Sociedade Brasileira de Entomologia. Vol. 7., p. 1-393.
- MARTINS, U. R. 2006. Tribo Hexoplonini. In: MARTINS, U. R. org. **Cerambycidae Sul-americanos (Coleoptera): Taxonomia**. São Paulo, Sociedade Brasileira de Entomologia. Vol. 8., p. 21-211.
- MARTINS, U. R. & GALILEO, M. H. M. 2007. Tribo Ibdionini, Subtribo Ibdionina. In: MARTINS, U. R. org. **Cerambycidae Sul-americanos (Coleoptera): Taxonomia**. São Paulo, Sociedade Brasileira de Entomologia. Vol. 9., p. 177-330.
- MARTINS, U. R. & GALILEO, M. H. M. 2011. Subfamília Cerambycinae, Clytini Mulsant, 1839. In: MARTINS, U. R. org. **Cerambycidae Sul-americanos (Coleoptera): Taxonomia**. São Paulo, Sociedade Brasileira de Entomologia. Vol. 12. 264p.
- MARTINS, U. R. & MONNÉ, M. A. 2005. Tribo Cerambycini, Subtribo Sphallotrichina. In: MARTINS, U. R. org. **Cerambycidae Sul-americanos (Coleoptera): Taxonomia**. São Paulo, Sociedade Brasileira de Entomologia. Vol. 5., p. 1-218.
- MARTINS, U. R. & NAPP, D. S. 2006. Notas sobre os gêneros *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). *Iheringia, Série Zoologia* **96**(3):339-344.
- MONNÉ, M. A. 2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. *Zootaxa* **1212**:1-244.
- MONNÉ, M. A. & MONNÉ, M. L. 2008. Synopsis of the Neotropical genus *Lepturgantes* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae) with description of a new species. *Zootaxa* **1876**:60-68.
- MONNÉ, M. L. 2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Coleoptera, Cerambycidae). *Revista Brasileira de Entomologia* **49**(3):369-391.
- MONNÉ, M. L. & MONNÉ, M. A. 2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. *Zootaxa* **1365**:37-47.
- MONNÉ, M. L. & NAPP, D. S. 2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). *Zootaxa* **1062**:1-56.
- NAPP, D. S. 1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera, Chrysomeloidea). *Revista Brasileira de Entomologia* **38**(2):265-419.
- NAPP, D. S. 2007a. Revisão do gênero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). *Revista Brasileira de Zoologia* **24**(3):793-816.
- NAPP, D. S. 2007b. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). *Revista Brasileira de Entomologia* **51**(3):312-340.
- NAPP, D. S. & MARTINS, U. R. 2006. Revisão do gênero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). *Revista Brasileira de Zoologia* **23**(2):471-479.
- NAPP, D. S. & MARTINS, U. R. 2009. Tribo Callichromatini. In: MARTINS, U. R. org. **Cerambycidae Sul-americanos (Coleoptera): Taxonomia**. Curitiba, Sociedade Brasileira de Entomologia. Vol. 10, p. 223-352.
- PHILIPS, T. K. & IVIE, M. A. 1998. The Methiini of the West Indies (Coleoptera: Cerambycidae), with notes on the circum-Caribbean species. *Entomologica Scandinavica* **29**:57-87.
- QUINTINO, H. Y.; BOTERO, J. P. & MONNÉ, M. L. 2010. Insecta, Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderini: new state and country records from South America. *Check List* **6**(3):364-367.
- SANTOS-SILVA, A. & GALILEO, M. H. M. 2011. Sobre alguns Cerambycidae (Coleoptera) das coleções do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e da Universidade Federal do Amazonas (UFAM): Parandrinae, Prioninae e Disteniinae. *Les Cahiers Magellanes* **3**:20-51.
- SANTOS-SILVA, A.; MAL, N. & DRUMONT, A. 2010. Revalidation of *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique* **80**:69-74.
- SANTOS-SILVA, A. & MARTINS, U. R. 2011. Subfamília Disteniinae. In: MARTINS, U. R. org. **Cerambycidae Sul-americanos (Coleoptera): Taxonomia**. São Paulo, Sociedade Brasileira de Entomologia. Vol. 11, p. 80-255.
- SANTOS-SILVA, A.; MARTINS, U. R. & TAVAKILIAN, G. L. 2010. Revisão do gênero *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Papéis Avulsos de Zoologia* **50**(30):451-509.
- TAVAKILIAN, G. L. & NÉOUZE, G. L. 2006. Matériaux pour une revision des Xenofreini II. Espèces nouvelles de Bolivie, Brésil, Equateur et Venezuela. *Coléoptères* **12**(19):271-290.