

# Tratamento de hidradenite supurativa com infliximab

## Treatment of hidradenitis suppurativa with infliximab

Tiago Torres<sup>1</sup>

Manuela Selores<sup>2</sup>

Foi com interesse que lemos o recente artigo publicado por Obadia et al. relatando o insucesso no tratamento de um caso de hidradenite supurativa com infliximab.<sup>1</sup> De facto, recentemente utilizámos infliximab no tratamento de dois doentes com hidradenite supurativa grave, com vários anos de evolução, tratados previamente e sem resultado com antibióticos sistémicos, isotretinoína, dapsona e finasteride. Ambos os doentes apresentavam uma dermatose extensa, activa, com importante perturbação da sua qualidade de vida. O tratamento com infliximab foi efectuado na dose de 5mg/kg às 0, 2, 6 semanas e, posteriormente, de 8-8 semanas, decorrendo sem reacções infusionais. Em ambos os casos, não foi observada qualquer melhoria com o tratamento, pelo que, ao sétimo mês, se decidiu suspender o tratamento por clara falta de resposta.

Têm sido publicados vários casos esporádicos e

igualmente algumas séries pequenas de casos sugerindo que a terapêutica com infliximab poderá ser eficaz no tratamento da hidradenite supurativa.<sup>2,3</sup> Tal como Obadia et al. referiram, o sucesso terapêutico é muito mais apelativo à publicação do que casos de insucesso. Mas se, por um lado, são divulgadas novas formas de tratamento, por outro, poderá criar um viés importante, superestimando a eficácia de certas terapêuticas. A comprovar esta ideia está o facto de não termos equacionado a publicação destes dois casos clínicos referidos.

São necessários mais estudos controlados e com um maior número de doentes em situações similares a esta, além de um incentivo à publicação, também, dos insucessos terapêuticos, de forma a diminuir o viés associado às múltiplas publicações de casos esporádicos. □

\* Trabalho realizado no Serviço de Dermatologia do Hospital de Santo António - Porto, Portugal.  
 Conflito de interesse: Nenhum / *Conflict of interest: None*  
 Suporte financeiro: Nenhum / *Financial funding: None*

<sup>1</sup> Médico do Serviço de Dermatologia do Hospital de Santo António - Porto, Portugal.

<sup>2</sup> Professora regente de Dermatologia da Faculdade de Biomédicas da Universidade do Porto, Portugal; directora de Serviço de Dermatologia do Hospital de Santo António - Porto, Portugal.

### REFERÊNCIAS

1. Obadia DL, Daxbacher ELR, Jeunon T, Gripp AC. Hidradenite supurativa tratada com infliximabe. *An Bras Dermatol.* 2009;84:695-7.
2. Adams DR, Gordon KB, Devenyi AG, Ioffreda MD. Severe hidradenitis suppurativa treated with infliximab infusion. *Arch Dermatol.* 2003;139:1540-3.
3. Fardet L, Dupuy A, Kerob D, Levy A, Allez M, Begon E, et al. Infliximab for severe hidradenitis suppurativa: transient clinical efficacy in 7 consecutive patients. *J Am Acad Dermatol.* 2007;56:624-8.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA / MAILING ADDRESS:

Tiago Torres  
 Rua D. Manuel II s/n, ex-Cicap, Serviço de  
 Dermatologia, 4100  
 Porto, Portugal.  
 e-mail: tiagotorres2002@botmail.com

Como citar este artigo/How to cite this article: Torres T, Selores M. Treatment of hidradenitis suppurativa with infliximab. *An Bras Dermatol.* 2010;85(4):576.