Efeito da aplicação de maturadores químicos na cultura da cana de açúcar (*Saccharum spp.*) variedade SP81-3250

Ronaldo da Silva Viana^{1*}, Pablo Humberto Silva², Miguel Angelo Mutton², Marcia Justino Rossini Mutton², Eduardo Rossini Guimarães² e Marcelo Bento³

¹Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária, Universidade Estadual de São Paulo, Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castelane, s/n, 14884-900, Jaboticabal, São Paulo, Brasil. ²Departamento de Produção Vegetal, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária, Universidade Estadual de São Paulo, Jaboticabal, São Paulo, Brasil. ³Usina São Martinho, Jaboticabal, São Paulo, Brasil. *Autor para correspondência. E-mail: ronaldoviana@click21.com.br

RESUMO. A cana-de-açúcar vem se destacando como uma cultura de grande importância. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar os efeitos de dois maturadores químicos na cultura da cana de açúcar, variedade SP81-3250. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com parcelas subdivididas, quatro repetições, utilizando-se os seguintes tratamentos principais: Testemunha; Aminolon Maduración nas doses de 0,7 L de p.c. ha⁻¹; 1,0 L p.c. ha⁻¹; 1,3 L de p.c. ha⁻¹; Ethyl-trinexapac, na dose de 0,8 L de p.c. ha⁻¹. Os tratamentos secundários constituíram-se das épocas de amostragens: aos 10 dias antes da aplicação (-10 d.a.a.) e 11; 46; 71; 100 e 117 dias após aplicação (d.a.a.). Concluiu-se que os maturadores afetaram diferentemente as características tecnológicas analisadas, observando-se que o ethyl-trinexapac foi o que apresentou melhor comportamento, seguido do Aminolon na dose de 0,7 L de p.c. ha⁻¹. Em relação às épocas, os melhores resultados ocorreram na 3ª e 4ª época de amostragem, respectivamente aos 46 e 71 dias, após a aplicação.

Palavras-chave: matéria prima, deterioração, qualidade tecnológica, índice de maturação, maturadores.

ABSTRACT. Effects on the application of chemical ripeners on the culture of sugarcane (*Saccharum spp.*), SP81-3250 variety. Sugarcane is one of the most important grass crops. This study evaluated the effects of chemical ripeners on the sugarcane variety SP81-3250 in terms of technological quality. The experiment was arranged in randomized blocks with split split-plots. Main treatments were: 1) Control; 2) Aminolon Maduración, at a rate of 0.7 L of commercial product (c.p.) ha⁻¹; 3) Aminolon Maduración, at a rate of 1.0 liter of c.p. ha⁻¹; 4) Aminolon Maduración, at a rate of 1.3 liter of c.p. ha⁻¹; 5) Trinexapac-ethyl (Moddus), at a rate of 0.8 liter of c.p. ha⁻¹. Secondary treatments were the sampling dates: 10 days before application (- 10 d.a.a.); 11; 46; 71; 100 and 117 d.a.a. (days after application). Ripeners differently affected the technological parameters, and trinexapac-ethyl showed the best behavior, followed by Aminolon (0.7 L of c.p. ha⁻¹). The best results were found at the 3rd and 4th sampling dates, 46 and 71 days after application, respectively.

Key words: cane quality, deterioration, technological quality, ripening index, ripeners.

Introdução

A cana-de-açúcar vem se destacando como uma cultura que gera grandes divisas, estendendo-se por milhões de hectares em vários países do mundo. O nosso país é o maior e mais eficiente produtor de açúcar, álcool e subprodutos do mundo. São Paulo com 60% de área plantada no Brasil é o principal produtor seguido de Alagoas, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul (Única, 2005).

Segundo Fernandes (1982), a maturação da cana-de-açúcar é um processo fisiológico que envolve a síntese dos açúcares nas folhas, translocação dos produtos formados e estocagem da sacarose no colmo.

Mutton (1993) define o processo de maturação, do ponto de vista agroindustrial, como aquele estágio de desenvolvimento em que a cultura apresenta melhor produtividade quali-quantitativa de açúcares ou como aquele cuja produtividade agroindustrial e o resultado econômico se encontram maximizados.

Um dos métodos adotados para acelerar e melhorar a maturação é o emprego dos maturadores químicos. Conceitualmente, maturadores são produtos químicos que, em sua maioria, pertencem ao grupo dos reguladores de crescimento, que inibindo a elongação dos colmos sem afetar drasticamente a fotossíntese, favorecem a

acumulação de açúcares nos tecidos de reserva (Castro, 1992).

Por meio de seu emprego procura-se modificar as condições naturais de maturação da cana-de-açúcar, objetivando promover acréscimos dos conteúdos de açúcares sem prejuízos para a produtividade de colmos. Por outro lado, os maturadores químicos favorecem o acúmulo mais uniforme de açúcares nos entrenós da região apical, normalmente, imaturos. Alguns produtos podem acelerar o dessecamento das folhas, possibilitando realizar um desponte mais alto, o que resulta maior produção de colmos, reduzindo o conteúdo de matérias estranhas enviadas para a fábrica e melhora a eficiência global da colheita (Romero et al., 1997).

O produto comercial Moddus, cujo ingrediente ativo é o ethyl-trinexapac, é um fitorregulador que se, aplicado corretamente, e, em época adequada, provoca o acúmulo de sacarose nos colmos, ajudando, assim, o planejamento e a maximização de melhor aproveitamento agroindustrial da cultura de cana-de-açúcar. O ethyl-trinexapac atua no metabolismo da cana, reduz a produção do ácido giberélico, afeta e alarga as paredes celulares, facilitando, assim, maior acumulação de açúcar (Resende et al., 2000).

Zillo (2003), em experimento realizado na Usina Santa Elisa, avaliou os efeitos de vários maturadores na variedade SP80-1816 e constatou que o ethyl-trinexapac contribuiu para a melhoria da maioria dos parâmetros tecnológicos da cana aos 44 e 65 d.a.a., sendo superado apenas em resultados pelo glifosate. Entretanto, o Aminolon Maduracion, composto por polissacarídeos 25% (p/p) e ácidos urônicos 0,2% (p/p), pouco afetou a qualidade tecnológica desta variedade.

Dentro desse enfoque, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar os efeitos de dois maturadores químicos, ethyl-trinexapac e Aminolon Maduracion, aplicados na cultura de cana-de-açúcar variedade SP81-3250.

Material e métodos

O experimento foi instalado na fazenda Porto Pinheiro, pertencente à Usina São Martinho S/A, situada no município de Pradópolis, Estado de São Paulo (latitude 21° 21' 34" S e longitude 48° 03' 56" W). A topografia da área é plana e o solo é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (Embrapa, 1999).

O clima característico da região de Ribeirão Preto-SP é do tipo Cwa (segundo classificação de Köppen), subtropical, com inverno relativamente seco e verão chuvoso e temperatura média anual de 25°C.

A variedade utilizada foi a SP81-3250; no plantio utilizou-se de 500 kg do adubo mineral 5-25-25 por hectare no sulco e 1,5 L ha⁻¹ do produto comercial Boral, aplicados em pré-emergência, para o controle de plantas daninhas. Na soqueira subsequente, utilizou-se a aplicação convencional de vinhaça por aspersão, num montante de 90 m³ ha⁻¹, o que forneceu aproximadamente 320 kg de K₂O por hectare. Efetuou-se, também, um complemento com adubo mineral na fórmula 32-00-02, ao redor de 400 kg ha⁻¹. No controle de plantas daninhas, utilizou-se o produto comercial Plateau, na dosagem de 200 g ha⁻¹, com aplicação em área total logo após o corte da área ser efetuado.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com parcelas subdivididas, segundo Banzato e Kronka (1992) com 4 repetições (blocos), dos quais as 5 parcelas (tratamentos principais) foram com os produtos empregados como maturadores e, como subparcelas (tratamentos secundários), as 6 épocas de amostragem do ensaio, de março a julho de 2003. Cada parcela possuía 6 linhas espaçadas de 1,50 m entre si, por 20 m de comprimento. As duas linhas laterais foram tomadas como bordadura, coletando-se, então, as amostras das 4 linhas centrais.

Os tratamentos principais (maturadores) utilizados no experimento foram: Testemunha, Aminolon Maduracion, composto por polissacarídeos 25% (p/p) e ácidos urônicos 0,2% (p/p), aplicados nas dosagens de 0,7, 1,0 e 1,3 L de produto comercial ha⁻¹ e Ethyl trinexapac ou 4-Ciclopropil (Hidroxi) Metileno – 3,5-dioxociclohexanocarboxilato de etila, produto comercial Moddus, 250 g de ingrediente ativo L⁻¹, aplicado na dosagem de 0,8 L de p.c. ha⁻¹.

A aplicação dos maturadores químicos foi realizada, em março de 2003, utilizando-se pulverizador com CO₂ pressurizado, em cuja barra metálica se acoplou os bicos de pulverização tipo TK 0.5, com vazão de 320 mL bico⁻¹ minuto⁻¹, distribuídos de modo a se ter um bico por linha aplicada. Essa barra era colocada horizontalmente apoiada sobre outras duas barras verticais, que mantinham a barra pulverizadora a ± 50 cm acima do nível da cultura. Cada barra vertical era conduzida por uma pessoa que carregava o tanque de calda e o de ar comprimido, deslocando-se entre as linhas da parcela. A pressão utilizada foi de 40 libras polegada⁻² com um volume de calda de 35 L ha⁻¹.

Para se realizar a pulverização, tinha-se a precaução de que, no momento, não ocorressem ventos, a temperatura estivesse ao redor de 25-30°C

e a umidade relativa entre 60-80%. Registrou-se a ocorrência de chuvas de 35 mm quatro dias após a aplicação dos produtos.

Os tratamentos secundários (subparcelas) corresponderam às épocas de amostragens, respectivamente: aos 10 dias antes da aplicação e 11, 46, 71, 100 e 117 dias após a aplicação (d.a.a.).

Nas épocas estabelecidas para amostragens, realizou-se a coleta de 10 colmos em seqüência na linha, os quais foram submetidos ao desponte na altura da gema apical (ponto de quebra) e levados ao Laboratório de Pagamento de Cana da Usina São Martinho S/A, em Pradópolis, Estado de São Paulo. O processamento foi feito segundo a metodologia do Sistema de Pagamento de Cana pelo Teor de Sacarose (SPCTS). Após a desintegração e homogeneização dos colmos, uma alíquota de 500 g foi submetida à prensa hidráulica, de acordo com o método de Tanimoto (1964), resultando o caldo extraído, que foi utilizado para as determinações químico-tecnológicas.

Tabela 1. Valores médios obtidos para AR% cana, em função dos maturadores aplicados e das épocas de amostragens, variedade SP81-3250. Pradópolis, Estado de São Paulo.

Tratamentos Principais	Tratamentos Secundários						Média	TESTE F
	(-10 daa)	(11 daa)	(46 daa)	(71 daa)	(100 daa)	(117 daa)		
Testemunha	1,94 A	1,42 B	1,01 C	0,75 CD	0,81 CD	0,57 Db	1,08	50,42 **
Aminolon 0,7 L ha ⁻¹	1,92 A	1,45 B	1,13 C	0,74 D	0,79 D	0,60 Db	1,1	49,1 **
Aminolon 1,0 L ha ⁻¹	1,94 A	1,36 B	1,09 B	0,67 C	0,70 C	1,18 Ba	1,16	42,22 **
Aminolon 1,3 L ha ⁻¹	2,00 A	1,41 B	1,19 B	0,75 CD	0,87 C	0,54 Db	1,13	53,11 **
Ethyl trinexapac 0,8 L ha ⁻¹	1,92 A	1,27 B	0,96 C	0,54 D	0,70 CD	0,80 CDb	1,03	48,03 **
Médias	1,94	1,38	1,07	0,69	0,78	0,74		
Teste F.	0,19 ^{ns}	1,00 ^{ns}	1,65 ^{ns}	1,57 ^{ns}	1,11 ^{ns}	14,06 **		

DMS Época d. Maturador = 0,2987

DMS Maturador d. Época = 0,2810

Teste F Maturador = 3,00^{ns}

Teste F Época = 229,66 **

Teste F Maturador X Época = 3,31 **

C.V. (%) Maturador = 12,03

C.V. (%) Época = 13,13

OBS: Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; Letras minúsculas comparam médias na vertical; * = significativo em nível de 5% de probabilidade; ** = significativo em nível de 1% de probabilidade; ns = não significativo em nível de 5% de probabilidade.

Tabela 2. Valores médios obtidos para Fibra % cana, em função dos maturadores aplicados e das épocas de amostragens, variedade SP81-3250. Pradópolis, Estado de São Paulo.

Tratamentos Principais	Tratamentos Secundários						Média	TESTE F
	(-10 daa)	(11 daa)	(46 daa)	(71 daa)	(100 daa)	(117 daa)		
Testemunha	7,44 C	8,02 BC	8,63 Abab	8,76 A	9,02 A	8,96 A	8,47	16,10 **
Aminolon 0,7 L ha ⁻¹	7,58 D	8,12 CD	8,25 BCb	8,10 CD	8,82 AB	9,33 A	8,37	15,91 **
Aminolon 1,0 L ha ⁻¹	7,73 C	8,22 BC	8,65 Abab	8,42 B	9,07 A	8,81 AB	8,48	9,41 **
Aminolon 1,3 L ha ⁻¹	7,43 C	8,06 BC	8,58 Abab	8,52 AB	8,49 B	9,15 A	8,37	13,97 **
Ethyl trinexapac 0,8 L ha ⁻¹	7,74 B	8,01 B	9,17 Aa	8,80 A	8,95 A	9,25 A	8,65	16,62 **
Médias	7,58	8,08	8,65	8,52	8,87	9,1		
Teste F.	0,61 ^{ns}	0,20 ^{ns}	2,98 *	2,21 ^{ns}	1,46 ^{ns}	1,26 ^{ns}		

DMS Época d. Maturador = 0,6392

DMS Maturador d. Época = 0,7701

Teste F Maturador = 0,80^{ns}

Teste F Época = 63,97 **

Teste F Maturador X Época = 2,01 *

C.V. (%) Maturador = 7,51

C.V. (%) Época = 3,65

OBS: Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; Letras minúsculas comparam médias na vertical; * = significativo em nível de 5% de probabilidade; ** = significativo em nível de 1% de probabilidade; ns = não significativo em nível de 5% de probabilidade.

Resultados e discussão

Na Tabela 1, encontram-se os valores médios de AR% cana, em que se observa um efeito significativo em nível de 1% no fator época e na interação (maturador x época). Os valores de AR% cana decresceram significativamente com o passar do tempo, alcançando valores menores aos 71 d.a.a.

Foram observadas, também, reduções nos teores dos açúcares redutores, quando a cana-de-açúcar foi tratada, com ethyl-trinexapac por Gonçalves (2000) e Vinhas (2001). Verifica-se na que o ethyl-trinexapac até os 100 d.a.a., foi o tratamento que sempre apresentou os menores valores médios de AR% cana.

Observou-se, no entanto, os resultados obtidos para Fibra % cana na Tabela 2. Verifica-se, pelas médias gerais das épocas, um incremento significativo em nível de 1%, com o decorrer das épocas de amostragem estabelecidas, embora com intensidade diferente para cada maturador.

Os resultados obtidos estão em concordância com Parazzi *et al.* (1981), Campos (1992), Vinhas (2001) os quais observaram também aumentos na quantidade de fibra com o avanço da maturação.

Aos 46 d.a.a., o Aminolon aplicado na dose de 0,7 L de p.c. ha⁻¹, apresentou média significativamente menor que os demais tratamentos.

A análise de variância para Pureza % caldo, como ilustra a Tabela 3, indicou valor de F significativo ao nível de 1% de probabilidade para as variáveis épocas e interação x maturadores x épocas.

Observou-se, por meio dos valores médios obtidos, que, aos 11 dias após a aplicação dos tratamentos, já foi possível enquadrar os valores médios obtidos de Pureza % caldo, nos teores estabelecidos para início de safra de 80% (Almeida, 1944) tanto para os tratamentos com Aminolon 1,0 L de p.c. ha⁻¹ como para o ethyl-trinexapac, sendo que este último apresentou valor maior (81,44%) aos 11 d.a.a.

Verifica-se, pela Figura 1, que o ethyl-trinexapac até os 90 d.a.a. foi o tratamento que sempre apresentou os maiores valores médios de Pureza % caldo.

Figura 1. Valores médios obtidos para Pureza % caldo, em função dos maturadores aplicados nas diferentes épocas de amostragens, para a cana-de-açúcar, variedade SP81-3250. Pradópolis, São Paulo.

Tabela 3. Valores médios obtidos para Pureza % caldo, em função dos maturadores aplicados e das épocas de amostragens, variedade SP81-3250. Pradópolis, Estado de São Paulo.

Tratamentos Principais	Tratamentos Secundários						Média	TESTE F
	(-10 daa)	(11 daa)	(46 daa)	(71 daa)	(100 daa)	(117 daa)		
Testemunha	74,52 D	79,78 C	84,08 B	86,81 AB	86,08 AB	88,72 Aa	83,33	48,33 **
Aminolon 0,7 L ha ⁻¹	74,68 D	79,54 C	82,88 B	86,98 A	86,35 A	88,37 Aa	83,13	47,47 **
Aminolon 1,0 L ha ⁻¹	74,51 C	80,41 B	83,17 B	87,73 A	87,25 A	82,20 Bb	82,54	41,13 **
Aminolon 1,3 L ha ⁻¹	73,97 D	79,96 C	82,14 C	86,82 AB	85,51 B	88,95 Aa	82,89	51,20 **
Ethyl trinexapac 0,8 L ha ⁻¹	74,67 D	81,44 C	84,46 BC	88,99 A	87,29 AB	86,19 Aba	83,84	46,52 **
Médias	74,47	80,22	83,34	87,47	86,49	86,88		
Teste F.	0,15 ^{ns}	1,01 ^{ns}	1,56 ^{ns}	1,57 ^{ns}	1,06 ^{ns}	14,48 **		

DMS Época d. Maturador = 3,1416

DMS Maturador d. Época = 2,9433

Teste F Maturador = 3,09^{ns}

Teste F Época = 221,30 **

Teste F Maturador X Época = 3,34 **

C.V. (%) Maturador = 1,63

C.V. (%) Época = 1,83

OBS: Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; Letras minúsculas comparam médias na vertical; * = significativo em nível de 5% de probabilidade; ** = significativo em nível de 1% de probabilidade; ns = não significativo em nível de 5% de probabilidade.

Houve um acréscimo significativo nos valores médios da Pureza % caldo para o tratamento com aminolon a partir da primeira época até aos 71 d.a.a., quando a média atinge 87,47%, valor que está acima daquele considerado adequado nos parâmetros de qualidade da matéria-prima que vai ser processada na indústria no decorrer da safra (Delgado e Azeredo, 1977).

Para os valores médios da Pol % cana, verificou-se um incremento gradativo com o passar das épocas de amostragens, inclusive atendendo ao valor mínimo exigido para considerar a cana-de-açúcar madura no início de safra, que é de 14,4% (Almeida, 1944), ao redor dos 70 dias após a aplicação, como se vê na Figura 2.

Figura 2. Valores médios obtidos para Pol % cana, em função dos maturadores aplicados nas diferentes épocas de amostragens, para a cana-de-açúcar, variedade SP81-3250. Pradópolis, Estado de São Paulo.

O teste F, na Tabela 4, porém, resultou um efeito não significativo para o tratamento principal – maturador, confirmando o resultado obtido por Vinhas (2001).

Tabela 4. Valores médios obtidos para Pol % cana, em função dos maturadores aplicados e das épocas de amostragens, variedade SP81-3250. Pradópolis, Estado de São Paulo.

Tratamentos Principais	Tratamentos Secundários						Média
	(-10 daa)	(11 daa)	(46 daa)	(71 daa)	(100 daa)	(117 daa)	
Testemunha	10,04	11,64	13,48	14,72	15,42	16,25	13,59 A
Aminolon 0,7 L ha ⁻¹	9,96	11,55	13,49	14,54	15,5	16,31	13,56 A
Aminolon 1,0 L ha ⁻¹	9,88	11,84	13,3	14,41	15,81	16,57	13,63 A
Aminolon 1,3 L ha ⁻¹	9,67	11,71	13,35	14,56	14,74	16,35	13,39 A
Ethyl trinexapac 0,8 L ha ⁻¹	10,3	11,8	13,97	15,34	16,19	16,28	13,98 A
Médias	9,97 F	11,71 E	13,52 D	14,71 C	15,53 B	16,35 A	

Teste F.
DMS Maturador = 0,7750
DMS Época = 0,4619
Teste F Maturador = 1,56^{ns}
Teste F Época = 470,23^{ns}
Teste F Maturador X Época = 0,96^{ns}
C.V. (%) Maturador = 6,18
C.V. (%) Época = 3,66

OBS: Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; Letras minúsculas comparam médias na vertical; * = significativo em nível de 5% de probabilidade; ** = significativo em nível de 1% de probabilidade; ns = não significativo em nível de 5% de probabilidade.

Embora, tenha observado um efeito não significativo para os maturadores, nas diferentes épocas de amostragens, o tratamento com o ethyl-trinexapac, a partir dos 46 d.a.a., apresentou ganhos em Pol (%) cana de 0,5 pontos percentuais em relação à testemunha, que foram crescentes atingindo um maior valor de 0,77% aos 100 d.a.a.

Conforme os resultados da Tabela 5, verifica-se efeito significativo para os valores de Brix % caldo, em nível de 1% para a interação maturadores x épocas. O teste F realizado para o efeito das épocas dentro de cada maturador, também resultou efeito altamente significativo (em nível de 1%), observando-se que somente a partir dos 100 d.a.a. é que se notaram maiores teores de Brix % caldo, em relação à primeira amostragem.

Observou-se na Figura 3 que, a partir dos 46 d.a.a., os teores de Brix (%) já se enquadraram no parâmetro mínimo para início de safra, que é de 18%, segundo Almeida, 1944, demonstrando possibilidade de antecipação do momento de

colheita de pelo menos duas semanas, visto que a variedade empregada é de maturação média.

Figura 3. Valores médios obtidos para Brix % caldo, em função dos maturadores aplicados nas diferentes épocas de amostragens, para a cana-de-açúcar, variedade SP81-3250. Pradópolis, Estado de São Paulo.

Com base nas análises tecnológicas efetuadas, calculou-se o ATR (kg t⁻¹) cuja análise estatística encontra-se na Tabela 6.

Tabela 5. Valores médios obtidos para Brix % caldo, em função dos maturadores aplicados e das épocas de amostragens, variedade SP81-3250. Pradópolis, Estado de São Paulo.

Tratamentos Principais	Tratamentos Secundários						Média	TESTE F
	(-10 daa)	(11 daa)	(46 daa)	(71 daa)	(100 daa)	(117 daa)		
Testemunha	14,73 E	16,10 D	17,88 C	18,95 B	20,10 Aab	20,53 Ab	18,05	89,72 **
Aminolon 0,7 L ha ⁻¹	14,60 D	16,05 C	18,03 B	18,48 B	20,08 Aab	20,83 Ab	18,01	96,09 **
Aminolon 1,0 L ha ⁻¹	14,55 E	16,28 D	17,83 C	18,25 C	20,35 Bab	22,55 Aa	18,3	140,15 **
Aminolon 1,3 L ha ⁻¹	14,28 E	16,18 D	18,10 C	18,65 BC	19,15 Bb	20,68 Ab	17,84	89,48 **
Ethyl trinexapac 0,8 L ha ⁻¹	15,15 C	15,98 C	18,60 B	19,28 B	20,79 Aa	21,28 Aab	18,51	107,39 **
Médias	14,66	16,12	18,09	18,72	20,09	21,17		
Teste F.	1,01 ^{ns}	0,13 ^{ns}	0,95 ^{ns}	1,61 ^{ns}	3,58 *	6,70 **		

DMS Época d. Maturador = 0,9962
DMS Maturador d. Época = 1,2827
Teste F Maturador = 1,34^{ns}
Teste F Época = 509,24 **
Teste F Maturador X Época = 3,40 **
C.V. (%) Maturador = 6,17
C.V. (%) Época = 2,66

OBS: Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; Letras minúsculas comparam médias na vertical; * = significativo em nível de 5% de probabilidade; ** = significativo em nível de 1% de probabilidade; ns = não significativo em nível de 5% de probabilidade.

Tabela 6. Valores médios obtidos para ATR cana (kg t^{-1}), em função dos maturadores aplicados e das épocas de amostragens, variedade SP81-3250. Pradópolis, Estado de São Paulo.

Tratamentos Principais	Tratamentos Secundários						Média	TESTE F
	(-10 daa)	(11 daa)	(46 daa)	(71 daa)	(100 daa)	(117 daa)		
Testemunha	113,13 E	135,15 D	164,30 Cc	193,05 Aa	174,97 Bab	181,14 B	160,29	176,03 **
Aminolon 0,7 L ha ⁻¹	111,52 D	134,04 C	180,56 Aab	184,90 Aab	171,10 Bab	181,52 A	160,6	178,18 **
Aminolon 1,0 L ha ⁻¹	111,52 D	139,04 C	170,52 Bbc	188,96 Aab	180,90 Aa	183,39 A	162,38	179,58 **
Aminolon 1,3 L ha ⁻¹	109,64 D	136,40 C	178,91 Abab	183,01 Aab	172,86 Bab	183,53 A	160,72	179,85 **
Ethyl trinexapac 0,8 L ha ⁻¹	117,84 D	138,78 C	184,12 Aa	179,12 Ab	169,56 Bb	178,16 AB	160,26	137,38 **
Médias	112,73	136,68	175,68	185,8	173,88	181,55		
Teste F.	1,44 ^{ns}	0,72 ^{ns}	9,72 **	4,31 **	2,90 *	0,70 ^{ns}		

DMS Época d. Maturador = 9,4514

DMS Maturador d. Época = 10,3147

Teste F Maturador = 0,28^{ns}

Teste F Época = 831,25 **

Teste F Maturador X Época = 4,94 **

C.V. (%) Maturador = 4,69

C.V. (%) Época = 2,84

OBS: Letras maiúsculas comparam médias na horizontal; Letras minúsculas comparam médias na vertical; * = significativo em nível de 5% de probabilidade; ** = significativo em nível de 1% de probabilidade; ns = não significativo em nível de 5% de probabilidade.

Aos 46 dias após a aplicação percebe-se o melhor resultado do maturador ethyl-trinexapac em face aos outros tratamentos, apresentando a maior média, com 184 kg t^{-1} de ATR, não diferindo significativamente do Aminolon, na doses de 0,7 e $1,3 \text{ L ha}^{-1}$ do produto comercial. Esses resultados confirmam-se quando comparados com os obtidos por Vinhas (2001), avaliando a eficiência do ethyl-trinexapac.

Aos 100 dias, após a aplicação dos maturadores, verificou-se uma redução considerável dos valores médios de ATR em todos os tratamentos, que variou dependendo do tratamento de cerca de 8 a 18 kg t^{-1} , em que a menor perda significativamente observada foi no tratamento com Aminolon, na dose de $1,0 \text{ L ha}^{-1}$. Este fato ocorreu devido ao retorno das condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento vegetativo da cultura.

após aplicação por FOLONI *et al.* (1996), avaliando diferentes doses e aplicações desse maturador.

Conclusão

Os maturadores afetaram diferentemente as características tecnológicas analisadas, observando-se que o ethyl-trinexapac foi o que apresentou melhor comportamento, seguido do Aminolon na dose de $0,7 \text{ L de p.c. ha}^{-1}$.

Em relação às épocas, os melhores resultados observados ocorreram na 3ª e 4ª época de amostragem, respectivamente aos 46 e 71 dias, após a aplicação.

Referências

- ALMEIDA, J.R. *Princípios gerais da fabricação de açúcar de cana*. Piracicaba: Centro Acadêmico “Luiz de Queiroz”, 1944.
- BANZATO, D.A.; KRONKA, S.N. *Experimentação agrícola*. 2. ed. Jaboticabal: Funep, 1992.
- CAMPOS, M.S.A. Utilização de Ethrel em escala comercial na Açucareira Corona S/A – Usina Bonfim. In: ENCONTRO RHODIA CANA-DE-AÇÚCAR, 2., 1992, São Paulo. *Anais...* São Paulo, 1992. p. 93-104.
- CASTRO, P.R.C. Fisiologia da cana-de-açúcar. In: ENCONTRO DE CANA-DE-AÇÚCAR, 1992, São Paulo. *Anais...* São Paulo, 1992. p. 5-8.
- DELGADO, A.A.; AZEREDO, C.M.A. *Elementos de tecnologia e engenharia do açúcar de cana*. Piracicaba: Departamento e Tecnologia Rural, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 1977. v. 1.
- EMBRAPA-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. *Sistema brasileiro de classificação de solos*. Rio de Janeiro, 1999.
- FERNANDES, A.C. Refratômetro de campo. *Boletim Técnico Copersucar*, São Paulo, v. 19, p. 5-12, 1982.
- FOLONI, L.L. *et al.* Avaliação da eficiência do maturador etil-trinexapac em cana-de-açúcar em aplicação aérea. In: CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE DOS

Figura 4. Valores médios obtidos para ATR cana (kg t^{-1}), em função dos maturadores aplicados nas diferentes épocas de amostragens, para a cana-de-açúcar, variedade SP81-3250. Pradópolis, Estado de São Paulo.

Percebe-se que, a partir dos 90 dias após a aplicação do tratamento com ethyl-trinexapac, ocorre uma queda considerável nos valores médios de ATR cana, fato também observado aos 90 dias

- TÉCNICOS AÇUCAREIROS E ALCOOLEIROS DO BRASIL – STAB, 6., 1996, Maceió. *Anais...* Maceió, 1996. p. 401-407.
- GONÇALVES, T.D. *Influência da aplicação do etil-trinexapac em cana de ano bisada e seus reflexos na qualidade da matéria-prima e na fermentação etanólica*. 2000. Monografia (Graduação em Agronomia)–Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2000.
- MUTTON, M.A. Modo de ação do sal de isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina (glifosate) e efeito maturador na cana-de-açúcar. *In: SEMINÁRIO ROUNDUP EFEITO MATURADOR*, 1., 1993, Guarujá. *Anais...* Guarujá, 1993. p. 9-17.
- PARAZZI, C. *et al.* Aplicação de amadurecedores químicos em cana-de-açúcar com diferentes níveis de desponte. *In: CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE DOS TÉCNICOS AÇUCAREIROS E ALCOOLEIROS DO BRASIL*, 2., 1981, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro, 1981. p. 363-374
- RESENDE, P.A.P. *et al.* Moddus, a plant growth regulator and management tool for sugarcane production in Brazil. *Sugar Cane International*, Glamorgan, v. 103, p. 5-9, 2000.
- ROMERO, E. *et al.* *Características y beneficios de la maduración química de la caña de azúcar de Tucumán*. Tucumán: EEAO, 1997. (Avance agroindustrial, 68).
- TANIMOTO, T. The press method of cane analysis. *Hawaiian in Plater's Record*, Aila, v. 57, p. 133-150, 1964.
- ÚNICA: cana-de-açúcar. Disponível em: <www.unica.com.br>. Acesso em: 22. out. 2005.
- VINHAS, T. *Efeito precoce da aplicação de maturadores em cana-de-açúcar, nas características agrotecnológicas e resultado econômico*. 2001. Monografia (Graduação em Agronomia)–Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2001.
- ZILLO, H. *Acompanhamento e comparação dos parâmetros tecnológicos com índices de maturação da cana-de-açúcar (var. SP80-1816) submetida à aplicação de maturadores químicos*. Monografia (Graduação em Agronomia)–Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2003.

Received on November 27, 2006.

Accepted on May 22, 2007.