



Diversidad de musgos en Cuba Oriental

Diversity of the mosses of eastern Cuba

Ángel Motito Marín¹ & María Elena Potrony Hechavarriá¹

Resumen

La flora de musgos de Cuba presenta su mayor diversidad en la región oriental. A partir del trabajo de campo, de revisiones bibliográficas y de materiales de herbarios se realiza un inventario de los musgos registrados para Cuba Oriental, reconociéndose 354 taxones infragenéricos pertenecientes a 153 géneros y 47 familias. Se registra la familia Hedwigiaceae por primera vez para Cuba, así como los géneros *Braunia* y *Leucophanes*; además de las especies *Braunia squarrulosa* (Hampe) Müll. Hal., *Callicostella rivularis* (Mitt.) A. Jaeger, *Leucophanes molleri* Müll. Hal., *Pilotrichum bipinnatum* (Schwägr.) Brid., *Phyllogonium viscosum* (P. Beauv.) Mitt., *Pogonatum campylocarpum* (Müll. Hal.) Mitt., *Rhamphidium borinquense* H. A. Crum & Steere y *Sphagnum portoricense* Hampe.

Palabras claves: Cuba Oriental, Diversidad, Musgos.

Abstract

The mosses of Cuba have their greatest diversity in the eastern region. Based on field work, published revisions and herbarium material, an inventory of the mosses recorded for eastern Cuba recognizes 354 infragenetic taxa belonging to 153 genera and 47 families. The Hedwigiaceae family is reported for the first time from Cuba as well as the genera *Braunia* and *Leucophanes* and, the species *Braunia squarrulosa* (Hampe) Müll. Hal., *Callicostella rivularis* (Mitt.) A. Jaeger, *Leucophanes molleri* Müll. Hal., *Pilotrichum bipinnatum* (Schwägr.) Brid., *Phyllogonium viscosum* (P. Beauv.) Mitt., *Pogonatum campylocarpum* (Müll. Hal.) Mitt., *Rhamphidium borinquense* H. A. Crum & Steere and *Sphagnum portoricense* Hampe.

Key words: Diversity, Eastern Cuba, Mosses.

Introducción

Los primeros trabajos sobre los musgos cubanos de que se tienen referencia son los de Lehmann (1834) y Sullivant (1861), este último autor en sus “Musci Cubensis” publica algunos de los musgos colectados por C. Wright en la región oriental de Cuba.

En la primera mitad del siglo XX sobresalen los estudios de Williams (1919, 1921), Britton (1922), León (1933), Thériot (1939, 1940, 1941) y Welch (1950), donde se listan y describen especies de musgos cuyos nombres hoy en día son válidos.

Hacia la segunda mitad de ese mismo siglo se publican los trabajos de Bizot (1965, 1973), Welch (1969), Schubert (1978), Duarte (1982a, b, 1995, 1997) y Zündorf (1989).

Sin lugar a dudas el estudio más completo sobre la flora de musgos cubana es el realizado

por Duarte (1997) en el que se analiza de forma crítica los estudios de los briólogos que lo precedieron, indicando la presencia en nuestro territorio nacional de 396 taxones infragenéricos agrupados en dos subclases, 12 órdenes, 38 familias y 147 géneros. En este estudio se presentan, además, datos generales sobre la distribución y sustratos de algunas de las muestras examinadas. Es necesario señalar que Duarte no visitó la región oriental de Cuba; las colectas fueron realizadas por otros botánicos no especialistas en la materia, principalmente por A. Borhidi, O. Muñiz y S. Vázquez.

Lamentablemente el estudio realizado por Duarte culminó en el año 1980 (comunicación personal D. Reyes, 1992) y no fue publicado hasta el 1997, por lo que muchas de las especies que se tratan presentan problemas nomenclaturales.

¹Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Santiago de Cuba, Cuba.
e-mail: motito@bioeco.ciges.inf.cu

Materiales y Métodos

En este trabajo se define como región oriental los territorios de las actuales provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, según la División Político-Administrativa de 1975 que es la que se sigue en los estudios de la Flora de la República de Cuba.

De 1987 al 2006 se realizaron trabajos de campo como parte de los proyectos “Diversidad biológica de los macizos montañosos Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa”, “Caracterización briológica y pteridológica del Parque Nacional Pico Cristal” y “Acciones de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en Áreas de Pluvisilva”, entre otros. El muestreo se realizó principalmente en algunas zonas poco conocidas como: Alto de Iberia, El Toldo, La Melba, Meseta del Guaso y Altiplanicie de Nipe, entre otras.

Las colectas se realizaron de forma intensiva a orillas y talud de caminos, cañadas y en el interior del bosque, teniendo en cuenta los microhabitats donde puede crecer este grupo de plantas.

Se asume el ordenamiento taxonómico propuesto por Goffinet & Shaw (2010).

Para las actualizaciones nomenclaturales se siguen las siguientes obras: Index Muscorum (Wijk *et al.* 1959-1969), A Dictionary of Mosses (Crosby & Magill 1977) and Index of Mosses (Crosby *et al.* 1992). También se consultaron a Aguirre & Rangel (2005), Allen & Crosby (1986a,b), Ardiles *et al.* (2008), Buck & Ireland (1985), Buck (1984, 1987a,b, 1988, 1989a,b, 1991, 1994a,b, 1998), Bytebier & Chuat-Petiot (2007), Churchill & Linares (1995), Churchill & Salazar Allen (2001), Crum & Buck (1994), Crum (1972, 1994), Dauphin & Grayum (2005), Frahm (1987, 1991), Holz *et al.* (2002), Ireland (1986, 1992), Koponen (1981), Lewis *et al.* (2004), Magill (1994), Manuel (1994), McFarland (1994), Menzel (1985), Merwin *et al.* (2001), Nishimura & Ando (1994), Ochi (1980, 1981, 1994), Pursell (1994, 1999, 2007), Pursell *et al.* (1992), Reese (1993), Salazar Allen (1992), Smith (1994), Šoltés (2000), Spessard-Schueth (1994), Streimann (1993) y Zander (1981, 1983, 1993, 1994).

Para los nombres de los autores de los taxones se siguió a Brummitt & Powell (1992).

Se consultaron, además, muestras de los herbarios BSC, HAC, HAJB, JBSD, MAPR, PMA, SCZ y USD. Todos los acrónimos de los herbarios se corresponden según Holmgren *et al.* (1990) y Holmgren & Holmgren (2001).

Todo el material colectado está depositado en la Sección de Briofitas del BSC.

Resultados y Discusión

Se identificaron 3745 muestras pertenecientes a las colecciones del BSC, HAC y HAJB; se obtuvo información de 6339 ejemplares presentes en herbarios, además, de los citados en la literatura, principalmente León (1933), Thériot (1939, 1940, 1941), Bizot (1965, 1973), Welch (1969), Schubert (1978), Zündorf (1989) y Duarte (1997); realizadas en más de 500 localidades de Cuba Oriental.

En la confección de la lista final de los musgos presentes en la zona de estudio se analizaron detalladamente los trabajos de Duarte (1997) (los estudios precedentes fueron incluidos en este estudio) y Zündorf (1989), detectándose que casi el 47 % de los taxones citados por ambos autores necesitaban actualización nomenclatural.

Después de realizadas las actualizaciones nomenclaturales se reconoce la presencia de 14 órdenes de musgos presentes en Cuba Oriental, 47 familias (95.3 %), 153 géneros (92.3%) y 354 taxones infragenéricos (87.6 %). Este resultado difiere de los 218 y 318 taxones infragenéricos reconocidos por Duarte (1997) y Zündorf (1989), respectivamente, y se debe al aumento de los estudios taxonómicos y florísticos locales, regionales o nacionales realizados en el Neotrópico en las últimas décadas.

Los órdenes mejor representados en cuanto al número de familias que agrupan resultaron ser Hypnales (21), continuando en forma decreciente, Dicranales (7) y Hookeriales (5); mientras el resto de los órdenes tienen una o dos familias solamente.

Se reconoce por primera vez para Cuba la familia Hedwigiacaeae.

Las familias que presentan los mayores totales de géneros son: Pottiaceae (16), Pilotrichaceae (11), Neckeraceae (9), Brachytheciaceae (8), Dicranaceae, Hypnaceae y Meteoriaceae (8), Pterobryaceae y Sematophyllaceae (6), y Bryaceae y Pylaisiadelphaceae (5). El resto de las familias tienen entre uno y cuatro géneros; existen, además, 18 familias (38.2 %) monogenéricas o que están representadas en Cuba Oriental por un solo género. Algunas familias poseen muy pocos géneros y gran cantidad de taxones infragenéricos: Calymperaceae (4 y 26), Leucobryaceae (4 y 19), Orthotrichaceae (3 y 17), Bartramiaceae (3 y 10), Fissidentaceae (1 y 30) y Sphagnaceae (1 y 10).

Se registran dos nuevos géneros para Cuba: *Braunia* y *Leucophanes*. El género *Braunia* (Hedwigiaceae) con la especie *Braunia squarrulosa* (Hampe) Müll. Hal. se caracteriza por presentar hojas sin costa, células laminales corto-rectangulares a elípticas, papilosas con paredes sinuosas, y cápsula sin peristoma. Esta familia se localiza exclusivamente en la Sierra Maestra, Gran Piedra. Los representantes de esta familia se distribuyen principalmente en las áreas montañosas de las regiones tropicales del mundo (De Luna & Buck 1991).

El otro nuevo género mencionado anteriormente es *Leucophanes* (Calymperaceae) representado por la especie *Leucophanes molleri* Müll. Hal. Estas plantas se caracterizan por presentar una costa simple y delgada, lámina multiestratificada y en corte transversal los clorocistos se encuentran agrupados cerca del centro, hacia la superficie adaxial. Solamente se ha colectado en La Melba, en las márgenes del Río Palmares, Holguín, a los 160 m de altitud. Salazar Allen (1993a,b) señala que se puede encontrar desde el nivel del mar hasta los 800 m de altitud. La muestra observada de Cuba no posee esporofito, ni órganos sexuales; referente a este aspecto Salazar Allen (1993b) indica que estos musgos son dioicos y que en las poblaciones neotropicales se desconocen las plantas masculinas y los esporofitos, mientras que en las poblaciones africanas se presentan las plantas de ambos sexos y los esporofitos.

Se registran por primera vez para Cuba Oriental los siguientes géneros de musgos: *Braunia*, *Brymela*, *Donnellia*, *Leucophanes*, *Pleurochaete*, *Pseudotrichypus* y *Rauiella*.

Se reconocen por primera vez para Cuba las siguientes especies: *Braunia squarrulosa* (a su vez primer registro para las Antillas Mayores), *Callicostella rivularis* (Mitt.) A. Jaeger, *Leucophanes molleri*, *Phyllogonium viscosum* (P. Beauv.) Mitt., *Pilotrichum bipinnatum* (Schwägr.) Brid., *Pogonatum campylocarpum* (Müll. Hal.) Mitt., *Rhamphidium borinquense* H. A. Crum & Steere y *Sphagnum portoricense* Hampe.

El total de taxa infragenéricos en Cuba Oriental asciende a 354, que representa el 87.6 % del total de la flora de musgos de Cuba; se indican además, 34 nuevos registros para la región de estudio.

Lista anotada de los musgos presentes en Cuba Oriental

*Nuevos registros para la zona de estudio

AMBLYSTEGIACEAE

Anacamptodon cubensis (Sull.) Mitt. SANTIAGO DE CUBA, El Avispero, 150-250 m, 8.X.1997, *Potrony 15176* (BSC).

Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 900-1525 m, 10.VI.1936, *Acuña 289* (HAC).

ANOMODONTACEAE

Anomodon attenuatus (Hedw.) Hüb. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 310-321 m, 15.XII.1994, *Motito y Potrony 13238* (BSC).

**Anomodon rostratus* (Hedw.) Schimp. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Quemados, 200 m, 14.IV.1998, *Motito y Vicario 15533* (BSC).

Schwetschkeopsis fabronia (Schwaegr.) Broth. Registro de Buck (1998).

BARTRAMIACEAE

Breutelia jamaicensis (Mitt.) A. Jaeger. GRANMA, camino a Pino del Agua, 1200 m, 13.XII.1988, *Motito y Vicario 9388* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, zona de Corea, 500 m, 9.IV.1976, *Borhidi 2925* (HAC).

Breutelia scoparia (Schwägr.) A. Jaeger. GRANMA, Pico Bayamesa, 1700 m, 15.XI.1986, *Mustelier y Vicario 7499* (BSC).

Breutelia tomentosa (Brid.) A. Jaeger. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, camino a La Laguna, 540-600 m, 1.III.1998, *Motito 15874* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, Paso de Las Angustias, 1700 m, 9.XII.1969, *Borhidi et al. 458* (HAC).

Leiomela bartramoides (Hook.) Paris. GRANMA, Pico Regino, 1600 m, 20.IV.1979, *Pócs 9091/B* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Maestra, entre arroyos Peladero e Indio, 1000-1500 m, 27.XI.1959, *López Figueiras 376* (HAC).

Leiomela filifolia Thér. GUANTÁNAMO, Baracoa, Arroyo Blanco, 160 m, 19.V.1991, *Mustelier y Vicario 12267* (BSC).

**Philonotis elongata* (Dism.) H.A. Crum & Steere. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 4.IV.1982, *Buck 7661* (BSC, HAC).

Philonotis glaucescens (Horns.) Broth. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 1943, *Carabia 480* (HAC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, 500 m, 9.IV.1982, *Buck 9801* (BSC, HAC).

Philonotis gracillima Ångstr. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 2.I.1960, *Alaín y López Figueiras 7240* (HAC).

Philonotis sphaerocarpa (Hedw.) Brid. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1130 m, 10.IX.1978, *Pócs y Reyes 9047/AD* (BSC).

Philonotis uncinata (Schwägr.) Brid. GRANMA, camino a Pino del Agua, 1200 m, 13.XII.1988, *Motito y Vicario 8936* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1150 m, 10.XI.1978, *Pócs y Reyes 9046/AK* (BSC).

BRACHYTHECIACEAE

Brachythecium ruderale (Brid.) W. R. Buck. GUANTÁNAMO, Sierra del Purial, norte de Puriales de Caujerí, al sur del Río Toa, 630 m, 21.X.1980, *Pócs y Reyes 9186/L* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Meseta Santa María del Loreto, orillas de arroyos, 520 m, 18.V.1979, *Pócs 9108/AF* (BSC).

Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. Registro de Buck (1998).

Helicodontium capillare (Hedw.) A. Jaeger. GUANTÁNAMO, Baracoa, Duaba, Santa Rosa del Duaba, 50 m, 27.XI.1978, *Pócs y Reyes 9056/D* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, Río Ramona, 500 m, 9.IV.1982, *Shaw 5386* (BSC, HAC).

Meteoriidium remotifolium (Müll. Hal.) Manuel. GRANMA, La Bayamesa, Arroyo Nuevo Mundo, 1000-1050 m, 15.XII.1988, *Motito y Vicario 8808* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, entre Pico Cuba al Pico Turquino, 1800-1972 m, 14.IV.1987, *Mustelier y Vicario 9506* (BSC).

Palamocladium leskeoides (Hook.) E. Britton. GRANMA, Loma La Sabina, 1100-1200 m, 19.IV.1979, *Pócs y Duany 9085/AV* (BSC). GUANTÁNAMO, Baracoa, Arroyo Blanco, 160 m, 12.V.1991, *Mustelier y Vicario 12167* (BSC).

**Rhynchostegium robustum* W.R. Buck. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del río Cuzco, 400 m, 15.XII.1994, *Motito y Potrony 13231* (BSC).

Rhynchostegium scariosum (Taylor) A. Jaeger. Registro de Buck (1998).

Rhynchostegium serrulatum (Hedw.) A. Jaeger. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Quemados, 200 m, 14.IV.1998, *Motito y Vicario 15525* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1100 m, 3.IV.1982, *Buck 7571* (BSC, HAC).

**Squamidium isocladium* (Renauld. & Cardot) Broth. SANTIAGO DE CUBA, Sierra Maestra, Gran Piedra, 1000 m, 6.IV.1982, *Buck s/n* (BSC, HAC).

Squamidium leucotrichum (Taylor) Broth. GRANMA, Pico Bayamesa, 1500-1700 m, 17.XII.1988, *Motito y Vicario 9848* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Suecia, 1700-1750 m, 6.XII.1969, *Muñiz 443* (HAC).

**Squamidium livens* (Schwägr.) Broth. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1100 m, 2.IV.1982, *Shaw 5332* (BSC, HAC).

Squamidium nigricans (Hook.) Broth. GRANMA, subida a Pico Bayamesa, 1500-1700 m, 17.XII.1988, *Motito y Vicario 9811* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1200 m, 10.III.1989, *Reyes 10438* (BSC).

Zelometerium patulum (Hedw.) Manuel. GRANMA, La Bayamesa, Nuevo Mundo, 1100 m, 15.XII.1988, *Motito y Vicario 8812* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, La Isabelica, 1000-1100 m, 21.IV.1987, *Motito 8685* (BSC).

BRUCHIACEAE

Trematodon longicollis Michx. GRANMA, sur de Santo Domingo, valle río Yara, 300 m, 14.IV.1979, *Pócs y Duany 9072/T* (BSC).

BRYACEAE

Acidodontium megalocarpum (Hook.) Renauld. & Cardot. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 1370-1700, 10.VI.1936, *Acuña 410* (HAC).

Anomobryum filiforme (Dicks.) Solms. var. *filiforme*. SANTIAGO DE CUBA, Sierra Maestra, entre arroyos Peladero e Indio, 1000-1500 m, 27.XI.1959, *López Figueiras 421* (HAC).

**Brachymenium globosum* A. Jaeger. SANTIAGO DE CUBA, Pico Suecia, 1700-1750 m, 7.XII.1969, *Muñiz 316* (HAC).

Brachymenium speciosum (Hook. f. & Wilson) Steere. GRANMA, Pico Regino, 1600 m, 20.IV.1979, *Pócs 9091/AD* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1150 m, 2.XII.1970, *Borhidi et al. 1061* (HAC).

Brachymenium wrightii (Sull.) Broth. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 10.XI.1983, *Mustelier 10747* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Santa Ana, cerca de Santiago de Cuba, 500 m, 23.III.1902, *Hamilton 80* (HAC).

Bryum argenteum Hedw. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, La Prenda, 250 m, 1933, *Hioram 218* (HAC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 25.IX.1970, *Reyes 5063* (BSC).

Bryum billardieri Schwägr. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 500-600 m, 11.XII.1997, Motito et al. 15782 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 4.IV.1982, Buck 7649 (BSC, HAC).

Bryum capillare Hedw. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, sur del corte de leña, 600-700, 16.X.1941, Morton y Acuña 3910 (HAC).

Bryum coronatum Schwägr. SANTIAGO DE CUBA, Morro de Santiago de Cuba, cuevas en la ladera norte, 30 m, 08.V.1979, Pócs 9100/C (BSC). Sierra del Cristal, camino a Pico Cristal, 810 m, 21.III.2001, Motito y Trapero 17047 (BSC).

Bryum hioramii Thér. SANTIAGO DE CUBA, Lomas San Juan, 900 m, 1940, Hioram 11801 (HAC).

Bryum leonii Thér. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Los Llanos, 420 m, 12.VIII.1938, León 17117 (HAC).

**Bryum limbatum* Müll. Hal. SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, 575 m, 16.I.1985, Echezarreta 5882 (BSC).

**Bryum procerum* A. Schimp. ex Besch. SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, 300 m, 6.X.1980, Pócs y Caluff 9163/F (BSC).

Bryum pseudocapillare Besch. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, La Prenda, 250 m, 1924, Hioram 217 (HAC).

**Bryum renauldii* Röll. ex Renaud. & Cardot. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 310-320 m, 15.XII.1994, Motito y Potrony 13223 (BSC).

Rhodobryum beyrichianum (Hornschr.) Müll. Hal. ex Hampe. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 17.XII.1985, Mustelier 7870 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-720 m, 30.IV.1997, Motito y Vicario 14922 (BSC).

CALYMPERACEAE

Calymperes afzelii Sw. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Quemados, 200 m, 12.IV.1998, Motito y Vicario 15503 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Meseta Santa María del Loreto, norte de Yerba de Guinea, 240 m, 27.X.1980, Pócs y Caluff 9194/G (BSC).

Calymperes erosum Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 10.XI.1983, Mustelier y Vicario 15494 (BSC).

Calymperes guildingii Hook. & Grev. GUANTÁNAMO, Baracoa, Duaba, El Dajao, 460-480 m, 11.X.1991, Mustelier y Vicario 12786 (BSC).

**Calymperes levyanum* Besch. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 26.XI.1978, Pócs y Reyes 9063/AM (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Pico Cristal, 1231 m, 19.II.1976, Catasús 2748 (HAC).

Calymperes lonchophyllum Schwägr. HOLGUÍN, Moa, La Melba, cerca de la Cascada Dos Comadres, 400 m, 10.X.1980, Pócs y Reyes 9076/AC (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 1100 m, 25.IX.1936, Acuña 9749 (HAC).

Calymperes palisotii Schwägr. HOLGUÍN, Silla de Gibara, 100m, 22.X.1978, Pócs 9037/A (BSC). SANTIAGO DE CUBA, La Lata, Brazo Escondido, sur de Filé, 400-500 m, 24.X.1969, Borhidi et al. 185e (HAC).

**Calymperes pallidum* Mitt. HOLGUÍN, alrededores de Candelaria Munilla, 50 m, 23.X.1978, Pócs 9040/A (BSC).

**Calymperes tenerum* Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 400 m, 15.XII.1994, Motito y Potrony 13244 (BSC).

Leucophanes molleri Müll. Hal. HOLGUÍN, Moa, La Melba, márgenes del Río Palmares, 160 m, 20.IX.1997, Potrony 15283 (BSC).

Octoblepharum albidum Hedw. GUANTÁNAMO, Baracoa, punta barlovento de la Bahía de Taco, 10-20 m, 6.III.1998, Motito 15844 (BSC). HOLGUÍN, Cerro Galano, sur de Melones, Arroyo Sao Redondo, 200 m, 18.X.1978, Pócs y Catasús 9024/A (BSC). SANTIAGO DE CUBA, La Alcarazza, 600 m, 25.I.1989, Motito 9478 (BSC).

Octoblepharum cocuiense Mitt. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 26.XI.1978, Pócs y Reyes 9066/R (BSC). HOLGUÍN, Sierra Cristal, Arroyo Cirino, 220 m, 31.III.2004, Motito 18180 (BSC).

Octoblepharum erectifolium Mitt. ex R.S. Williams. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Pinares de Mayarí, 400 m, 27.III.2004, Motito 18187 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, primera cañada después de Batista, 770 m, 25.III.2001, Motito 16991 (BSC).

Octoblepharum pulvinatum (Dozy & Molk.) Mitt. GUANTÁNAMO, Baracoa, Duaba, Arroyo Jaragual, 250-280 m, 14.X.1991, Mustelier y Vicario 12706 (BSC).

**Syrrhopodon africanus* subsp. *graminicola* (R.S. Williams) Reese. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Woodfred, 450-550 m, s.d., Shafer 3732a (HAC).

Syrrhopodon elongatus Sull. var. *elongates*. HOLGUÍN, Moa, La Melba, cerca de la Cascada Dos Comadres, 400 m, 10.X.1980, Pócs y Reyes 9170/D (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Pico Cristal, 1231 m, 28.III.2001, Trapero 17027 (BSC).

Syrrhopodon gaudichaudii Mont. GRANMA, Sierra Maestra, entre Pico Joaquín y Pico Regino, 1600 m, 20.IV.1979, Pócs 9090/J (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Palma Mocha, 1200-1300 m, 16.IV.1979, Pócs y Duany 9081/C (BSC).

Syrrhopodon incompletus Schwägr. var. *incompletus*. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-720 m, 30.IV.1997, Motito y Vicario 14906 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, cabezadas del Río Miguel, Arroyo Manzano, 680 m, 24.III.2001, Motito et al. 17166 (BSC).

Syrrhopodon incompletus var. *berteroanus* (Brid.) Reese. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 05.XII.1997, Motito et al. 15690 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Arroyo Manzano, entre La China y Batista, 600-650 m, 10.XI.1989, Motito et al. 10219 (BSC).

Syrrhopodon leprieurii Mont. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 900-1525 m, 10.VI.1936, Acuña s/n (HAC).

Syrrhopodon lycopodioides (Brid.) Müll. Hal. GRANMA, Pico Joaquín, 1400 m, 20.IV.1979, Pócs 9088/O (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, camino a La Zanja, 680 m, 24.III.2001, Motito et al. 17008 (BSC).

Syrrhopodon parasiticus (Brid.) Besch. HOLGUÍN, Moa, La Melba, cerca de la Cascada Dos Comadres, 400 m, 10.X.1980, Pócs y Reyes 9170/BS (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Jardín La Siberia, 1000-1100 m, 21.V.1979, Pócs y Duany 9115/CY (BSC).

**Syrrhopodon prolifer* Schwägr. var. *prolifer*. GUANTÁNAMO, Reserva Cupeyal del Norte, 500-600 m, 28.VIII.1986, Mustelier 7974 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Arroyo Manzano, entre La China y Batista, 600-650 m, 10.XI.1989, Motito et al. 10251 (BSC).

Syrrhopodon prolifer var. *acanthoneuros* (Müll. Hal.) Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Baracoa, Arroyo Blanco, 160 m, 12.V.1991, Mustelier y Vicario 12101 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, camino a Canadá, 650 m, 15.II.1989, Motito et al. 10502 (BSC).

Syrrhopodon prolifer var. *cincinnatus* (Hampe) Reese. HOLGUÍN, Moa, La Melba, cerca de la Cascada Dos Comadres, 400 m, 10.X.1980, Pócs y Reyes 9170/BX (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, camino a Pico Cristal, 810 m, 21.III.2001, Motito y Trapero 16939 (BSC).

Syrrhopodon prolifer var. *scaber* (Mitt.) Reese. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Quemados, 200 m, 13.IV.1998, Motito y Vicario 15492 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 720 m, 28.IV.1997, Motito y Vicario 14824 (BSC).

Syrrhopodon prolifer var. *tenuifolius* (Sull.) Rees. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 8.XII.1997, Motito et al. 15821 (BSC). HOLGUÍN, Gibara, Loma de Candelaria, 50-100 m, 23.X.1978, Pócs 9039/T (BSC).

CRYPHAEACEAE

Cryphaea filiformis (Hedw.) Brid. GRANMA, márgenes del Arroyo Barrio Nuevo, 15.V.1988, Panfet 64677 (HAJB). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1200 m, 06.IV.1982, Buck 7746 (BSC, HAC).

Schoenobryum concavifolium (Griff.) Gangulee. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, camino hacia El Fomento, 300-400 m, 16.XII.1994, Motito y Potrony 13307 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Mayarí Arriba, frutales del Museo del Segundo Frente, 175 m, 7.XI.1978, Pócs et al. 9043/A (BSC).

DALTONIACEAE

Adelothecium bogotense (Hampe) Mitt. SANTIAGO DE CUBA, entre Pico Palma Mocha y las Lagunitas, 1200-1300 m, 16.IV.1979, Pócs y Duany 9079/T (BSC).

Daltonia longifolia Taylor. GRANMA, Loma Subida Albear, cerca del Pico Bayamesa, 1300-1400 m, 3.XI.1978, Pócs 9066/DF (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1150 m, 10.XI.1978, Pócs y Reyes 946/BH (BSC).

Daltonia stenophylla Mitt. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 4.IV.1982, Buck 7647 (BSC).

Leskeodon auratus (Müll. Hal.) Broth. Registro de Buck (1998).

Leskeodon andicola (Mitt.) Broth. GUANTÁNAMO, Sierra del Purial, Loma La Farola, 480 m, 25.XI.1978, Pócs y Reyes 9062/L (BSC). HOLGUÍN, Reserva de Jaguaní, Río Anacleto, 200-400 m, 17.II.1970, Borhidi et al. 718a (HAC).

Leskeodon cubensis (Mitt.) Thér. GRANMA, Loma Subida Albear, cerca del Pico Bayamesa, 1300-1400 m, 30.XI.1978, Pócs y Catasús 9066/BA (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1050 m, 17.XI.1978, Pócs y Reyes 9057/DU (BSC).

DICRANACEAE

Aongstroemia jamaicensis Müll. Hal. GRANMA, Pico Bayamesa, 1300-1500 m, 17.XII.1988, Motito y Vicario 8881 (BSC).

Dicranella brachyblepharis (Müll. Hal.) Mitt. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1050 m, 17.XI.1978, Pócs y Reyes 9057/BK (BSC).

Dicranella harrisi (Müll. Hal.) Broth. GUANTÁNAMO, Reserva Cupeyal del Norte, 500-600 m, 9.II.1970, Borhidi et al. 734 (HAC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 4.IV.1982, Shaw 5145 (BSC, HAC).

Dicranella hilariana (Mont.) Mitt. SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, Río Ramona, 500 m, 9.IV.1982, *Buck 7804* (BSC, HAC).

Dicranella hioramii (Thér.) Duarte var. *hioramii*. HOLGUÍN, Reserva de Jaguaní, La Melba, 15.II.1970, *Borhidi et al. 742* (HAC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, cañada La Siberia, 1000 m, 6.II.1988, *Mustelier 8826* (BSC).

Dicranella hioramii var. *acunae* (Thér.) Duarte. SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 900 m, s.d., *Acuña 167* (HAC).

Dicranella longirostris (Schwägr.) Mitt. SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, minas del Cobre, 7.VIII.1921, *León et al. 10363* (HAC).

Dicranella reticulata (Müll. Hal.) Paris. SANTIAGO DE CUBA, El Cobre, 21.II.1902, *Pollard y Palmer 428* (HAC). Gran Piedra, 1000 m, 2.IV.1982, *Shaw 5035* (BSC, HAC).

Dicranella vaginata (Hook.) Cardot. GRANMA, Sierra Maestra, Pino del Agua, 1800 m, 12.XII.1988, *Motito y Vicario 9389* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Jardín La Siberia, 1000 m, 19.II.1987, *Motito 4780* (BSC).

Dicranella varia (Hedw.) Schimp. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Loma La Mensura, 800 m, 8.IX.1979, *Borhidi 6328* (HAC).

Eucamptodontopsis pilifera (Mitt.) Broth. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, afluente del Río Macaganigua, 20.I.2002, *Sánchez et al. 79265* (HAJB). HOLGUÍN, Revuelta de Los Chinos, 850-980 m, 12.X.1980, *Pócs 9175/AJ* (BSC).

Holomitrium calycinum (Hedw.) Mitt. GRANMA, Sierra Maestra, pico al suroeste del poblado Pino del Agua, 1440 m, 01.XI.1978, *Pócs 9067/AN* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, 575 m, 16.I.1985, *Mustelier 4788* (BSC).

Leucoloma albulum (Sull.) A. Jaeger. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Loma La Mensura, 200 m, 13.XI.1978, *Pócs y Reyes 9055/AO* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 11.I.1988, *Motito y Reyes 9155* (BSC).

Leucoloma cruegerianum (Müll. Hal.) A. Jaeger. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchufí, 640-700 m, 29.IV.1997, *Motito y Vicario 14802* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, primera cañada después de Batista, 770 m, 25.III.2001, *Motito 16987* (BSC).

Leucoloma mariei Besch. GRANMA, Pico Martí, 1700 m, 31.III.1990, *Potrony 11484* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, detrás de la cafetería, 1000 m, 11.II.2000, *Motito et al. 16568* (BSC).

Leucoloma schwaneckeanum (Hampe) Broth. GRANMA, cima de Pico Bayamesa, 1700 m, 21.VI.2003, *Potrony 17848* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, detrás de la cafetería, 1000 m, 11.II.2000, *Motito et al. 16552* (BSC).

Leucoloma serrulatum Brid. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 5.XII.1997, *Motito et al. 15620* (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, La Micro Onda, 700 m, 27.IV.1997, *Motito y Vicario 15202* (BSC).

Leucoloma subimmarginatum (Müll. Hal.) A. Jaeger. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 500-540 m, 10.VII.1986, *Vicario 7951* (BSC). HOLGUÍN, Moa, Altiplanicie del Toldo, 700 m, 21.IV.2001, *Potrony 17516* (BSC).

Macrodictyum proliferum (Mitt.) E.H. Hegew. SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 1100 m, 9.XII.1920, *Clemente 306* (HAC).

Macrodictyum wrightii (Sull.) E.H. Hegew. SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Pico Cristal, 1131 m, 19.II.1976, *Catasús s/n* (HAC).

Paraleucobryum albicans (Schwägr.) Loeske. GUANTÁNAMO, Baracoa, Arroyo Blanco, 160-200 m, 18.V.1991, *Mustelier y Vicario 12299* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Palma Mocha, 1380 m, 16.IV.1979, *Pócs y Duany 9083/E* (BSC).

DIPHYSCIACEAE

Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 1300-1800 m, 10.VI.1936, *Acuña 376* (HAC).

DITRICHACEAE

Ditrichum rufescens (Hampe) Hampe. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, La Isabelica, 1100 m, 31.X.1980, *Pócs 9202/H* (BSC).

Rhamphidium borinquense H. A. Crum & Steere. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Arroyo Negro, 1000 m, 5.IV.1982, *Buck 7695* (BSC, HAC).

Rhamphidium dicranoides (Müll. Hal.) Paris. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 3.IV.1982, *Shaw 5152* (BSC, HAC).

ENTODONTACEAE

Entodon beyrichii (Schwägr.) Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Yambeque, 550-580 m, 10.V.1995, *Motito y Vicario 13462* (BSC).

Entodon macropodus (Hedw.) Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 310-320 m, 15.XII.1994, *Motito y Potrony 13237* (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1200 m, 6.IV.1982, *Buck 7754* (BSC, HAC).

Erythrodontium longisetum (Hook.) Paris. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 25.III.1968, Reyes 5047 (BSC).

ERPODIACEAE

Erpodium biseriatum (Austin) Austin. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, s.d., Acuña 377 (HAC).

Erpodium domingense (Spreng.) Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Novaliches, sur de GUANTÁNAMO, 10 m, 19.IX.1921, Hioram 5134 (HAC). SANTIAGO DE CUBA, Meseta Santa María del Loreto, sobre Santa Ana, 300-500 m, 18.V.1979, Pócs 9170/A (BSC).

FABRONIACEAE

Fabronia ciliaris var. *wrightii* (Sull.) W. R. Buck. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, primera fuente a la carretera superior, 600-700 m, 26.X.1969, Borhidi et al. 883 (HAC).

FISSIDENTACEAE

Fissidens angustifolius Sull. SANTIAGO DE CUBA, Morro de Santiago de Cuba, 30 m, 21.X.1969, Borhidi y Muñiz 611 (HAC).

Fissidens asplenoides Hedw. GRANMA, La Bayamesa, Nuevo Mundo, El Obelisco, 1000 m, 14.XII.1988, Motito y Vicario 6142 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-700 m, 29.IV.1997, Motito y Vicario 14867 (BSC).

Fissidens bryoides Hedw. HOLGUÍN, orillas del Río Bariay, 30 m, 17.X.1978, Pócs 9020/E (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Playa de Siboney, 20 m, 12.XI.1978, Pócs y Reyes 9051/B (BSC).

Fissidens crispus Mont. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Arroyo Negro, 1000 m, 5.IV.1982, Shaw 7698 (BSC, HAC).

Fissidens dissitifolius Sull. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 26.XI.1978, Pócs y Reyes 9064/N (BSC).

Fissidens elegans Brid. GRANMA, Loma La Sabina, 1100-1200 m, 19.IV.1979, Pócs y Duany 9085/Q (BSC). HOLGUÍN, Reserva de Jaguaní, Río Anacleto, 200-400 m, 17.II.1979, Borhidi et al. 718 (HAC). GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 26.XI.1978, Pócs y Reyes 9063/Y (BSC).

Fissidens flaccidus Mitt. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, palmar en cañada alrededor del poblado, 350 m, 16.XII.1994, Motito 13949 (BSC).

Fissidens fontanus (B.-Pyl.) Steud. GRANMA, Pico Bayamesa, nacimiento del Arroyo 26, 1450 m, 20.III.1987, J. Reyes y Caluff 5391 (BSC).

Fissidens guianensis Mont. var. *guianensis*. Registro de Pursell (2007).

Fissidens imbricatus E. Britton & E. B. Bartram. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Loma de La Bandera, 400 m, 13.XI.1978, Pócs y Reyes 9052/B (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Pico Cristal, 1231 m, 28.III.2001, Trapero 17038 (BSC).

Fissidens inaequalis Mitt. GRANMA, Pico Bayamesa, 1200-1300 m, 14.XI.1986, Mustelier y Vicario 5374 (BSC). GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 10.XI.1983, Mustelier 4744 (BSC).

Fissidens intermedius Müll. Hal. GRANMA, Loma La Sabina, 1100-1200, 19.IV.1979, Pócs y Duany 9085/YZ (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1050 m, 17.XI.1978, Pócs y Reyes 9057/BH (BSC).

Fissidens lagenarius Mitt. var. *lagenarius*. Registro de Pursell (2007).

Fissidens lagenarius var. *muriculatus* (Mitt.) Pursell. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, detrás del Centro Científico, 400-450 m, 14.XII.1994, Motito y Potrony 13275 (BSC).

Fissidens oblongifolius Hook. f. & Wilson. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 26.XI.1978, Pócs y Reyes 9064/S (BSC).

Fissidens pallidinervis Mitt. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Pico Kentucky, 1000 m, 5.IV.1982, Buck 7669 (BSC, HAC).

Fissidens palmatus Hedw. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Quemados, 200 m, 12.IV.1998, Motito y Vicario 15520 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Subida a Monte Biset, 290-650 m, 12.V.2004, Motito y Rivera 18227 (BSC).

Fissidens pellucidus Hornsch. var. *pellucidus*. Registro de Pursell (2007).

Fissidens petrophilus Sull. GRANMA, cañada cerca de Pino del Agua, 1300 m, 16.XII.1988, Motito y Vicario 8888 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Arroyo Manzano, entre La China y Batista, 600-650 m, 10.XI.1989, Motito y Potrony 10198 (BSC).

Fissidens polypodioides Hedw. GUANTÁNAMO, Viento Frío, camino de Vía Mulata a Arroyo La Pulga (La Gurbia), 747 m, 4.VI.2004, Motito et al. 18585 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de La Francia, 1300-1400 m, 21.XII.1986, Mustelier y Vicario 5306 (BSC).

Fissidens prionodes Mont. GUANTÁNAMO, Reserva de Jaguaní, Arroyo Bueno, 150 m, 10.X.1980, Pócs y Reyes 9169/O (BSC). HOLGUÍN, Moa, La Melba, cerca de la Cascada Dos Comadres, 400 m, 10.X.1980, Pócs y Reyes 9170/K (BSC).

Fissidens radicans Mont. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 500-540 m, 10.VII.1986, Vicario 7948 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, alrededores de La Gran Sofía, 700 m, 26.III.1987, Motito 4729 (BSC).

Fissidens reticulosus (Müll. Hal.) Mitt. GUANTÁNAMO, Reserva de Jaguaní, Arroyo Bueno, 150 m, 10.X.1980, Pócs y Reyes 9169/Y (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Loma La Mensura, 400-500 m, 27.XI.1985, Mustelier y Vicario 4996 (BSC).

Fissidens rochensis Broth. in Urban. Registro de Pursell (2007).

Fissidens serratus Müll. Hal. var. *serratus*. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, camino al Arroyo Sonador, 550-680 m, 6.XII.1997, Motito et al. 115646 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 7.XII.1969, Borhidi et al. 1065e (HAC).

Fissidens submarginatus Bruch. in C. Krauss. Registro de Pursell (2007).

Fissidens weiri Mitt. var. *weiri*. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 10.XII.1997, Motito et al. 15743 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1150 m, 10.XI.1978, Pócs y Reyes 9046/CH (BSC).

Fissidens weiri var. *hemicraspedophyllum* (Cardot) Pursell. Registro de Pursell (2007).

Fissidens yucatanensis Steere. SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, Finca Santa Isabel, 370 m, 18.XI.1978, Pócs y Reyes 9059/E (BSC).

Fissidens zollingeri Mont. GRANMA, Loma La Sabina, 1100-1200 m, 19.IV.1979, Pócs 9085/C (BSC). HOLGUÍN, orillas del Río Bariay, 30 m, 17.X.1978, Pócs 9020/E (BSC).

FUNARIACEAE

Entostodon bonplandii (Hook.) Mitt. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 3.IV.1982, Shaw 5122 (BSC, HAC).

Funaria hygrometrica var. *calvescens* (Schwägr.) Mont. SANTIAGO DE CUBA, entre Pico Palma Mocha y Las Lagunitas, 1200-1300 m, 16.IV.1979, Pócs y Duany 9079/R (BSC).

HEDWIGIACEAE

Braunia squarrulosa (Hampe) Müll. Hal. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, alrededores de La Mercedita, 800-1000 m, 13.III.1987, Motito 4801 (BSC).

HELICOPHYLLACEAE

Helicophyllum torquatum (Hook.) Cardot. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Loma Lagunato, ladera norte sobre Josefita, 240-400 m, 27.X.1980,

Pócs s/n (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Meseta Santa María del Loreto, norte de Yerba de Guinea, 240 m, 27.X.1980, Pócs s/n (BSC).

HOOKERIACEAE

Crossomitrium epiphyllum (Mitt.) Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 310-320 m, 15.XII.1994, Motito y Potrony 13212 (BSC). HOLGUÍN, Sierra Cristal, Arroyo Cirino, 220 m, 30.III.2004, Motito 18181 (BSC).

Crossomitrium patrisiae (Brid.) Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Yambeque, 450-480 m, 8.IV.1995, Motito y Vicario 13415 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, La Isabelica, 1000 m, 11.II.2000, Motito et al. 16537 (BSC).

Hookeria acutifolia Hook. & Grev. GRANMA, La Bayamesa, Nuevo Mundo, 900-1000 m, 11.XI.1986, Mustelier 7348 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, albergue de La China, 600-650 m, 11.XI.1989, Motito et al. 10306 (BSC).

HYLOCOMIACEAE

Ctenidium malacodes Mitt. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 8.XII.1997, Motito et al. 15824 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, La Micro Onda, 700 m, 26.IV.1997, Motito y Vicario 15031 (BSC).

HYPNACEAE

Chrysoshypnum diminutivum (Hampe) W. R. Buck. GRANMA, Loma Subida Albear, cerca del Pico Bayamesa, 1300-1400 m, 30.XI.1978, Pócs 9066/AH (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 3.IV.1982, Shaw s/n (BSC, HAC).

Ectropothecium leptochaeton (Schwägr.) W.R. Buck. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 400 m, 15.XII.1994, Motito y Potrony 13247 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, Paso de Las Angustias, 1700 m, 9.XII.1969, Borhidi et al. 3041d (HAC).

Hypnum polypertum (Mitt.) Broth. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 26.XI.1978, Pócs y Reyes 9063/K (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Palma Mocha, 1380 m, 16.IV.1979, Pócs y Duany 9083/J (BSC).

Mittenothamnium reptans (Hedw.) Cardot. GRANMA, Loma La Sabina, 1100-1200 m, 19.IV.1979, Pócs y Duany 9085/AN (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Suecia, 1700-1750 m, 7.XII.1069, Muñiz 417c (HAC).

Phylloodon truncatulus (Müll. Hal.) W.R. Buck. GUANTÁNAMO, Baracoa, Arroyo Blanco, 160 m, 19.V.1991, Mustelier y Vicario 12277 (BSC).

SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 7.XII.1970, *Borhidi et al.* 996 (HAC).

Taxiphyllum scalpellifolium (Müll. Hal.) Broth. SANTIAGO DE CUBA, Alto del Puerto de Boniato, 350 m, 14.V.1979, *Pócs* 9102/B (BSC).

Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) Fleisch. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 400 m, 15.XII.1994, *Motito y Potrony* 13249 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Jardín La Siberia, 1000-1100 m, 21.V.1979, *Pócs y Duany* 9115/AC (BSC).

Vesicularia vesicularis (Schwägr.) Broth. var. *vesicularis*. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, entre Sabana y el Río Yumurí, pasando por Santa Rosa, 200 m, 15.IV.1998, *Motito y Vicario* 15571 (BSC).

Vesicularia vesicularis var. *crassicaulis* (Mitt.) W.R. Buck. SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, 400 m, 12.V.1979, *Pócs y Reyes* 9101/E (BSC).

Vesicularia vesicularis var. *portoricensis* (Brid.) W.R. Buck. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 240-450 m, 26.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9063/AW (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, Río Ramona, 500 m, 9.IV.1982, *Shaw* 5377 (BSC, HAC).

Vesicularia vesicularis var. *rutilans* (Brid.) W.R. Buck. GUANTÁNAMO, Sierra del Purial, Loma La Farola, valle norte, 480 m, 25.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9062/J (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 3.IV.1982, *Shaw* 5133 (BSC, HAC).

HYPOPTERYGIACEAE

Hypopterygium tamarisci (Sw.) Brid. ex Müll. Hal. GRANMA, La Bayamesa, camino a Arroyo 26, 1500-1600 m, 18.IV.2004, *Sánchez et al.* s/n (HAJB). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, valle del Río Arenal, 900-1000 m, 21.V.1979, *Pócs y Reyes* 9199/N (BSC).

LEMBOPHYLLACEAE

Pilotrichella cuspidans Renauld. & Cardot. GRANMA, camino a Pino del Agua, 1200 m, 13.XII.1988, *Motito y Vicario* 6127 (BSC). GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 10.XI.1983, *Mustelier* 10679 (BSC).

Pilotrichella flexilis (Hedw.) Ångstr. GRANMA, cima de Pico El Gigante, 1352 m, 7.IX.2004, *Rivera* 18491 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Pico Turquino, 1800 m, 17.IV.1987, *Vicario* 9989 (BSC).

LESKEACEAE

Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 10.XII.1987, *Motito et al.* 15712 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 900 m, 8.IV.1982, *Shaw* 5369 (BSC, HAC).

LEUCOBRYACEAE

Bryohumbertia filifolia (Hornschr.) Frahm var. *filifolia*. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, 200-540 m, 27.II.1998, *Motito* 15862 (BSC). HOLGUÍN, Reserva de Jaguaní, La Melba, La Mercedita, Arroyo Jaguará, 200-400 m, 29.VI.1987, *Mustelier* 8292 (BSC).

Campylopus arctocarpus (Hornschr.) Mitt. var. *arctocarpus*. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-720 m, 30.IV.1997, *Motito y Vicario* 14896 (BSC).

**Campylopus carolinae* Grout. SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, cañada en el camino a La China, 23.III.2001, *Motito et al.* 17012 (BSC).

Campylopus cubensis Sull. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, La Micro Onda, 700 m, 26.IV.1997, *Motito y Vicario* 15028 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 1100 m, 1932, *Clemente* 345 (HAC).

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. GUANTÁNAMO, Baracoa, Tabajó, 200 m, 30.III.1988, *Motito* 6482 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, bosque frente al albergue La China, 600-650 m, 10.XI.1989, *Motito et al.* 10278 (BSC).

Campylopus fragilis (Brid.) B.S.G. subsp. *fragilis*. GUANTÁNAMO, Baracoa, Tabajó, 100 m, 13.V.1991, *Mustelier y Vicario* 12180 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Maestra, Gran Piedra, 1200 m, 6.IV.1982, *Buck* 7772 (BSC, HAC).

Campylopus lamellinervis (Müll. Hal.) Mitt. var. *lamellinervis*. HOLGUÍN, Revuelta de Los Chinos, 850-980 m, 25.V.1979, *Pócs* 9175/AD (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Alto sobre San Esteban, 850 m, 25.V.1979, *Pócs* 9119/A (BSC).

**Campylopus lamellinervis* var. *exaltatus* (Müll. Hal.) Frahm. SANTIAGO DE CUBA, Sierra Maestra, Loma del Gato, 900 m, 1936, *Acuña* 150 (HAC).

Campylopus nivalis (Brid.) Brid. GRANMA, Loma Subida Albear, cerca del Pico Bayamesa, 1300-1400 m, 30.XI.1978, *Pócs* 9066/AF (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, alrededores de La Mercedita, 800-1000 m, 13.III.1987, *Motito y Mustelier* 4800 (BSC).

Campylopus pilifer (Brid.) Brid. subsp. *Pilifer*. GUANTÁNAMO, Baracoa, Arroyo Blanco, 120-160 m, 15.V.1991, *Vicario* 12217 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1100-1200 m, 10.XII.1970, *Borhidi et al.* 1071 (HAC).

**Campylopus richardii* Brid. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, La Micro Onda, Filial Universitaria, 700 m, 26.IV.1997, *Motito y Vicario* 14807 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 06.IV.1982, *Shaw* 5281 (BSC, HAC).

Campylopus shawii Wilson. GUANTÁNAMO, Reserva Cupeyal del Norte, 500-600 m, 28.VIII.1986, *Mustelier* 7533 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, camino a Canadá, 650 m, 15.II.1989, *Motito et al.* 10481 (BSC).

Leucobryum albidum (Brid. ex P. Beauv.) Lindenb. GRANMA, Pico Bayamesa, 1500-1700 m, 17.XII.1988, *Motito y Vicario* 6165 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1150 m, 10.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9046/AF (BSC).

Leucobryum antillarum Schimp. GRANMA, La Bayamesa, firme Chago Wilson, Pico 1587, 1300-1400 m, 25.II.1987, *Mustelier y Vicario* 7804 (BSC). HOLGUÍN, Sierra Cristal, camino de Baconal a La Zanja, 350-510 m, 30.III.2004, *Motito* 18194 (BSC).

Leucobryum crispum Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, subida, 200-540 m, 27.II.1998, *Motito* 15841 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Arroyo Manzano, entre La China y Batista, 600-650 m, 9.XI.1989, *Motito y Potrony* 6433 (BSC).

Leucobryum giganteum Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Río Barbudo, Viento Frío, 511 m, 5.VI.2004, *Motito et al.* 18653 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-700 m, 29.04.1997, *Motito y Vicario* 14783 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Loma San Juan, 700-1000 m, 14.VII.1989, *Mustelier y Vicario* 6313 (BSC).

Leucobryum martianum (Hornschr.) Hampe. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, alrededores de la laguna, 540-600 m, 1.III.1998, *Motito* 15848 (BSC). HOLGUÍN, Moa, La Melba, cerca de la Cascada Dos Comadres, 400 m, 10.X.1980, *Pócs y Reyes* 9170/A (BSC).

Leucobryum polakowskyi (Müll. Hal.) Cardot. GRANMA, subida a Pico Bayamesa, 1500-1700 m, 17.XII.1988, *Motito y Vicario* 6175 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-700 m, 29.IV.1997, *Motito y Vicario* 14784 (BSC).

Microcampylopus curvisetus (Hampe) Giese & Frahm. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 26.X.1969, *Borhidi y Muñiz* 3775 (HAC).

LEUCOMIACEAE

Leucomium strumosum (Hornschr.) Mitt. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, La Micro Onda, cañada cerca de la Filial Universitaria, 700 m, 26.IV.1997, *Motito y Vicario* 14815 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, 575 m, 26.I.1985, *Mustelier* 4789 (BSC).

Rhynchosstiopsis flexuosa (Sull.) Müll. Hal. GRANMA, cañada cerca de Pino del Agua, 1300 m, 16.XII.1988, *Motito y Vicario* 18889 (BSC). GUANTÁNAMO,

Yunque de Baracoa, 200-450 m, 26.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9063/AL (BSC).

METEORIACEAE

Barbellopsis trichophora (Mont.) W. R. Buck. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 500-600 m, 11.XII.1997, *Motito et al.* 15775 (BSC).

Lepyrodontopsis trichophylla (Hedw.) Broth. GRANMA, Las Lagunitas, ladera norte, 1100 m, 21.IV.1979, *Pócs y Duany* 9084/AJ (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1100 m, 10.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9047/AF (BSC).

Meteoriump deppei (Müll. Hal.) Mitt. GRANMA, subida a Pico Bayamesa, 1500-1700 m, 17.XII.1988, *Motito y Vicario* 7344 (BSC). GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 550-600 m, 12.XII.1997, *Motito et al.* 15585 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-720 m, 29.IV.1887, *Motito y Vicario* 14852 (BSC).

Meteoriump nigrescens (Hedw.) Mitt. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 10.XII.1997, *Motito et al.* 15722 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Pico Kentucky 1020 m, 26.V.1979, *Pócs* 9126/B (BSC).

Neodicladiella pendula (Sull.) W.R. Buck. Registro de Buck (1998).

**Pseudotrichypus martinicensis* (Broth.) W.R. Buck. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 25.IX.1970, *Reyes* 8348 (BSC).

Toloxis imponderosa (Taylor) W.R. Buck. GRANMA, Loma La Sabina, 1200-1300 m, 21.IV.1979, *Pócs y Duany* 9086/L (BSC). GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 10.XI.1983, *Mustelier* 10772 (BSC).

Trachypus viridulus (Mitt.) Broth. SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, 575 m, 16.I.1985, *Mustelier y Vicario* 5895 (BSC).

MNIACEAE

Epipterygium wrightii (Sull.) Lindb. GRANMA, Loma La Sabina, 1100-1200 m, 19.IV.1979, *Pócs y Duany* 9085/AD (BSC). GUANTÁNAMO. Baracoa, camino hacia Aguacate, 400 m, 14.VII.1979, *Potrony* 12476 (BSC).

Plagiomnium rhynchophorum (Hook.) T. J. Kop. GRANMA, Pico Regino, 1600 m, 20.IV.1979, *Pócs* 9091/K (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 900-1700 m, 10.VI.1936, *Acuña* 415 (HAC).

Pohlia papillosa (Müll. Hal. ex A. Jaeger) Broth. GRANMA, Loma Subida Albear, cerca del Pico Bayamesa, 1300-1400 m, 30.XI.1978, *Pócs* 9066/AQ (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 900-1525 m, 10.VI.1936, *Acuña* 375 (HAC).

MYRINIACEAE

Austiniella tenuinervis (Mitt.) Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, camino hacia El Fomento, 300-400 m, 16.XII.1994, Motito y Potrony 13302 (BSC).

NECKERACEAE

Homalia glabella (Hedw.) B.S.G. GRANMA, Loma La Sabina, 1000 m, 15.IV.1979, Pócs y Duany 9077/ B (BSC). GUANTÁNAMO, Viento Frío, camino de Vía Mulata a Arroyo La Pulga (La Gurbia), 740 m, 4.VI.2004, Motito et al. 18584 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 500-800 m, 13.I.1987, Mustelier 8875 (BSC).

Homaliodendron flabellatum (Sm.) M. Fleisch. GRANMA, Loma La Sabina, 1200-1300 m, 21.IV.1979, Pócs 9086/AQ (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, 575 m, 16.I.1985, Mustelier 4792 (BSC).

Isodrepanium lentulum (Wilson) E. Britton. GRANMA, Pico Bayamesa, 1700 m, 15.XI.1986, Mustelier y Vicario 7463 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, cañada en el camino a La Zanja, 660 m, 23.III.2001, Motito et al. 16948 (BSC).

Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb. GUANTÁNAMO, Viento Frío, camino de Vía Mulata a Arroyo La Pulga (La Gurbia), 740 m, 4.VI.2004, Motito et al. 18587 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, San Benito, cafetales de Calabaza, sur de Mayarí Arriba, 300 m, 7.XI.1978, Pócs y Reyes 9044/A (BSC).

Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt. GRANMA, La Bayamesa, Nuevo Mundo, El Obelisco, 1000-1050 m, 15.XII.1988, Motito y Vicario 6132 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, subida a Monte Biset, 290-650 m, 12.V.2004, Motito y Rivera 18228 (BSC).

Orthostichella hexasticha (Schwägr.) W. R. Buck. GRANMA, La Bayamesa, firme Chago Wilson, Pico 1587, 1300-1400 m, 25.II.1987, Mustelier y Vicario 6256 (BSC). GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, cerca de Dos Mujeres, 700-750 m, 21.XI.1980, Pócs y Caluff s/n (BSC).

Orthostichella pentasticha (Brid.) W.R. Buck. GRANMA, Subida a Pico Bayamesa, 1300-1500 m, 21.VI.2003, Potrony 17864 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 2.IV.1982, Shaw 5015 (BSC, HAC).

Pinnatella minuta (Mitt.) Broth. SANTIAGO DE CUBA, Sierra Maestra, oeste de Matías, farallón de Pozo Azul, 340-380 m, 22.X.1969, Borhidi y Muñiz s/n (HAC).

Porotrichodendron lindigii (Hampe) W. R. Buck. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, La Isabelica, 1130 m, 21.V.1979, Pócs y Duany 9112/B (BSC).

Porotrichodendron superbum (Taylor) Broth. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 6.IV.1982, Buck 7722, 7770 (BSC, HAC).

Porotrichum korthalsianum (Dozy & Molk.) Mitt. GRANMA, La Bayamesa, firme Pico 1555 a Arroyo 26, 1450-1500 m, 20.III.1987, J. Reyes y Caluff 8042 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, después de La Isabelica, 1000 m, 11.II.2000, Motito et al. 16582 (BSC).

Porotrichum mutabile Hampe. GRANMA, camino entre Pico Botella y Barrio Nuevo, 1300-1400 m, 3.II.2004, Caluff 18104 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 2.IV.1982, Shaw 5016 (BSC, HAC).

Thamnobryum fasciculatum (Hedw.) I. Sastre GRANMA, Loma Subida Albear, cerca de Pico Bayamesa, 1300-1400 m, 30.XI.1978, Pócs s/n (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 4.IV.1982, Shaw 5188 (BSC, HAC).

ORTHODONTIACEAE

Orthodontium pellucens (Hook.) B.S.G. in Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 400 m, 15.XII.1994, Motito y Potrony 13240 (BSC).

Hymenodon aeruginosus (Hook. f. & Wilson) Müll. Hal. var. *aeruginosus*. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1130 m, 10.XI.1978, Pócs y Reyes 9047/AG (BSC).

Hymenodon aeruginosus var. *clementii* Thér. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 10.VI.1936, Acuña 402 (HAC).

ORTHOTRICHACEAE

Groutiella apiculata (Hook.) H. A. Crum & Steere. GUANTÁNAMO, Sierra del Purial, Loma Cotilla, 500 m, 25.XI.1978, Pócs y Reyes 9061/P (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Pico Kentucky, 1000 m, 5.IV.1982, Buck 7671 (BSC, HAC).

Groutiella chimbazense (Spruce ex Mitt.) Florsch.-de Waard subsp. *Chimbazense*. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, cima, 1200 m, 10.XI.1978, Pócs y Reyes 9046/AQ (BSC).

Groutiella husnotii (Besch.) H. A. Crum & Steere. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1100 m, 7.XII.1970, Borhidi et al. 1065 (HAC).

Groutiella tumidula (Mitt.) Vitt. SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Pico Cristal, 1231 m, 28.III.2001, Trapero 17039 (BSC).

Groutiella wagneriana (Müll. Hal.) H.A. Crum & Steere. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 1800-1972 m, 6.XII.1969, Borhidi et al. 3776 (HAC).

Macromitrium cirrosum (Hedw.) Brid. var. *cirrosum*. GUANTÁNAMO, Sierra del Purial, Loma Cotilla, 500 m, 25.XI.1978, Pócs y Reyes 9061/M (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Pico Cristal, 1231 m, 28.III.2001, Trapero 17022 (BSC).

Macromitrium cirrosum var. *jamaicense* (Mitt.) Grout. HOLGUÍN, Moa, oeste de la Altiplanicie del Toldo, alrededores del Río Piloto, 790 m, 21.IV.2001, Potrony 17471 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1100 m, 10.XI.1978, Pócs y Reyes 9047/H (BSC).

Macromitrium cirrosum var. *stenophyllum* (Mitt.) Grout. GRANMA, camino a 5 km de Pino del Agua, 1200 m, 12.XII.1988, Motito y Vicario 8947 (BSC). GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, cañada cerca del Río Iberia, 540 m, 28.II.2001, Motito 16004 (BSC).

Macromitrium harrisii Paris. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 2.IV.1982, Shaw 5063 (BSC, HAC).

Macromitrium leprieurii Mont. GUANTÁNAMO, Reserva Cupeyal del Norte, 500-600 m, 28.VIII.1986, Mustelier 9543 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Pico Cristal, 1231 m, 28.III.2001, Trapero 17140 (BSC).

Macromitrium microstomum (Hook. & Grev.) Schwägr. GRANMA, Pico Bayamesa, 1200-1300, 14.XI.1986, Mustelier y Vicario 9074 (BSC). HOLGUÍN, Cerro Galano, Melones, Arroyo Sao Redondo, 360-400 m, 18.X.1978, Pócs y Caluff 9026/C (BSC).

Macromitrium perichaetiale (Hook. & Grev.) Müll. Hal. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, sur del corte de leña, 600-700 m, 16.X.1941, Morton y Acuña 3923 (HAC).

Macromitrium subperichaetiale Thér. HOLGUÍN, Sagua de Tánamo, alrededores de San Miguel de Cananova, 1946, Natenson 187 (HAC). SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 900 m, 1935, Acuña 9765 (HAC).

**Macromitrium swainsonii* (Hook.) Brid. SANTIAGO DE CUBA, Pico Suecia, 1700-1750 m, 7.XII.1969, Muñiz 214 (HAC).

**Schlotheimia jamesonii* (Arnott) Brid. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, alrededores de La Isabelica, 1000 m, 7.IV.1982, Shaw 5349 (BSC, HAC).

Schlotheimia rugifolia (Hook.) Schwägr. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 7.XII.1997, Motito et al. 15616 (BSC). HOLGUÍN, Cerro Galano, sur de Melones, Arroyo Sao Redondo, 200-360 m, 18.X.1978, Pócs y Catasús 9025/G (BSC).

Schlotheimia torquata (Hedw.) Brid. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, camino a la laguna, 540-600 m, 1.III.1998, Motito 15880 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, detrás de la cafetería, 1000 m, 11.II.2000, Motito et al. 16528 (BSC).

PHYLLOGONIACEAE

Phyllogonium fulgens (Hedw.) Brid. GRANMA, Buey Arriba, subida entre Alto de La Bandera y Alto del Cojo, 1.VIII.1987, Panfet y Martín 61604 (HAJB). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, cabezadas del Río Miguel, Arroyo Manzano, 680 m, 24.III.2001, Motito et al. 17205 (BSC).

**Phyllogonium viride* Brid. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, alrededores de la laguna, 540-600 m, 1.III.1998, Motito 15849 (BSC). HOLGUÍN, Sierra Cristal, camino a Palenque, 570 m, 9.V.2001, Motito et al. 17274 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Loma San Juan, 700-1000 m, 14.VII.1989, Motito y Mustelier 16158 (BSC).

Phyllogonium viscosum (P. Beauv.) Mitt. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 100-1200, 25.X.1969, Reyes 270 (BSC).

PILOTRICHACEAE

**Brymela fissidentoides* (Hook. f. & Wilson) W.R. Buck. GUANTÁNAMO, Baracoa, monte Río Quibiján, 30-70 m, 21.V.1991, Mustelier y Potrony 12323 (BSC).

Callicostella depressa (Hedw.) A. Jaeger. GUANTÁNAMO, Sierra del Purial, Loma La Farola, 480 m, 25.XI.1978, Pócs y Reyes 9062/H (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Loma La Mensura, 660 m, 13.XI.1978, Pócs y Reyes 9055/AQ (BSC).

**Callicostella pallida* (Hornschr.) Ångstr. GRANMA, La Bayamesa, firme Chago Wilson, Pico 1587, 1300-1400 m, 25.II.1987, Mustelier y Vicario 8040 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, detrás de la cafetería, 1000 m, 11.II.2000, Motito et al. 16561 (BSC).

Callicostella rivularis (Mitt.) A. Jaeger. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 1600-1700 m, 1929, León 11234 (HAC).

Cyclodictyon albicans (Hedw.) Kuntze. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Yambeque, Arroyo Luisa, 400 m, 10.V.1995, Motito 13467 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, alrededores del Arroyo Almarales, 260-280 m, 13.V.2004, Motito y Rivera 18251 (BSC).

Cyclodictyon albicaule (Besch.) Kuntze. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1150 m, 10.XI.1978, Pócs y Reyes 9046/M (BSC).

Cyclodictyon bicolor (Besch.) Kuntze. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1100-1200 m, 19.XII.1974, Reyes 9138 (BSC).

Cyclodictyon subtortifolium (E. B. Bartram) W.R. Buck. GRANMA, Loma Subida Albear, cerca del

Pico Bayamesa, 1300-1400 m, 30.XI.1978, *Pócs* 9066/CC (BSC). GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 540 m, 24.VI.1987, *Mustelier* 8245 (BSC).

Cyclodictyon varians (Sull.) Kuntze. GUANTÁNAMO, Baracoa, Duaba, El Dajao, 460-480 m, 11.X.1991, *Mustelier y Vicario* 12807 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 890-900 m, 30.III.1987, *Mustelier y Vicario* 5596 (BSC).

Hookeriopsis luteorufescens (Besch.) A. Jaeger. Registros de Welch (1969) y Buck (1998)

Hypnella leptorrhyncha (Hook. & Grev.) A. Jaeger. SANTIAGO DE CUBA, Pico Suecia, 1700-1750 m, 7.XII.1969, *Muñiz* 413 (HAC).

Hypnella pallicens (Hook.) A. Jaeger. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 26.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9063/AH (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, albergue de La China, 600-650 m, 11.XI.1989, *Motito et al.* 10279 (BSC).

Lepidopilidium portoricense (Müll. Hal.) H.A. Crum & Steere. GUANTÁNAMO, Sierra del Purial, norte de Imías, noreste del Puntón del Mate, 1067 m, 1943, *Bucher* 457 (HAC).

Lepidopilum amplirete (Sull.) Mitt. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 400 m, 15.XII.1994, *Motito y Potrony* 13220 (BSC). HOLGUÍN, Moa, Altiplanicie del Toldo, 900-1000 m, 12.X.1980, *Pócs* 9176/BB (BSC).

**Lepidopilum brevipes* Mitt. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Pico Kentucky, 1000 m, 5.IV.1982, *Buck* 7685 (BSC, HAC).

Lepidopilum longifolium Hampe. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 540 m, 24.VI.1987, *Mustelier* 8234 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, alrededores de La Isabela, 1100 m, 26.V.1979, *Pócs* 9128/AE (BSC).

Lepidopilum polytrichoides (Hedw.) Brid. GRANMA, Loma La Sabina, 1200-1300 m, 21.IV.1979, *Pócs y Duany* 9086/V (BSC). GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 540 m, 24.VI.1987, *Mustelier* 8236 (BSC).

Lepidopilum scabrisetum (Schwägr.) Steere. GRANMA, cañada cerca de Pino del Agua, 1300 m, 16.XII.1988, *Motito y Vicario* 9805 (BSC). GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 26.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9063/BN (BSC).

Pilotrichidium antillarum Besch. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, entre Yambeque y Puente Cubierta, 420-580 m, 9.V.1995, *Motito y Vicario* 13985 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 900-1525 m, 10.VI.1936, *Acuña* 354 (HAC).

Pilotrichum affine (Hook.) Brid. GRANMA, Pino del Agua, 1300 m, 16.XII.1988, *Motito y Vicario* 9415 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 2.IV.1982, *Buck* 7552 (BSC, HAC).

Pilotrichum bipinnatum (Schwägr.) Brid. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 26.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9064/AB (BSC).

Pilotrichum compositum (Hedw.) P. Beauv. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Yambeque, 550-580 m, 10.V.1995, *Motito y Vicario* 13451 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, entre Pico Palma Mocha y Las Lagunitas, 1200-1300 m, 16.IV.1979, *Pócs y Duany* 9079/Q (BSC).

Pilotrichum cristatum Mitt. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 10.XI.1983, *Mustelier* 5331, 8272 (BSC).

Pilotrichum evanescens (Müll. Hal.) Crosby. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Yambeque, 550-580 m, 10.V.1995, *Motito y Vicario* 14047 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, 575 m, 16.I.1985, *Mustelier* 5889 (BSC).

Pilotrichum lophophyllum Sull. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, San Esteban, 650 m, 20.XII.1994, *Lobaina* 13261 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 4.IV.1982, *Buck* 7621 (BSC, HAC).

Stenodictyon pallidum E. Britton ex H.A. Crum & Steere. GRANMA, La Bayamesa, firme Chago Wilson, Pico 1587, 1300-1400 m, 25.II.1987, *Mustelier y Vicario* 7807 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Cuba, 1800 m, 15.IV.1987, *Mustelier y Vicario* 6333 (BSC).

Thamniopsis incurva (Hornsch.) W.R. Buck. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-720 m, 30.IV.1997, *Motito y Vicario* 14907 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 1100 m, 7.VIII.1927, *Clemente* 1800 (HAC).

Thamniopsis undata (Hedw.) W.R. Buck. Registros de Welch (1969) y Buck (1998).

Trachyxiphium guadalupense (Brid.) W.R. Buck. GRANMA, Pico Bayamesa, vertiente norte, 1700 m, 18.III.1987, *Mustelier y Vicario* 9061 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, faldas del Pico Turquino, 10.VI.1936, *Acuña* 291 (HAC).

Trachyxiphium vagum (Mitt.) W.R. Buck. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, camino a la laguna, 540-600 m, 1.III.1998, *Motito* 15871 (BSC).

POLYTRICHACEAE

Atrichum androgynum (Müll. Hal.) A. Jaeger. GRANMA, camino a Pino del Agua, 1200 m, 13.XII.1988, *Motito y Vicario* 6967 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Palma Mocha, 1380 m, 16.IV.1979, *Pócs y Duany* 9083/V (BSC).

Atrichum angustatum (Brid.) B.S.G. GRANMA, Pico Bayamesa, 1200-1300 m, 14.XI.1986, *Mustelier y Vicario* 9063 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 2.IV.1982, *Buck* 7514 (BSC, HAC). *Pogonatum campylocarpum* (Müll. Hal.) Mitt. GRANMA, Pico Bayamesa, 1500-1700 m, 17.XII.1988, *Motito y Vicario* 18072 (BSC). Subida de California al Alto de La Gloria, 600-1400 m, 1.VIII.1987, *Panfet y Martin* 62568 (HAJB).

**Pogonatum pensylvanicum* (Hedw.) P. Beauv. GUANTÁNAMO, Baracoa, loma Los Guineos, 19.IV.1986, *Arias y Díaz* 67536 (HAJB). SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, falda norte, 900-1700 m, 10.VI.1936, *Acuña* 372 (HAC).

Pogonatum subflexuosum (Lor.) Broth. GRANMA, Pico Bayamesa, 1500-1700 m, 17.XII.1988, *Motito y Vicario* 6186 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, La Alcarraza, 600-700 m, 21.I.1989, *Motito* 9457 (BSC).

Pogonatum tortile (Sw.) Brid. GRANMA, Pino del Agua, 1300 m, 16.XII.1988, *Motito y Vicario* 8892 (BSC). HOLGUÍN, Moa, La Melba, Arroyo Bueno, 170 m, 18.IX.1997, *Potrony* 15242 (BSC).

Polytrichum juniperinum Hedw. GRANMA, Pico Bayamesa, 1200-1300 m, 17.XII.1988, *Motito y Vicario* 8924 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, La Alcarraza, camino a La Bayamita, 600 m, 28.I.1989, *Motito* 9741 (BSC).

POTTIACEAE

Anoectangium aestivum (Hedw.) Mitt. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 10.XI.1983, *Mustelier* 10740 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Pico Kentucky, 1000 m, 5.IV.1982, *Buck* 7667 (BSC, HAC)

Barbula agraria Hedw. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Quemados, 200 m, 12.IV.1998, *Motito y Vicario* 15504 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sardinero, 20-80 m, 9.IV.1982, *Shaw* 5371 (BSC, HAC).

Barbula arcuata Griff. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, entre Sabana y el Río Yumurí, pasando por Santa Rosa, 200 m, 15.IV.1998, *Motito y Vicario* 15553 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, Río Ramona, 500 m, 9.IV.1982, *Shaw* 5379 (BSC, HAC).

Barbula indica (Hook.) Spreng. var. *indica*. GRANMA, Cabo Cruz, 10-20 m, 20.I.1979, *Catasús* 3774 (HAC). GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Limones, 200-500 m, 9.VII.1989, *Motito* 11810 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Playa de Siboney, 20 m, 12.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9051/C (BSC).

Dolotortula mniifolia (Sull.) R.H. Zander. HOLGUÍN, orillas del Río Bariay, noreste del central Rafael Freyre,

30 m, 17.X.1978, *Pócs* 9020/BE (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Meseta Santa María del Loreto, orillas de arroyos, 520 m, 18.V.1979, *Pócs* 9108/H (BSC).

Gymnostomiella orcuttii E.B. Bartram. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Quemados, 200 m, 14.IV.1998, *Motito y Vicario* 15837 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Morro de Santiago de Cuba, cuevas en la ladera norte, 30 m, 8.V.1979, *Pócs* 9100/A (BSC).

Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del surgidero del Río Cuzco, 380 m, 17.XII.1994, *Motito y Potrony* 13320 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, La Caoba, 17.X.1989, *Motito y Potrony* 10081 (BSC).

Hyophila involuta (Hook.) A. Jaeger. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, cerca de Dos Mujeres, 700-750 m, 21.XI.1980, *Pócs y Caluff* 9183/C (BSC). HOLGUÍN, Banes, Cerro Antonio Barro, oeste de Aldea Filipina de Samá, 360 m, 19.X.1978, *Pócs y Borhidi* 9030/A (BSC).

Luisierella barbula (Schwägr.) Steere. SANTIAGO DE CUBA, La Maya, Jarahueca, finca Ojo de Agua, 350-400 m, 1935, *Acuña* 175 (HAC).

**Plaubelia sprengelii* (Schwägr.) R.H. Zander var. *sprengelii*. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del sumidero del Río Cuzco, 440 m, 15.XII.1994, *Motito y Potrony* 13204 (BSC).

Plaubelia sprengelii var. *stomatodonta* (Cardot) R.H. Zander. SANTIAGO DE CUBA, El Avispero, 150-250 m, 8.X.1997, *Potrony* 15153 (BSC).

**Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindenb. GUANTÁNAMO, Baracoa, Arroyo Blanco, 20-200 m, 11.V.1991, *Mustelier y Vicario* 12145 (BSC).

Pseudosymbblepharis schimperiana (Paris) H.A. Crum. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 26.XI.1978, *Pócs y Reyes* 9065/AN (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, entre Pico Kentucky y Pico Mogote, 800 m, 25.V.1979, *Pócs* 9125/D (BSC).

Quaesticula navicularis (Mitt.) R.H. Zander. GUANTÁNAMO, Río Jaibo, Palma, San Juan, 50 m, 1938, *Hioram* 12898 (HAC).

Splachnobryum obtusum (Brid.) Müll. Hal. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Quemados, 200 m, 14.IV.1998, *Motito y Vicario* 15523 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Alto del Puerto de Boniato, 350 m, 15.VII.1993, *Motito y Small* 7022 (BSC).

Tortella humilis (Hedw.) Jenn. HOLGUÍN, Nicaro, Levisa, sur-suroeste de Pico Cristal, 18.II.1976, *Catasús* 2775 (HAC). SANTIAGO DE CUBA, Alto de Villalón, Río Villalón, 575 m, 24.II.1975, *Reyes* 5869 (BSC).

Tortella linearis (Web. & Mohr.) R.H. Zander. SANTIAGO DE CUBA, Meseta Santa María del Loreto, orillas de arroyos, 520m, 18.V.1979, Pócs 9108/V(BSC).

Trichostomum fallaciosum Welch & H.A. Crum. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, alrededores de La Isabelica, 1130 m, 21.V.1979, Pócs y Duany 9112/D (BSC).

Trichostomum involutum Sull. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200-450 m, 1943, Carabia 482 (HAC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, bosque frente al albergue La China, 600-650 m, 11.XI.1989, Motito et al. 10161 (BSC).

Trichostomum subconnivens Thér. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Los Llanos, 420 m, 12.VIII.1938, León 18287 (HAC).

Trichostomum tenuirostre var. *gemmae* (Schimp.) R.H. Zander. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 5.IV.1982, Buck 7714 (BSC, HAC).

Weisiopsis spathulifolius H.A. Crum & E.B. Bartram. GUANTÁNAMO, Baracoa, Tabajó, 200 m, 9.V.1991, Mustelier y Vicario 12035 (BSC).

Weissia controversa Hedw. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Loma de La Bandera, 650 m, 13.XI.1978, Pócs y Reyes 9053/A (BSC). SANTIAGO DE CUBA, La Tabla, 550-650 m, 12.IV.2000, Trapero y Vicario 16611 (BSC).

Weissia jamaicensis (Mitt.) Grout. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Gran Tierra, Los Tubos, 400 m, 29.XII.1959, Alaín y López Figueiras 7027 (HAC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Alto de La Torre. 720-780 m, 30.IV.1997, Motito y Vicario 14890 (BSC).

PRIONODONTACEAE

Prionodon densus (Hedw.) Müll. Hal. GRANMA, Buey Arriba, subida entre Alto de La Bandera y Alto del Cojo, 1.VIII.1987, Panfet 62602 (HAJB). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Pico Cristal, 500-600 m, 14.II.1989, Motito y Vicario 9780 (BSC).

PTEROBRYACEAE

Calyptothecium duplicatum (Schwägr.) Broth. GRANMA, Pico Regino, 1600 m, 20.IV.1979, Pócs 9091/AG (BSC). SANTIAGO DE CUBA, entre Pico Palma Mocha y Las Lagunitas, 1200-1300 m, 16.IV.1979, Pócs y Duany 9079/W (BSC).

Henicodium geniculatum (Mitt.) W.R. Buck. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, camino al Arroyo Sonador, 550-650 m, 6.XII.1997, Motito et al. 15649 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, alrededores del Río Brazo Fuerte, 220 m, 13.V.2004, Motito y Rivera 18262 (BSC).

Hildebrandtiella guyanensis (Mont.) W. R. Buck. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, La Prenda, norte de GUANTÁNAMO, 250 m, 29.XII.1920, Hioram 4121 (HAC). SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 1100 m, 9.XI.1920, Clemente 301 (HAC).

Jaegerina scariosa (Lor.) Arzeni. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Arroyo Negro, 1000 m, 5.IV.1982, Buck 7679 (BSC, HAC). La Lata, Brazo Escondido, sur de Filé, 400-500 m, 24.XII.1969, Borhidi y Muñiz 225f (HAC).

**Orthostichopsis tetragona* (Sw. ex Hedw.) Broth. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 26.XI.1978, Pócs y Reyes 9064/A (BSC).

Orthostichopsis tortipilis (Müll. Hal.) Broth. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1100 m, 5.IV.1982, Buck 7637 (BSC, HAC).

Pirella angustifolia (Müll. Hal.) Arzeni. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, valle del Río Arenal, 900-1000 m, 21.V.1979, Pócs et al. 9111/G (BSC).

Pirella cymbifolia (Sull.) Cardot. SANTIAGO DE CUBA, La Lata, Brazo Escondido, sur de Filé, 500 m, 25.X.1969, Borhidi y Muñiz 997 (HAC).

Pirella filicina (Hedw.) Cardot. GRANMA, La Bayamesa, firme Chago Wilson, Pico 1587, 1300-1400 m, 25.II.1987, Mustelier y Vicario 7822 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 1922, León 11280 (HAC).

**Pirella pohlii* (Schwägr.) Cardot. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, al este del Alto del Mango, 750 m, 23.X.1980, Pócs y Caluff 9198/D (BSC).

Pirella pycnothalloides (Müll. Hal.) M. Fleisch. SANTIAGO DE CUBA, Alto de La Francia, 1300-1400 m, 21.XII.1986, Mustelier y Vicario 7825 (BSC).

PYLAISIADELPHACEAE

Aptychella prolifera (Broth.) Herzog. GRANMA, Pino del Agua, camino a La Bayamesa desde El Nueve, 1372-1400 m, 20.VI.2003, Potrony 17928 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 1300-1800 m, 10.VI.1936, Acuña 338 (HAC).

Heterophyllum acunae Thér. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 1200-1800 m, 10.VI.1936, Acuña 270 (HAC).

Heterophyllum subpiligerum Thér. SANTIAGO DE CUBA, Pico Turquino, 1600-1700 m, 10.VI.1936, Acuña 366 (HAC).

Isopterygium longisetulum (Müll. Hal.) Paris. GUANTÁNAMO, Meseta de Maisí, Santa Rosa, 200 m, 17.IV.1998, Motito y Vicario 15538 (BSC).

Isopterygium subbrevisetum (Hampe) Broth. SANTIAGO DE CUBA, Meseta Santa María del Loreto, norte de Yerba de Guinea, 240 m, 27.X.1980, Pócs y Caluff s/n (BSC).

Isopterygium tenerum (Sw.) Mitt. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del surgidero del Río Cuzco, 380 m, 14.XII.1994, Motito y Potrony 13337 (BSC).

Taxithelium planum (Brid.) Mitt. HOLGUÍN, Ramírez, noreste de Melones, 50 m, 16.X.1978, Pócs 9018/B (BSC). SANTIAGO DE CUBA, alrededores del Río Brazo Fuerte, 220 m, 13.V.2004, Motito y Rivera 18258 (BSC).

Taxithelium portoricense R.S. Williams. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 5.XII.1997, Motito et al. 15619 (BSC).

Wijkia flagellifera (Broth.) H.A. Crum. SANTIAGO DE CUBA, Sierra Maestra, Loma del Gato, 800-1100 m, s.d., Hioram 12480 (HAC).

RACOPILACEAE

Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 10.XI.1983, Mustelier 10517 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, La Lata, alrededores del Río Babosa, 300 m, 13.V.2004, Motito y Rivera 18243 (BSC).

RHIZOGONIACEAE

Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt. GRANMA, Pico Bayamesa, 1300-1500 m, 17.XII.1988, Motito y Vicario 9820 (BSC). GUANTÁNAMO, Viento Frío, cuenca superior del Río Barbudo. 7.VI.2004, Motito et al. 18648 (BSC).

RUTENBERGIACEAE

Pseudocryptphaea domingensis (Spreng.) W.R. Buck. HOLGUÍN, Sierra Cristal, camino de Baconal a La Zanja, 350-510 m, 30.III.2004, Motito 18193 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, alrededores del Río Brazo Fuerte, 220 m, 13.V.2004, Motito y Rivera 18263 (BSC).

SEMATOPHYLLACEAE

Acporium caespitosum (Hedw.) W.R. Buck. GRANMA, La Bayamesa, Nuevo Mundo, El Obelisco, 1000-1050 m, 15.XII.1988, Motito y Vicario 8801 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1100-1200 m, 29.XII.1987, Motito 8636 (BSC).

**Acporium estrellae* (Müll. Hal.) W.R. Buck. GRANMA, cañada cerca de Pino del Agua, 1300 m, 16.XII.1988, Motito y Vicario 9843 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-700 m, 29.IV.1997, Motito y Vicario 14800 (BSC).

Acporium longirostre (Brid.) W.R. Buck. GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 500-600 m, 11.XII.1997, Motito et al. 15747 (BSC). SANTIAGO DE CUBA,

Sierra Cristal, Arroyo Manzano, entre La China y Batista, 600-650 m, 10.XI.1989, Motito et al. 10212 (BSC).

Acporium pungens (Hedw.) Broth. HOLGUÍN, Moa, La Melba, cerca de la Cascada Dos Comadres, 400 m, 10.X.1980, Pócs y Reyes 9170/AF (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 2.IV.1982, Shaw 5072 (BSC, HAC).

**Donnellia commutata* (Müll. Hal.) W. R. Buck. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, La Micro Onda, 700 m, 26.IV.1997, Motito y Vicario 15037 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 6.IV.1982, Buck 7760 (BSC, HAC).

Meiothecium boryanum (Müll. Hal.) Mitt. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, La Micro Onda, 700 m, 24.VI.1997, Motito y Vicario 15039 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Dos Bocas, Caja de Agua, cerca de SANTIAGO DE CUBA, 1936, Clemente 2109 (HAC).

Rhaphidostichium acrostostegium (Sull.) W. R. Buck. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, camino, 540-600 m, 1.III.1998, Motito 15881 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, Arroyo Manzano, entre La China y Batista, 600-650 m, 10.XI.1989, Motito et al. 10258 (BSC).

Rhaphidostichium schwaneckeanum (Müll. Hal.) Broth. GRANMA, Pico Bayamesa, 1700 m, 15.XI.1986, Mustelier y Vicario 9069 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 2.IV.1982, Buck 7520 (BSC, HAC).

Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton. Registro de Buck (1998)

Sematophyllum cuspidiferum Mitt. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 720 m, 28.IV.1997, Motito y Vicario 14825 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, camino a Canadá, 650 m, 15.II.1989, Motito et al. 10510 (BSC).

Sematophyllum galipense (Müll. Hal.) Mitt. GRANMA, camino a Las Canarias, Victorino, 570 m, 6.IX.2004, Rivera 18432 (BSC). GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del surgidero del Río Cuzco, 400 m, 17.XII.1994, Motito y Potrony 13390 (BSC).

Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, cerca del surgidero del Río Cuzco, 380 m, 17.XII.2004, Motito y Potrony 13383 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000 m, 6.IV.1982, Buck 7718 (BSC, HAC).

Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, camino hacia San Juan, 300 m, 16.XII.1994, Motito y Potrony 13934 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Loma La Mensura, 660 m, 13.XI.1978, Pócs y Reyes 9055/BB (BSC).

Sematophyllum swartzii (Schwägr.) Welch & H.A. Crum. GRANMA, Loma La Sabina, 1100-1200 m, 19.IV.1979, Pócs y Duany 9085/O (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, cabezas del Río Miguel, Arroyo Manzano, 680 m, 24.III.2001, Motito 17195 (BSC).

**Sematophyllum tequendamense* (Hampe) Mitt. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, alrededores de La Isabelica, 1000 m, 7.IV.1982, Shaw 5346 (BSC, HAC).

Trichosteleum sentosum (Sull.) A. Jaeger. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 200 m, 26.XI.1978, Pócs y Reyes 9063/AD (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, camino a La Zanja, 700 m, 23.III.2001, Motito et al. 17252 (BSC).

SPHAGNACEAE

Sphagnum henryense Warnst. HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cayo La Plancha, 700 m, 1964, Alain et al. 8015 (HAC).

Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russow. HOLGUÍN, Sagua de Tánamo, Sierra de Santa Catalina, 400 m, 1909, Cowell y Baker 4 (HAC).

Sphagnum macrophyllum Bernh. ex Brid. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, 540 m, 28.II.1998, Motito 16029 (BSC). HOLGUÍN, Moa, La Melba, cerca de la Cascada Dos Comadres, 400 m, 10.X.1980, Pócs y Reyes 9170/Z (BSC).

Sphagnum magellanicum Brid. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, 540 m, 29.II.1998, Motito 15989 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, La Presita, detrás de la Academia, 650 m, 7.V.1997, Motito y Vicario 15011 (BSC).

Sphagnum meridense (Hampe) Müll. Hal. GRANMA, Buey Arriba, Alto del Rondón, 22.V.1988, Panfet 65077 (HAJB). GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, 540 m, Álvarez y Berazaín s/n (HAJB). SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, camino a La Zanja, 680 m, Motito et al. 16996 (BSC).

Sphagnum palustre L. SANTIAGO DE CUBA, Sierra Cristal, alrededores y afluentes del Río Miguel, 500 m, 25.III.2001, Potrony y Trapero 17043 (BSC).

Sphagnum perichaetiale Hampe. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, 540 m, 28.II.1998, Motito 16028 (BSC). HOLGUÍN, Revuelta de Los Chinos, ladera noreste, 850-980 m, 12.X.1980, Pócs 9175/A (BSC).

Sphagnum portoricense Hampe. GUANTÁNAMO, Alto de Iberia, 540 m, 28.II.1998, Motito 15900, 16030, 16059, 16082, (BSC).

Sphagnum recurvum P. Beauv. SANTIAGO DE CUBA, Loma del Gato, 1100 m, 1935, Clemente 2002 (HAC).

**Sphagnum strictum* Sull. SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, 1000-1200 m, 4.IV.1982, Buck 7622, 7623 (BSC, HAC).

STEREOPHYLLACEAE

Entodontopsis leucostega (Brid.) W.R. Buck & Irel. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, Limonar, camino hacia San Juan, 300 m, 16.XII.1994, Motito y Potrony 13960 (BSC).

Eulacophyllum cultelliforme (Sull.) W.R. Buck & Irel. GUANTÁNAMO, Meseta del Guaso, entre Yambeque y Puente Cubierta, 420-580 m, 9.V.1995, Motito y Vicario 13919 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, La Lata, Brazo Escondido, sur de Filé, 500 m, 24.X.1969, Muñiz y Borhidi 237 (HAC).

Stereophyllum radiculosum (Hook.) Mitt. HOLGUÍN, Banes, Cerro Antonio Barro, oeste de Aldea Filipina de Samá, 300 m, 19.X.1978, Pócs 9029/L (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, norte de la torre de TV sobre el Retiro, 425 m, 14.V.1979, Pócs 9103/B (BSC).

THUIDIACEAE

Cyrtos hypnum involvens (Hedw.) W. R. Buck & H. A. Crum. GUANTÁNAMO, Viento Frío, camino de Vía Mulata a Arroyo La Pulga (La Gurbia), 740 m, 04.VI.2004, Motito et al. 18588 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, alrededores de La Isabelica, 1000 m, 7.IV.1982, Shaw 5340 (BSC, HAC).

Cyrtos hypnum minutulum (Hedw.) W.R. Buck & H.A. Crum. GRANMA, La Bayamesa, Arroyo Nuevo Mundo, 1000-1050 m, 15.XII.1988, Motito y Vicario 8800 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-720 m, 29.IV.1997, Motito y Vicario 14850 (BSC).

Cyrtos hypnum scabrosulum (Mitt.) W.R. Buck & H. A. Crum. Registro de Buck (1998).

Cyrtos hypnum schistocalyx (Müll.Hal.) W.R. Buck & H. A. Crum. SANTIAGO DE CUBA, La Lata, Brazo Escondido, sur de Filé, 400-500 m, 24.X.1969, Borhidi y Muñiz 209, 223, 247 (HAC).

**Rauiella praelonga* (Schimp. ex Besch.) Wijk & Margad. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 450-540 m, 10.XI.1983, Mustelier 5082, 5085 (BSC).

Thuidium delicatulum (Hedw.) A. Schimp. in B.S.G. GRANMA, Loma La Sabina, ladera noroeste, 900 m, 13.IV.1979, Pócs y Duany 9076/W (BSC). GUANTÁNAMO, Piedra La Vela, 600 m, 5.XII.1997, Motito et al. 15681 (BSC). SANTIAGO DE CUBA, Gran Piedra, Alto sobre Ocaña, 900 m, 25.V.1979, Pócs 9122/C (BSC).

Thuidium pseudoprotensum (Müll. Hal.) Mitt. GUANTÁNAMO, Yunque de Baracoa, 540 m, 24.VII.1987, Mustelier 14712 (BSC).

Thuidium urceolatum Lor. GRANMA, La Bayamesa, Arroyo Nuevo Mundo, 1000 m, 12.XII.1988, Motito y Vicario 6130 (BSC). HOLGUÍN, Sierra de Nipe, Cuchuflí, 640-700 m, 29.IV.1997, Motito y Vicario 14859 (BSC).

Referencias

- Aguirre, C.J. & Rangel-Ch, J.O. 2005. Species diversity and richness of the mosses of the Colombian Choco Region. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 97: 97-116.
- Allen, B.H. & Crosby, M.R. 1986a. Revision of the genus *Crossomitrium* (Muscic: Meteoriaceae) *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 61: 423-476.
- Allen, B.H. & Crosby, M.R. 1986b. A revision of the genera *Pilotrichidium* and *Diploneuron* (Muscic: Hookeriaceae) *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 61: 45-64.
- Ardiles, V.; Cuvertino, J. & Osorio, F. 2008. Guía de campo briófitos de los bosques templados austarles de Chile. Una introducción al estudio de los musgos, las hepáticas y los antocerotes que habitan en los bosques de Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción. 168 pp.
- Bizot, M. 1965. Contribution a la flore bryologique de Cuba. *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne et des Sociétés Botanique de Lyon* 34: 305-328.
- Bizot, M. 1973. Contribution a la flore bryologique de Cuba, 2. *The Bryologist* 76: 340-346.
- Britton, E.G. 1922. On some mosses from the Blue Mountain of Cuba. *The Bryologist* 25: 89-90.
- Brummitt, R.K. & Powell, C.E. 1992. Authors of plant names. Royal Botanical Gardens, Kew.
- Buck, W.R. 1984. Taxonomic and nomenclatural notes on West Indian Hypnaceae. *Brittonia* 36: 178-183.
- Buck, W.R. 1987a. Notes on Asian Hypnaceae and associated taxa. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 45: 519-527.
- Buck, W.R. 1987b. Taxonomic and nomenclatural rearrangement in the Hookeriales with notes on West Indian taxa. *Brittonia* 39: 210-224.
- Buck, W.R. 1988. Another view of familial delimitation in the Hookeriales. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 64: 29-36.
- Buck, W.R. 1989a. *Henicodium* replaces *Leucodontopsis* (Pterobryaceae). *The Bryologist* 92: 534.
- Buck, W.R. 1989b. Miscellaneous notes on Antillean mosses. 2. *Rhaphidostichium* (Sematophyllaceae) in the New World. *Moscosoa* 5: 189-193.
- Buck, W.R. 1991. Notes on Neotropical Pterobryaceae. *Brittonia* 43: 96-101.
- Buck, W.R. 1994a. Myriiniaceae. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.) The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 869-871.
- Buck, W.R. 1994b. A new attempt at understanding the Meteoriaceae. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 75: 51-72.
- Buck, W.R. 1998. Pleurocarpous mosses of the West Indies. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 82: 1-387.
- Buck, W.R. & Ireland, R.R. 1985. A reclassification of the Plagiotheciaceae. *Nova Hedwigia* 41: 89-125.
- Bytebier, B. & Chaut-Petiot, M. 2007. A preliminary checklist of the bryoflora of the Taita Hills, Kenya. *Tropical Bryology* 22: 55-66.
- Churchill, S.P. & Linares, E. 1995. *Prodromus Bryologiae Novo-Granatensis*. Introducción a la flora de musgos de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Parte I y II. 925p.
- Churchill, S.P. & Salazar Allen, N. 2001. Mosses. In: Gradstein, S.R.; Churchill, S.P. & Salazar Allen, N. Guide to the bryophytes of tropical America. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 86. Pp. 240-571.
- Crosby, M.R. & Magill, R.E. 1977. A dictionary of mosses. *Monographs Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 3: VII + 43.
- Crosby, M.R.; Magill, R.E & Bauer, C.R. 1992. Index of mosses 1963-1989. *Monographs Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 42: 1-646.
- Crum, H.A. 1972. A taxonomic account of the Erpodiaceae. *Nova Hedwigia* 23: 201-224.
- Crum, H.A. 1994. *Dicranella*. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 112-116.
- Crum, H.A. & Buck, W.R. 1994. Anomodontaceae. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 680-686.
- Dauphin, G. & Grayum, M.H. 2005. Bryophytes of the Santa Elena Peninsula and Islas Murciélagos, Guanacaste, Costa Rica, with special attention to neotropical dry forest habitats. *Lankesteriana* 5: 53-61.
- De Luna, E. & Buck, W.R. 1991. An undescribed species of *Braunia* (Hedwigiacae) from the Andean cloud forest. *The Bryologist* 94: 401-403.
- Duarte, P.P. 1982a. Musgos cubanos: su presencia mundial. *Acta Botanica Cubana* 9: 1-19.
- Duarte, P.P. 1982b. Nueva especie de *Amblytropis* (Muscic: Daltoniaceae) de Cuba. *Acta Botanica Cubana* 13: 1-5.
- Duarte, P.P. 1995. *De musci cubensibus notulae (in floram novan cubensem studia intendentia)*. *Fontqueria* 42: 117-118.
- Duarte, P.P. 1997. Musgos de Cuba. *Fontqueria* 47: 1-717.
- Frahm, J.P. 1987. A revised list of the *Campylopus* species in the world. *Bryologische Beitraege* 7: 1-117.
- Frahm, J.P. 1991. Dicranaceae: Campylopodioideae, Paraleucobryoideae. *Flora Neotropica* 54: 1-238.
- Goffinet, B & Buck, W.R. 2010. Classification of the Bryophyta. Disponible en <<http://www.eeb.uconn.edu/people/goffinet/Classificationmosses.html>> Acceso a 1 abril 2010.
- Holmgren, P.K. & Holmgren, N.H. 2001. *Index Herbariorum*. *Taxon* 50: 605.
- Holmgren, P.K.; Holmgren, N.H. & Barnet, L.C. (eds.). 1990. *Index Herbariorum*. Ed. 8. Regnum Vegetabile

120. New York Botanical Garden, Bronx.
- Holz, J.; Schäfer-Verwimp, A.; Allen, B. & Buck, W.R. 2002. New and noteworthy mosses from Costa Rica. *Journal of Bryology* 24: 321-324.
- Ireland, R.R. 1986. Synopsis of the genus *Taxiphyllum* for North America. *Lindbergia* 12: 153-157.
- Ireland, R.R. 1992. The moss genus *Isopterygium* (Hypnaceae) in Latin America. *Tropical Bryology* 6: 111-132.
- Koponen, A. 1981. Splachnobryaceae, a new moss family. *Annales Botanici Fennici* 18: 123-132.
- Lehmann, J.G.Ch. 1834. *Novarum et minus cognitarum stirpium pugillus* 6: 1-66.
- León, Hno. 1933. Catalogue des mousses de Cuba. *Annales de Cryptogamie Exotique* 6(3-4): 1-50.
- Lewis, G.J.; Ingram, J.M. & Bradfield, J.E. 2004. Diversity and habitat relationships of bryophytes at an ultramafic site in southern British Columbia. Pp. 199-204. In: Boy, R.S.; Baker, A.J.M. & Proctor, J. (eds.). Ultramafic rocks: their soils, vegetation and fauna. Proceedings of the Fourth International Conference on Serpentine Ecology, La Habana.
- Magill, R.E. 1994. *Aptychella*. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 979.
- Manuel, M.G. 1994. Cryphaeaceae. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 693-695.
- McFarland, K.D. 1994. *Palamocladium*. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of The New York Botanical Garden* 69: 910-911.
- Menzel, M. 1985. Die Gattung *Pogonatum* P. Beauv. (Polytrichales, Musci) in Lateinamerika 1. Taxonomie und Geographie von *Pogonatum campylocarpum* (C. Müll.) Mitt. und *P. subflexuosum* (Lor.) Broth. *Lindbergia* 11: 134-140.
- Merwin, M.C.; Gradstein, S.R. & Nadkarni, N.M. 2001. Epiphytic bryophytes of Monteverde, Costa Rica. *Tropical Bryology* 20: 63-70.
- Nishimura, N. & Ando, H. 1994. *Ectropothecium*. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 1037-1039.
- Ochi, H. 1980. A revision of the Neotropical Bryoideae, Musci (First Part). *Journal of the Faculty of Education, Tottori University, Natural Science* 29: 49-154.
- Ochi, H. 1981. A revision of the neotropical Bryoideae, Musci (Second Part). *Journal of the Faculty of Education, Tottori University, Natural Science* 30: 21-55.
- Ochi, H. 1994. *Bryum*. Subfamily Bryoideae. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 454-489.
- Pursell, R.A. 1994. Fissidentales. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 31-81.
- Pursell, R.A. 1999. Taxonomic notes on Neotropical *Fissidens* III. Addendum II. *The Bryologist* 102: 125-127.
- Pursell, R.A. 2007. Fissidentaceae. *Flora Neotropica* 101: 1-278.
- Pursell, R.A.; Bruggeman Nannenga, M.A. & Iwatsuki, Z. 1992. Species of *Fissidens* (Fissidentaceae, Musci) common to the Neotropics, Asia and Africa. *Bryobrothera* 1: 49-55.
- Reese, W.D. 1993. Calymperaceae. *Flora Neotropica* 58: 1-99.
- Salazar Allen, N. 1992. Notas para la revisión de las especies de *Octoblepharum* del neotrópico. *Tropical Bryology* 6: 171-179.
- Salazar Allen, N. 1993a. Taxonomic results of the BRYOTROP Expedition to Zaire and Rwanda. 16. Leucophanaceae. *Tropical Bryology* 8: 149-152.
- Salazar Allen, N. 1993b. Leucophanaceae. *Flora Neotropica* 59: 1-9.
- Schubert, R. 1978. Beitrag zur Mossflora Kubas. *Feddes Repertorium* 89: 307-326.
- Smith, D.K. 1994. Funariaceae. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 427-442.
- Šoltes, R. 2000. Habitats for rare bryophytes in Slovakia. *Lindbergia* 25: 124-127.
- Spessard-Schueth, L. 1994. *Meteoriump*. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 69: 729-732.
- Streimann, H. 1993. *Barbella trichophora*, on older name for *B. cubensis* (Musci: Meteoriaceae). *The Bryologist* 96: 223-225.
- Sullivant, W. 1861. Musi Cubense, or mosses collected by Charles Wright in the eastern part of the island of Cuba during the years 1856, 1857, and 1858. *Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences* 5: 273-290.
- Thériot, I. 1939. Complements au catalogue des mousses de Cuba et révision de plusieurs genres. *Memorias de la Sociedad Cubana de Historia Natural "Felipe Poey"* 13: 203-222.
- Thériot, I. 1940. Complements au catalogue des mousses de Cuba et révision de plusieurs genres. *Memorias de la Sociedad Cubana de Historia Natural "Felipe Poey"* 14: 369-372.
- Thériot, I. 1941. Complements au catalogue des mousses de Cuba et révision de plusieurs genres. *Memorias de la Sociedad Cubana de Historia Natural "Felipe Poey"* 15: 211-234.
- Welch, W.H. 1950. A contribution to the bryophytes flora of Cuba. *The Bryologist* 53: 238-243.

- Welch, W.H. 1969. The Hookeriaceae of Cuba. The Bryologist 72: 93-136.
- Wijk, R. van der; Margadant, W.D. & Florschütz, P.A. 1959-1969. *Index Muscorum I*. Regnum Vegetable 17: 1-548; 26: 1-535; 33: 1-529; 48: 1-604; 65: 1-922. International Association for Plant Taxonomy, Utrecht.
- Williams, R.S. 1919. *Archidium cubense*, sp. nov. The Bryologist 22: 2.
- Williams, R.S. 1921. *Hyophila subcucullata* sp. nov. The Bryologist 24: 22-23.
- Zander, R.H. 1981. Descriptions and illustrations of *Barbula*, *Pseudocrossidium* and *Bryoerythrophyllum* (p.p.) of Mexico. Cryptogamie Bryologie Lichénologie 2: 1-22.
- Zander, R.H. 1983. A reevaluation of *Neohyophila* Crum (Pottiaceae). The Bryologist 86: 134-139.
- Zander, R.H. 1993. Genera of the Pottiaceae: Mosses of Harsh Environments. Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences 32: 1-378.
- Zander, R.H. 1994. *Barbula*. In: Sharp, A.J.; Crum, H. & Eckel, P.M. (eds.). The moss flora of Mexico. Memoirs of the New York Botanical Garden 69: 286-296.
- Zündorf, H. J. 1989. Zur Erforschung der Laubmoosflora von Cuba. Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Mat.-Naturwiss. Reihe 38: 217-230.

Artigo recebido em 16/06/2009. Aceito para publicação em 12/07/2010.