ENSAIO PARA A TAXONOMIA DAS POLIPORÁCEAS

A. Ribeiro Teixeira

INTRODUÇÃO

Ao novel estudante de nossas poliporáceas carece um manual que o guie na determinação das espécies. Até mesmo lhe é dificultado o reconhecimento dos vários gêneros. Isso, porque não existe em português um trabalho que trate com especialidade da taxonomia dessa grande família. Em idiomas estrangeiros encontramos vários, como os de Bourdot e Galzin (3), Killermann (5), Lowe (7), Overholts (9, 10, 11, 12), e muitos outros, que tratam do assunto, trazendo chaves e explicações essenciais. Porém, tais trabalhos nem sempre estão ao alcance de nossos estudantes, quer pela dificuldade na sua obtenção, quer devido aos idiomas em que estão escritos, nem sempre a tal ponto conhecidos que se tornem de fácil manejo.

Querendo sanar essa dificuldade, fazemos sair a lume este trabalho, organizado de tal modo a proporcionar o máximo de ensinamentos, em um mínimo de palavras. Todavia, como o próprio título indica, isto não passa de um ensaio.

Com os conhecimentos básicos aqui explanados, esperamos que o estudante possa classificar, **pelo menos até gênero**, as "orelhas de pau" que fôr encontrando em seus passeios pelos bosques, ou outros lugares que tais. Quanto a chegar até espécie, dependerá de estudos mais aprofundados, de minuciosas e cansativas pesquisas bibliográficas, e de um frequente intercâmbio com especialistas estrangeiros.

O ideal seria possuímos um herbário completo, ou o mais completo possível, contendo as espécies brasileiras devidamente estudadas e classificadas, e de fácil acesso ao estudante. Tal, porém, não existe. Aqui e ali existem, ainda embrionariamente, alguns herbários que poderão, em um futuro mais longínquo, oferecer as vantagens que dêles esperamos. A sua completação dependerá do interesse que fôr tomado pelo estudo destes fungos. Com o crescente intercâmbio com especialistas estrangeiros, poderemos obter, por permuta, preciosos espécimes devidamente classificados, que nos serão de inestimável valor para comparação com os que posuímos.

É mister incrementar-se a constituição de herbários micológicos nas escolas. E da parte micológica, nada mais atraente e fácil para o aluno, que coletar "orelhas de pau". De cada coleta feita, uma parte será enviada a especialistas, para identificação, enquanto a outra sofrerá os processos rotineiros, e seguirá para o seu respectivo lugar na coleção. Dentro em pouco, com a classificação feita por aquêles especialistas, teremos já um bom acervo de espécimes prontos para serem trabalhados. E assim, crescendo dia a dia, em tôdas as escolas do país, em breve teremos o tão ambicionado

herbário completo, contendo as espécies brasileiras. Naturalmente, aqui falamos só das poliporáceas. Todavia, o mesmo deveria ser feito com respeito a toda nossa flora micológica, e mais ainda : com toda a nossa flora em geral.

Para completa compreensão dos termos usados na descrição das poliporáceas, e sua acertada aplicação, inserimos aqui um glossário ilustrado, para o qual chamamos a atenção do interessado.

* * *

Desejamos externar aqui os nossos muito particulares agradecimentos ao Sr. José de Castro Mendes, desenhista-técnico, que de tão boa vontade se prontificou a nos auxiliar na execução das ilustrações.

MÉTODO DE PESQUISAS

Os vários caracteres são examinados à vista desarmada, ou com o auxílio de uma lupa (de 10 a 20X), ou ainda sob o microscópio.

Para a realização dos cortes, e respectiva montagem em lâminas, usamos o método à mão livre, muito bem descrito por A. P. Viégas (13), e que se resume no seguinte, em se tratando de poliporáceas :

1. separar, com o auxílio de um canivete, um pequeno pedaço do corpo de frutificação a ser estudado ;
2. colocar em álcool a 90%, por 3 a 5 segundos, e, em seguida, em água destilada, por 5 a 10 minutos (para amolecer bem e facilitar o corte) (*);
3. cortar longitudinalmente a medula de sabugueiro, ou outra semelhante, e colocar dentro o material, prendendo depois as partes com um pequeno elástico, ou com uma pinça especial ;
4. fazer os cortes com a navalha comum, e colocá-los em vidro de relógio com água destilada ;
5. colocar os cortes em lâminas com gotas de :
 - a) ácido láctico a 50% (não altera a coloração das hifas) ;
 - b) sol. de potassa a 4-6% (reage em certas hifas coloridas, tornando-as ferrugíneas) ;
 - c) sol. de potassa a 4-6%, mais sol. aquosa de **eosina** a 1% (corante) ;
6. cobrir com a lamínula.

Quando necessitamos de algum detalhe, para a obtenção do qual seja preciso o uso da objetiva de imersão, **lutamos** a lamínula, i.é, por meio de uma mistura, em partes iguais, de cera e parafina, prendemos a margem da lamínula à lâmina. Isso, para que não haja o perigo de a lamínula se deslocar durante o ato da pesquisa, prejudicando a observação dos cortes.

(*) Tal passo não será necessário, em se tratando de material fresco.

P O L Y P O R A C E Æ

A família *Polyporaceæ* faz parte do grande grupo dos basidiomicetos, e pode ser localizada como segue :

Os basidiomicetos dividem-se em dois grandes grupos : *Heterobasidiomicetos* e *Homobasidiomicetos*.

A. Heterobasidiomicetos — possuem heterobasídias, i.é, basídias septadas ou profundamente sulcadas, e de diferentes formas (Est. XXVI, fig. 33 a 37).

1. as basídias não se agregam para formar himênio. Não existe corpo de frutificação definido. São parasitas obrigatórios. Neste grupo entram os carvões e as ferrugens..... *Ustilaginales* e *Uredinales*
2. as basídias se agregam para formar o himênio. Há corpo de frutificação definido. São principalmente sapróbios *Auriculariales*, *Tremellales* e *Dacryomycetales*

B. Homobasidiomicetos — possuem homobasídias, i.é, basídias típicas, clavadas, não septadas (Est. XXVI, fig. 38 a 40).

1. se o himênio é sempre exposto, ou ao menos se expõe quando amadurecem os esporos, temos..... *Hymeniales*
2. se, por outro lado, o himênio permanece encerrado dentro do corpo de frutificação, mesmo depois que amadurecem os esporos, temos tôdas as ordens que compõem o grupo dos chamados..... *Gasteromicetos*

Outra divisão também usada para os basidiomicetos, é aquela que os separa em três grupos, a saber :

A. Hemibasidiomicetos — aquêles que não têm himênio, nem corpo de frutificação definido.... *Ustilaginales* e *Uredinales*

B. Himenomicetos — aquêles que, possuindo himênio e corpo de frutificação definido, conservam aquêle sempre exposto, ou o expõem quando amadurecem os esporos.....
... *Auriculariales*, *Tremellales*, *Dacryomycetales* e *Hymeniales*

C. Gasteromicetos — aquêles que conservam o himênio encerrado dentro do corpo de frutificação, mesmo quando amadurecem os esporos..... *Hymenogastreales*, *Phallales*, *Lycoperdales*, *Sclerodermatales* e *Nidulariales*

A ordem *Hymeniales*, por sua vez, divide-se nas seguintes famílias :

1. himênio cobrindo por todos os lados uma superfície lisa, de clavas, ramificadas ou não..... *Clavariaceæ*
2. himênio unilateral, espalhado sobre uma superfície lisa ou enrugada..... *Thelephoraceæ*

3. himênio unilateral, desenvolvendo-se sôbre dentes..... *Hydnaceæ*
4. himênio unilateral, desenvolvendo-se sôbre lamelas..... *Agaricaceæ*
5. himênio unilateral, desenvolvendo-se sôbre as paredes de poros..... *a*
 - a. frutificação gelatinosa, com poros pouco definidos..... *b*
 - a. frutificação não gelatinosa, com poros bem definidos..... *c*
- b. efuso-reflexa a sêssil, nunca estipitada ; tubos muito rasos, irregulares, formados por paredes membranosas, semelhantes a simples dobras..... *Meruliaceæ*
- c. tubos profundos, de paredes bem definidas, perfeitamente ligados ao contexto, mas não ligados entre si, ou muito frouxamente apenas *Fistulinaceæ*
- c. tubos profundos, de paredes bem definidas, perfeitamente ligados entre si, mas frouxamente ligados ao contexto, podendo ser separados dêste em camada independente. Frutificação carnoso-mole *Boletaceæ*
- c. tubos profundos e bem definidos, perfeitamente ligados entre si e com o contexto. Os poros variam em forma, desde a circular até a lamelar. Frutificação geralmente coriácea a lenhosa *Polyporaceæ*

Podemos, pois, definir as poliporáceas como sendo basidiomicetos com corpo de frutificação definido, com basídias que se agregam para formar o himênio ; êste permanece sempre exposto, e é formado por basídias que se dispõem sôbre as paredes de poros colocados em um só lado do corpo de frutificação ; tubos profundos e bem definidos, perfeitamente ligados entre si e ao contexto ; as basídias são clavuladas, não septadas, e trazem no tôpo quatro esterigmas que produzem, cada um, um esporo na extremidade ; os esporos não se tornam septados ao germinar, germinando diretamente, sem produzir esporos secundários. O corpo de frutificação é de consistência geralmente coriácea a lenhosa, rija. Vegetam principalmente sôbre madeira.

* * *

No estudo da taxonomia das espécies desta família, temos que levar em consideração vários caraterísticos fundamentais, não só externos, mas também outros, anatômicos, só visíveis com o auxílio de uma boa lupa, ou mesmo do microscópio.

Os principais caraterísticos pelos quais nos baseamos na distinção das espécies, são : natureza anual ou perene ; se ressupinada ou não ; formato dos poros ; se há ou não continuidade entre a trama dos tubos e o contexto ; presença de estipe ; natureza da superfície do píleo ; consistência e coloração do contexto ; caraterísticos gerais dos tubos ; caraterísticos do himênio, tais sejam : presença de setas, cistídias, paráfises, etc. ; caraterísticos gerais dos esporos.

Tendo em mente todos êstes fatôres, vamos agora estudá-los mais detalhadamente.

O corpo de frutificação pode ser : **ressupinado**, ou **pileado**. Quando **pileado**, pode ser : **efuso-reflexo**, **séssil**, ou **estipitado**. É **efuso-reflexo**, quando, possuindo uma parte **ressupinada**, se projeta além do substrato, para formar o **píleo**. É **séssil**, quando, sem possuir parte alguma **ressupinada**, não possui também **estipe** ; neste caso, o **píleo** fixa-se lateralmente ao substrato. É **estipitado**, finalmente, quando possui **estipe**.

Quanto ao **estipe**, pode ser : **mesópodo**, se o **estipe** é central ; **pleurópodo**, se o **estipe** é lateral ; de **estipe** **excêntrico** ; e de **estipe** **dorsal**. Pode ainda ser, segundo o comprimento do **estipe**, **curto** e **longo-estipitado**.

Segundo a sua forma, pode ser : **dimidiado**, **flabeliforme**, **espatulado**, **petalóide**, ou **irregular**. Se **estipitado**, **reniforme** ou **circular**.

Quando visto de perfil, em corte transversal, pode ser : **aplanado**, **conchado**, **ungulado**, **imbricado**. Quando central ou **excêntricamente** **estipitado**, o **píleo** pode ser : **convexo**, **umbonado**, **deprimido**, **infundibuliforme**.

Resumindo em chave, podemos dizer que os **corpos de frutificação** podem ser :

segundo o modo de fixação	{ ressupinado efuso-reflexo séssil estipitado	segundo a forma	{ dimidiado flabeliforme espatulado reniforme circular irregular
segundo a posi- ção e tamanho do estipe	{ mesópodo pleurópodo de estipe excêntrico de estipe dorsal curto-estipitado longo-estipitado	segundo o perfil	{ se estipi- tado { convexo umbonado deprimido infundibuliforme se efuso- reflexo ou séssil { aplanado conchado ungulado imbricado

* * *

Vimos os vários nomes que toma um corpo de frutificação, quando tomado em seu todo. Agora vamos estudar cada uma de suas partes, e ver quais os nomes que recebem segundo os caraterísticos que apresentarem.

Num corpo de frutificação completo, deveremos estudar :

1. Estipe :

colocação : central, excêntrico, lateral, dorsal ;

formato : curto ou longo ; cilíndrico, cônico, sinuoso, ereto, **simples** ou ramificado ;

superfície : pilosa, glabra, lacada, lisa, escabrosa, estriada ;

dimensões :

2. Píleo :

superfície : pilosa, glabra, lacada, lisa, rimosa, sulcada; estriada, zonada.

Coloração ;

margem : aguda, subaguda, obtusa ; fértil ou estéril em baixo ;

dimensões ;

3. Contexto :

dimensões ; *coloração* ; *consistência* ; *zonação* ;

hifas do contexto : coloração, reação em KOH, dimensões, septação, espessura das paredes, ramificações ;

4. Tubos :

dimensões ; *coloração* ;

poros : coloração da superfície ; formato, dimensões e configuração dos bordos ;

dissepimento : coloração, dimensões, caraterísticos das hifas ;

5. Himênio :

Esta parte merece especial atenção, devido ao seu conteúdo. Além das basídias, que são as verdadeiras formadoras do himênio, notamos em muitos espécimes outros órgãos, estéreis, semelhantes às primeiras quanto ao formato, porém excedendo-lhes em tamanho. São as **cistídias**. Estas variam muito quanto à forma, e podem ser : *clavadas*, *globosas*, *cilíndricas*, *cilíndrico-ventricosas*, e *lanceoladas*. Em outros espécimes encontramos certos corpos salientes, pontudos, em geral fortemente coloridos, denegridos, semelhantes a pequenos espinhos. São as **setas**. Estas, quanto à forma, podem ser : *ventricosas*, *subuladas*, *direitas* ou *curvas*. Variam muito quanto à frequência, de espécie para espécie.

Outras vezes, encontramos filamentos que geralmente excedem de muito a altura das basídias. São as **paráfises**, que podem ser : *simples* ou *ramificadas*.

Em não poucos espécimes observamos uma interessante estrutura no himênio : um feixe de hifas muito delicadas, que, invadindo o himênio, ultrapassam a altura das basídias. São as **medas** (*hyphal pegs* dos americanos). Estas podem tomar formas variadas, de espécie para espécie, prevalecendo, todavia, a *cônica* e *cilíndrico-cônica*.

Chegamos, finalmente, a um dos mais importantes órgãos para ser estudado, o qual, aliás, é de absoluta importância para separar inúmeras espécies, e até mesmo gêneros : os **esporos**. Estes devem ser estudados segundo sua *coloração*, que pode variar desde a hialina, até ferrugíneo-escura. Segundo a *forma*, variam de cilíndricos até globosos, prevalecendo os tipos intermediários : ovóides, subglobosos, elipsóides e cilíndrico-elipsóides.

Resumindo tudo quanto dissemos a respeito do himênio, temos :

cistídias :

quanto à forma : clavadas, globosas, cilíndricas, cilíndrico-ventricosas, lanceoladas ;

quanto a incrustações : incrustadas, lisas.

setas :

quanto à forma : ventricosas, subuladas, direitas, curvas ;

medas :

quanto à forma : cônicas, cilíndrico-cônicas ;

esporos :

quanto à coloração : hialinos, coloridos ;

quanto à forma : globosos, subglobosos, ovóides, elipsóides, cilíndrico-elipsóides, cilíndricos, alantóides, reniformes ;

quanto à parede : de parede simples, dupla, espessa, imperceptível.

GÊNEROS

Observando as inúmeras espécies aqui contidas, salta-nos logo à vista a grande diferença de consistência entre os vários grupos de seus componentes. Por outro lado, notamos o modo como se fixam sobre o substrato. Alguns esparramam-se sobre ele, sem nunca formarem o píleo, i.é, são sempre ressupinados. Tais espécimes integram as inúmeras espécies do gênero *Poria*, de que temos exemplo em *Poria pulchella* (Schw.) Cooke (Est. XXI). Alguns espécimes de outros gêneros poderão apresentar-se ressupinados ; porém, será um caso esporádico em tal espécie, que habitualmente apresentará seus componentes na forma **efuso-reflexa**, **séssil** ou **estipitada**.

Se cortarmos um corpo de frutificação em seu sentido transversal, ou seja, no sentido longitudinal dos poros, vamos notar que os membros desta família dividem-se em dois grupos : **A)** aqueles em que os tubos formam uma camada bem distinta do contexto ; **B)** aqueles em que a trama dos tubos se confunde com a do contexto, e os tubos penetram neste a profundidades desiguais.

Examinando espécimes pertencentes ao grupo **A**, notamos que alguns têm várias camadas de tubos, enquanto outros apresentam uma única. Aqui também deparamos com um importante fator que separa outros gêneros ; Aquêles que apresentam várias camadas de tubos, são perenes, i.é, vivem muitos anos sobre o seu hospedeiro, sendo que cada ciclo vegetativo acrescenta-lhes mais uma camada de tubos. Pertencem a este grupo as poliporáceas chamadas **fomóideas**.

Por outro lado, os que apresentam uma só camada de tubos são anuais, i.é, o seu ciclo de vida se limita a um período vegetativo único, findado o qual ele morre. A este grupo pertencem as espécies chamadas **poliporóideas**.

Examinando, agora, espécimes pertencentes ao grupo **B**, notamos que todos têm uma só camada de tubos, e se diferenciam essencialmente pela conformação dos poros. A este grupo pertencem as poliporáceas chamadas **trametóideas**.

Vejamos cada grupo de per si :

Fomóideas : Dois gêneros são incluídos neste grupo : *Ganoderma* e *Fomes*. O primeiro caracteriza-se principalmente pelos seus esporos muito singulares, completamente diferentes dos de todos os outros espécimes dos demais gêneros. São esporos ovóides, cobertos por uma espessa camada gelatinosa, papilada a enrugada, camada essa que forma um ápice obtuso a subagudo na extremidade distal, o qual, na maioria das vezes, se apresenta truncado (Est. XXVI, fig. 50). É um esporo muito típico, que não se confunde com nenhum outro. Os espécimes pertencentes a este gênero apresentam-se, geralmente, cobertos por uma crosta lisa, lacada, brilhante, amarelada a avermelhada, algumas vezes castanho-vinosa, também muito característica. Como exemplo, temos o *Ganoderma* sp. (Est. X e XI). Essa crosta lacada, porém, pode faltar em fungos de várias espécies do gênero, sendo então substituída por outra, parda a acinzentada, sem brilho. Temos, como exemplo disso, o *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. (Est. VIII e IX).

Quanto ao gênero *Fomes*, compreende todas aquelas espécies fomóideas que não possuírem o característico esporo de *Ganoderma*. Como exemplo, para este gênero, temos : *Fomes rimosus* (Berk.) Cooke (Est. V, VI e VII).

Poliporóideas : Aqui vamos encontrar um grupo de espécies cujos componentes se apresentam ora estipitados, ora sésseis, ora efuso-reflexos ; todos, porém, possuindo poros circulares a angulares, relativamente pequenos. Pertencem a este grupo as numerosas espécies do gênero *Polyporus*. Temos, como exemplo, *Polyporus leonotis* Kalchb. (Est. XVII e XVIII), e *P. gilvus* (Schw.) Fries (Est. XIX e XX).

Trametóideas : Vários gêneros são incluídos aqui, e são separados uns dos outros pela constituição e conformação dos poros. Se estes são pequenos, arredondados ou angulares, temos o gênero *Trametes*, como, por exemplo, *Trametes caperata* Berk. (Est. XXII e XXIII). Se os poros são grandes, aproximadamente hexagonais, temos o gênero *Hexagona* : por exemplo, *Hexagona variegata* Berk. (Est. XII e XIII). Se, porém, esses hexágonos são muito alongados, algumas vezes aproximando-se mesmo de verdadeiros losangos, em espécimes sempre com estipe lateral, temos o gênero *Favolus* ; por exemplo, *Favolus brasiliensis* Fries. (Est. III e IV). Se, agora, os poros forem alongados, dedalóides, irregularmente distribuídos, o gênero será *Daedalea*, de que temos um bom exemplo em *Daedalea quercina* (L.) Fries (Est. I e II). Porém, nem sempre os poros parecem ser tal. Às vezes, as paredes laterais se rompem em sequência uniforme, fazendo com que os tubos coalesçam, formando verdadeiros sulcos que dão ao todo uma aparência de lamelas concêntricas. Esta feição singular de poros caracteriza as espécies do gênero *Cyclomyces*, do qual, infelizmente, não temos em mãos sequer um único espécime para ilustrar [o desenho dado na Est. XXV, fig. 17, foi adaptado de uma fotografia de Lloyd (6)]. Outras vezes, os poros são tão alongados no sentido radial, que dão a aparência de verdadeiras lamelas, como as de *Agaricaceæ*. Tais poros caracterizam o gênero *Lenzites*, de que temos um bom exemplo em *Lenzites repanda* (Mont.) Fries. (Est. XIV, XV e XVI).

Podemos resumir o que acabamos de dizer, na seguinte chave de classificação dos gêneros da família *Polyporaceae*.

- A. corpo de frutificação sempre ressupinado *Poria*
- B. corpo de frutificação efuso-reflexo, séssil ou estipitado..... 1
 - 1. tubos em camada distinta do contexto..... 2
 - 1. tubos não formando camada distinta do contexto, e usualmente penetrando a profundidades desiguais no mesmo (trametóideas) 3
 - 2. esporóforo carateristicamente perene, composto de várias camadas de tubos, formadas cada ano (fomóideas)..... 5
 - 2. esporóforo geralmente anual, não tipicamente perene (poliporóideas) *Polyporus*
 - 3. tubos coalescem lateralmente, formando verdadeiros sulcos que dão ao todo uma aparência de lamelas concêntricas ; píleo sempre estipitado *Cyclomyces*
 - 3. tubos não coalescem lateralmente..... 4
 - 4. poros circulares a angulares *Trametes*
 - 4. poros grandes, hexagonais *Hexagona*
 - 4. poros hexagonais muito alongados, tendendo a lozangulares ; píleos sempre pleurópodos *Favolus*
 - 4. poros alongados, dedalóides, irregulares *Daedalea*
 - 4. poros aproximando-se de verdadeiras lamelas radiais ... *Lanzites*
 - 5. esporo liso, de parede simples, hialino ou colorido *Fomes*
 - 5. esporo minutamente papilado a rugoso, de parede dupla, i. é, provido de episporo com ápice geralmente truncado .. *Ganoderma*

ESPÉCIES

Terminado o estudo geral sobre a classificação do gênero, passamos agora às espécies.

Para a determinação dos gêneros, lançamos mão de caracteres, em sua grande maioria, facilmente distinguíveis a olho nu. Agora, porém, para a classificação das espécies, temos que usar, além desses, outros caraterísticos somente visíveis com o auxílio de uma boa lupa, ou de um microscópio. Assim é que, para a distinção das espécies, dentro de cada gênero, temos que observar : 1) se o corpo de frutificação é ressupinado, efuso-reflexo, séssil ou estipitado ; 2) se estipitado, caraterísticos gerais do estipe ; 3) formato e dimensões do píleo ; 4) caraterísticos gerais da superfície ; 5) consistência do píleo ; 6) caraterísticos da margem ; 7) número de poros por milímetro linear ; 8) formato e dimensões dos poros ; 9) consistência e coloração do contexto ; 10) dimensões do contexto ; 11) caraterísticos gerais das hifas do contexto ; 12) coloração dos tubos quando em corte ;

13) profundidade dos tubos ; 14) caraterísticos do dissepimento ; 15) caraterísticos das cistídias ; 16) caraterísticos das setas ; 17) carat. das medas ; 18) carat. das paráfises ; 19) carat. das basídias ; 20) carat. dos esporos.

Como vemos, temos nada menos que 20 grupos de caracteres principais sôbre os quais são baseadas as diagnoses das espécies. Cada grupo dêstes, porém, pode ter um grande número de variações, como podemos ver pelo que descrevemos atrás. Assim sendo, dá margem verdadeiramente gigantesca para o número de espécies diferentes, considerando-se as combinações possíveis entre todos os fatores cuja soma é usada como diferenciação específica.

Temos agora todos os dados necessários para a classificação de qualquer espécie da família *Polyporaceæ*. Podemos, seguindo as normas aqui explanadas, descrever qualquer espécie, com tôda a minuciosidade, e empregando os termos certos, usuais. Depois de possuirmos a descrição detalhada, com ilustrações macro e microscópicas, o que nos restará a fazer, para dar o nome certo ao espécime em estudo, é percorrer a literatura sôbre o assunto, e encontrar a diagnose que se adapte à nossa descrição, **já que não possuímos, ainda, um eficiente herbário à mão, pelo qual poderíamos determinar, por simples comparação, o nosso material.**

EXEMPLOS DE DESCRIÇÃO

DAEDALEA QUERCINA (L.) Fries

(Est. I, II)

PÍLEO : (Est. I) sésil, tendendo ao ungulado ; raramente imbricado ; 3-8 x 3-12cm. por 2-5cm espêso.

superfície : castanho-clara a acinzentada, glabra a minutamente pubescente (em píleo: mais jovens) ; suave e concêntricamente sulcada, às vêzes um tanto escabrosa.

margem : obtusa ; estéril em baixo, ou estreitamente fértil apenas.

CONTEXTO : suberoso ; castanho-claro a amarelado, clareando para os poros ; zonado, 0,5-3cm espêso.

hifas do contexto : (Est. II, fig. a) ligeiramente coloridas ; suavemente sinuosas, pouco ramificadas, apresentando septos nas junções das ramificações ; de parede grossa e lúmen estreito a médio ; 2-5 μ de diâmetro.

TUBOS : (Est. I) de mesma côr que o contexto, 0,5-2cm longos.

poros : (Est. I) francamente dedalóides, às vêzes tendendo para lenzi-tóides ; 1mm de abertura, por 2-10mm longos, na média ; de bordos lisos a apenas ondulados, obtusos, espessos de 0,5-1,5mm.

dissepimento : formado por hifas semelhantes às do contexto.

HIMÊNIO : (Est. II)

cistídias e setas, inexistentes ;

basídias : não observadas ;

esporos : (Est. II, fig. b) hialinos, lisos, cilíndricos, 2-2,5 x 5-6 μ .

Observações : Descrição baseada nos materiais n.º 666, 1791 e 1863 do Herbário Micológico da Secção de Botânica, Inst. Agron. Campinas, Est. S. Paulo.

FAVOLUS BRASILIENSIS Fries

(Est. III, IV)

ESTIPE : (Est. III, fig. a) lateral a muito raramente excêntrico ; curto de 0-2cm, com 0,5-1cm de diâmetro.

PÍLEO : (Est. III) pleurópodo a muito estreita e raramente de estipe excêntrico ; coriáceo-flexível, flabeliforme a dimidiado, 2-15 x 3-20cm, por 2-6mm espêso.

superfície : glabra ; esbranquiçada a amarelada, tornando-se mais escura ao secar ; radialmente estriada em delicadas estrias.

margem : às vezes de côr escura, queimada ; aguda, fértil em baixo.

CONTEXTO : esbranquiçado, 0,5-2mm espêso.

hifas do contexto : (Est. IV, fig. a) levemente citrinas, ramificadas, não septadas, de parede grossa e lúmen estreito a médio ; tortuosas, variam de 2-5 μ de diâmetro.

TUBOS : mais escuros que a superfície, 1-4mm profundos.

poros : (Est. III, fig. b) longo-hexagonais, 3-10 x 1-2mm, de bordos serrilhados a lacerados, agudíssimos.

dissepimento : formado por hifas semelhantes às do contexto.

HIMÊNIO : (Est. IV)

cistídias e setas, inexistentes.

basídias : (Est. IV, fig. b) hialinas, clavadas, 6-7 x 16-20 μ .

esporos : (Est. IV, fig. c) hialinos, cilíndricos, multi-gutulados, 2,5-3,5 x 7-11 μ .

Observação : Descrição baseada nos materiais n.º 4406 e 4846, do Herb. Mic. da Secção de Botânica, I. A., Campinas, Est. S. Paulo.

FOMES RIMOSUS (Berk.) Cooke

(Est. V, VI, VII)

PÍLEO : (Est. V, VI) séssil, aplanado a ligeiramente ungulado, 6-15 x 14-25cm, por 2-8cm espêso; muito raro imbricado.

superfície : quando o píleo ainda é novo, ela é castanho-escura, pubescente ; ao ficar adulto, torna-se cinzento-denegrada, glabra, profunda e concêntricamente sulcada ; com a idade, vai ficando rimosa, ou seja, com a crosta tôda partida em pequeninas fendas ; tem os bordos mais claros.

margem : obtusa, pubescente, estéril, em baixo.

CONTEXTO : (Est. VI, fig. c) castanho-amarelado, zonado, lenhoso, espêso de 2-4cm, homogêneo para os bordos, irregular para a inserção

do píleo, podendo apresentar, nesse lugar, estrias negras, de substância duríssima.

hifas do contêxto : (Est. VII, fig. a) de dois tipos : a) não ramificadas, fuscas, lisas, de paredes não muito espessas e lúmen largo a médio; apresentam septos, sendo que as de menor diâmetro mostram maior frequência deles que as mais grossas; $3-7\mu$ de diâmetro. b) muito ramificadas, um tanto sinuosas, mais claras que as primeiras, de lúmen muito estreito; $1,5-3\mu$ de diâmetro, pouco abundantes. Quando montadas em KOH, essas hifas apresentam uma forte coloração ferrugínea; e, quando em ácido láctico, apresentam-se amarelo-citrinas.

TUBOS : (Est. VI, fig. c; VII, fig. b) castanho-amarelados, indistintamente estratificados, sendo que as camadas variam de 2-6mm de espessura; o interior apresenta-se de coloração amarelo-enzofre.

poros : castanho-amarelados, circulares a ligeiramente alongados, 4-5 por mm, $130-200\mu$ de diâmetro, de bordos inteiros.

dissepimento : (Est. VII, fig. b, c) de espessura irregular, de $30-150\mu$; hifas semelhantes às do contexto, de $1,5-2,5\mu$ de diâmetro.

HIMÊNIO : (Est. VII)

cistídias e setas, inexistentes;

basídias : hialinas, clavadas, $3,5 \times 7\mu$.

esporos : (Est. VII, fig. d) amarelados, subglobosos, apresentando um lado achatado; parede espessa, fusca; lisos, 1-gutulados, $3,5-4 \times 4,5-5\mu$.

Observações : Descrição baseada nos materiais n.º 4365 e 4387, do Herb. Mic. da Secção de Botânica, I. A., Campinas, Est. S. Paulo.

GANODERMA APPLANATUM (Pers.) Pat. (Est. VIII, IX)

PÍLEO : (Est. VIII) séssil, aplanado, lenhoso, dimidiado, perene, 8-15 x 10-20cm, no geral 1-2,5 cm espesso, algumas vezes alcançando até 5-6cm de espessura, quando com muitas camadas de tubos.

superfície : (Est. VIII, fig. a) glabra, castanho-clara a acinzentada suave e concêntricamente sulcada em sulcos apenas perceptíveis, delicada e concêntricamente zonada de castanho-claro; coberta por crosta córnea, dificilmente perfurável à unha, de coloração parda a acinzentada, fosca.

margem : (Est. VIII, fig. b) de mesma cor que a superfície, inteira, lisa a levemente sinuosa. obtusa, estéril em baixo.

CONTEXTO : (Est. VIII, fig. d) castanho-escuro, amarelecido junto à crosta da superfície, corticoso-rijo, azonado, 1-3mm espesso na parte aplanada do píleo, e de espessura variável junto à inserção.

hifas do contexto : (Est. IX, fig. a) castanho-amareladas, pouco ramificadas, de paredes espessas e estreito lúmen, levemente

sinuosas, variando, em média, de 2-5 μ de diâmetro. Não sofrem reação quando montadas em KOH.

TUBOS : (Est. VIII, fig. c) nitidamente estratificados, em píleos de vários anos ; mais claros que o contexto, esbranquiçados no interior, até 8mm longos.

poros : (Est. IX, fig. b) cinzento-amarelados a castanho-claros, circulares, 100-160 μ de diâmetro, 4-5 por mm, de bordos lisos, inteiros.

dissepimento : (Est. IX, fig. c) de espessura mais ou menos uniforme, de 40-60 μ ; formado por hifas semelhantes às do contexto, de 1,5-2 μ de diâmetro.

HIMÊNIO : (Est. IX) contém hifas hialinas, simples ou ramificadas, que se emaranham pelo dissepimento e se estendem, às vezes, além das basídias, penetrando no lúmen dos tubos, e que têm, em média, 1 μ de diâmetro (Est. IX, fig. e).

cistídias : (Est. IX, fig. d) hialinas, ventricosas, possuindo, às vezes, a extremidade afilada e alongada de até 20 μ ; 5-10 x 10-40 μ ; a extremidade afilada é de 1,5-2 μ de diâmetro.

setas : não existentes.

basídias : não observadas.

esporos : (Est. IX, fig. f) ferruginoso-claros, típicos de *Ganoderma* ;
episporo nulo, apresentando apenas o ápice truncado, hialino ;
endosporo de parede espessa, fusca, 4-5 x 6-8 μ , 1-gutulado.

Observações : Descrição baseada no material n.º 1130 do Herb. Mic. da Secção de Botânica, I. A., Campinas, Est. S. Paulo.

GANODERMA sp. (*laccatum* Kalchb.?) (Est. X, XI)

PÍLEO : (Est. X) sésil, aplanado, leve, dimidiado, pouco e raramente imbricado, 10 x 12 x 1-2cm.

superfície : (Est. X, fig. a) coberta por uma laca brilhante, castanho-ferrugínea-escura para o centro, tornando-se mais clara até amarelada nos bordos ; concêntricamente sulcada por muitos e rasos sulcos (4-5 por cm). O verniz é muito delgado e frágil, sendo facilmente perfurável à unha.

margem : (Est. X, fig. b) obtusa, inteira, estéril em baixo ; amarelada, às vezes tornando-se até creme.

CONTEXTO : castanho-escuro, chocolate, mais claro junto à crosta da superfície, sendo desta separado por uma finíssima camada amarelo-ferrugínea ; mais escuro junto aos tubos, de consistência frouxa, corticosa.

hifas do contexto : (Est. XI, fig. a) castanho-ferrugíneas, não reagem em KOH ; de paredes espessas e lúmen estreito a médio ; pouco ramificadas, 5-7 μ de diâmetro.

TUBOS : castanho-escuros, pouco mais claros que o contexto, às vezes esbranquiçados dentro, 5-10mm longos, não estratificados.

poros : (Est. X, fig. c ; XI, fig. b) circulares a alongados, a princípio esbranquiçados, tornando-se castanho-escuros mais tarde ; 4-5 por mm, 120-200 μ de diâm., de bordos inteiros.

dissepimento : (Est. XI, fig. c) de espessura um tanto irregular, variando de 50 a 250 μ ; formado por hifas semelhantes às do contexto, porém mais estreitas.

HIMÊNIO : (Est. XI)

cistídias e setas, inexistentes.

basídias : não observadas.

esporos : (Est. XI, fig. d) típicos do gênero. O **episporo**, hialino, é pontuado, geralmente truncado no ápice, e varia em espessura, de 0,5 a 1 μ , sendo que pode atingir até 2 μ na parte truncada ; e, se o ápice não foi truncado, pode atingir até 4 μ nesse ponto. O **endosporo** possui parede espessa, fusca ; é elíptico-ovóide, 1-gutulado, e mede 4,5-5,5 x 8-9 μ .

Observações : Diagnose baseada no material n.º 22842 do Herb. do Inst. Bot. de São Paulo, Est. S. Paulo.

HEXAGONA VARIEGATA Berkeley (Est. XII, XIII)

PÍLEO : (Est. XII) subcoriáceo, efuso-reflexo, parte reflexa no geral aplanaada ; 1-5 x 1,5-8cm, por 1-4mm de espessura.

superfície : velutina, concêntricamente zonada em várias côres, predominando as zonas em côr violeta-denegrada ; radialmente enrugada em rugas abundantes e muito delicadas.

margem : castanho-clara, estéril em baixo.

CONTEXTO : variando de 0-4mm, zonado em estreitas zonas, castanho-claro.

hifas do contexto : (Est. XIII, fig. a) castanho-amareladas, de parede estreita e largo lúmen, um tanto sinuosas, não ramificadas, variando de 3-6 μ de diâmetro.

TUBOS : castanho-claros, 0-1,5mm longos.

poros : (Est. XII, fig. c ; XIII, fig. b) castanho-claros, circulares a nitidamente hexagonais, 500-750 μ de diâmetro ; de bordos lisos, inteiros.

dissepimento : (Est. XIII, fig. c) 100-400 μ espesso, formado por hifas semelhantes às do contexto, de 3-4 μ de diâmetro.

HIMÊNIO :

cistídias e setas, não existentes.

paráfises : (Est. XIII, fig. d) hialinas, raras, não se prolongam além das basídias, 2-3 μ de diâmetro.

basídias : (Est. XIII, fig. e) hialinas, abundantíssimas, possuindo 4 esterigmas 7-10 μ longos. Apresentam inúmeras gotas de substância oleosa, que variam de 1-2 μ de diâmetro. Medem, na média, 35 μ de comprimento e 8-11 μ de diâmetro.

medas : (Est. XIII, fig. f) cônicas, não muito abundantes, projetando-se de 100-150 μ além das basídias.

esporos : (Est. XIII, fig. g) hialinos, cilíndrico-elipsóides, multi-gutulados quando jovens, 1-gutulados quando já maduros, 12-15 x 4,5-5,5 μ .

Observações : Descrição feita a partir do material 4388 do Herb. Mic. Secç. Bot. I. A., Campinas, Est. S. Paulo.

LENZITES REPANDA (Mont.) Fries (Est. XIV, XV, XVI)

ESTIPE : (Est. XIV, fig. a ; XV, fig. a) lateral, isabelino, glabro, curtíssimo, 1-6mm longo ; a base esparrama-se sobre o substrato, formando um círculo mais ou menos regular, de 2-4cm de diâmetro. Às vezes, parece ser central ou excêntrico ; isso acontece quando há anastomose das extremidades do píleo, as quais se encontram circundando o estipe ; essa anastomose nem sempre é perfeita, sobrando um vão (Est. XV).

PÍLEO : (Est. XIV, XV) suberoso-coriáceo, curtíssimo-estipitado, reniforme ; 5-10 x 8-15cm, por 1-4mm espesso.

superfície : (Est. XIV, fig. b ; XV, fig. b) glabra, isabelina, às vezes apresentando-se um tanto tuberculosa, outras vezes suave e radialmente ondulada ; concêntricamente zonada em suavíssimas zonas mais visíveis para a margem.

margem : (Est. XIV, fig. c ; XV, fig. c) aguda a semi-aguda, fértil em baixo, ou estreitamente estéril, de bordos sinuosos.

CONTEXTO : branco, quando sêco, amarelado, quando umedecido ; corticoso-frouxo ; zonado em zonas concêntricas, 2 por cm, apenas e fracamente perceptíveis quando umedecemos o material, ou em espécimes frescos ; 0,5-2mm espesso.

hifas do contexto : (Est. XVI, fig. a) ligeiramente citrinas, não sofrem reação em KOH ; de paredes grossas e estreitíssimo lúmen. São de duas qualidades : a) lisas, muito longas, sem ramificações nem septos, variam de 4-6 μ de diâmetro ; b) onduladas a muito sinuosas, muito ramificadas, sem septos, variam de 1,5-3 μ de diâmetro.

TUBOS : (Est. XIV, fig. d ; XV, fig. d) uniformemente lamelares, da margem do píleo até o estipe ; 0,5-2mm profundos, pouco mais escuros que a superfície do píleo.

poros : longos de 1-15-20mm, de bordos suavemente dentados a serrilhados.

dissepimento : (Est. XVI, fig. b) espesso de 40-200 μ ; formado por hifas semelhantes às do contexto, prevalecendo as do tipo b, i.é, mais finas e muito ramificadas.

HIMÊNIO : (Est. XVI) contém hifas hialinas, lisas a tortuosas, ramificadas, providas de ganchos de ligação, e que variam de 1-2,5 μ de diâmetro (fig. c).

cistídias e setas, não existentes.

basídias : (Est. XVI, fig. d) hialinas, clavuladas, 4 x 18 μ .

esporos : (Est. XVI, fig. e) hialinos, cilíndrico-ovóides, 2,5-6 μ .

Observações : Descrição feita baseada no material n.º 4506 do Herb. Mic. Secção Bot. I. A., Campinas, Est. S. Paulo.

POLYPORUS LEONOTIS Kalchb. (Est. XVII, XVIII)

PÍLEO : (Est. XVII) sésil, raro efuso-reflexo, dimidiado, aplanado-conchoíde, leve, 4-6 x 7-10cm, espesso de 3-6mm.

superfície : (Est. XVII, fig. a) densamente coberta por pêlos castanho-amarelados, algumas vezes denegridos, longos de 5-10mm, emaranhados e deitados para a margem, tendo um grande sulco concêntrico, a 1-1,5cm dos bordos.

margem : (Est. XVII, fig. b) castanho-avermelhada, obtusa a aguda, estreitamente estéril em baixo ; de bordos lisos a ásperos, às vezes denegridos, ondulados.

CONTEXTO : geralmente exíguo ; fibroso, corticoso, castanho bem claro, 0,5-2mm espesso.

hifas do contexto : (Est. XVIII, fig. a) amarelo-citrinas quando montadas em ácido láctico, reagem pouco em KOH, tornando-se pouco mais escuras. De dois tipos : a) muito sinuosas e ramificadas, de estreitíssimo lúmen, 1,5-3 μ de diâmetro ; b) lisas, não ramificadas, de paredes grossas e lúmen estreito a médio, 4-6 μ de diâmetro.

TUBOS : (Est. XVII, fig. c, d) pouco mais escuros que o contexto, às vezes esbranquiçados no interior, até 5mm longos.

poros : (Est. XVII, fig. d ; XVIII, fig. b) de superfície às vezes amarela, geralmente de mesma cor que os tubos ; circulares, 5-6 por mm ; quando em corte, 150-200 μ de diâmetro ; de bordos inteiros.

dissepimento : (Est. XVIII, fig. c) de espessura regular, 40-70 μ , formado por hifas amarelo-citrinas, lisas, de lúmen estreito e paredes grossas, 2-3 μ de diâmetro.

HIMÊNIO : (Est. XVIII)

cistídias : (fig. d) hialinas, ventricosas, raras, 5 x 20-25 μ .

basídias : (fig. e) hialinas, clavadas, 5 x 10-12 μ .

medas : (fig. f) poucas, cônicas, 17-22 μ longas, por 20-30 μ de base.

esporos : (fig. g) hialinos, lisos, cilíndricos, 2-3 x 6,5-8,5 μ .

Observações : Descrição feita baseada no material n.º 2100 do Herb. Mic. Secção Bot. I. A., Campinas, Est. S. Paulo.

POLYPORUS GILVUS (Schw.) Fries (Est. XIX, XX)

PÍLEO : (Est. XIX) sésil a efuso-reflexo ; dimidiado a irregular, aplanado, algumas vezes imbricado, 1-8 x 2-12 x 0,2-2cm.

superfície : castanho-ferrugínea, glabra, concêntrica e levemente sulcada, um tanto rugosa, às vezes minutamente tuberculosa.

margem : obtusa a aguda, sinuosa, geralmente de um tom mais amarelado que a superfície ; minutamente pubescente, estéril em baixo.

CONTEXTO : castanho-amarelado, corticoso, 1-10mm espesso.

hifas do contexto : (Est. XX, fig. a) amarelo-citrinas, reagem em KOH, tornando-se ferrugíneas ; não ramificadas, de paredes não muito espessas, com largo lúmen ; apresentam septos, mas não em grande abundância ; as mais estreitas são mais sinuosas ; 3-5 μ de diâmetro.

TUBOS : (Est. XX, fig. b, c) de mesma cor que o contexto, raramente estratificados, de 1-10 mm longos.

poros : circulares a ligeiramente alongados, de bordos algumas vezes dentados ; 6-8 por mm, 90-120 μ de diâmetro.

dissepimento : (Est. XX, fig. b, d) de espessura irregular variando de 10 a 100 μ , formado de hifas semelhantes às do contexto, apenas mais delgadas, de 2-3 μ de diâmetro.

HIMÊNIO : (Est. XX)

setas : (fig. e) abundantíssimas, subuladas a lanceoladas, denegridas, 5-8 x 20-25 μ .

cistídias : (fig. f) ventricosas, 5-8 μ de diâmetro na parte bojuda, e projetando-se até 15-20 μ dentro do lúmen dos tubos ; algumas apresentam prolongamentos filiformes de até 20-30 μ longos.

paráfises : (fig. g) cilíndrico-filiformes, não ramificadas, algumas vezes apresentando-se incrustadas em seu comprimento com cristais irregulares que variam de 1-1,5 μ de diâmetro ; 2-3 x 20-40 μ .

esporos : (fig. h) hialinos, lisos, cilíndrico-elipsóides, 1-gutulados, medindo, na média, 2,5-4,5 μ .

Observações : Descrição baseada no material n.º 1112 do Herb. Mic. Secção Bot. I. A., Campinas, Est. S. Paulo.

PORIA PULCHELLA (Schw.) Cooke (Est. XXI)

HIMENÓFORO : irregularmente esparramado sobre o substrato ; com uma ou mais camadas de tubos.

margem : com limites bem definidos, onde se nota uma delicada pubescência ; fértil a estreitamente estéril.

CONTEXTO : insignificante, praticamente nulo ; apenas uma fina camada de hifas citrinas (Est. XXI, fig. a), muito ramificadas, de duas quali-

dades : a) sem septos, de parede grossa e estreito lúmen (fig. 1) ; b) septadas, de parede estreita e largo lúmen (fig. 2). Ambas variam de 1,5-3 μ de diâmetro.

TUBOS : amarelados, 1-1,5mm longos.

poros : (Est. XXI, fig. b) amarelados, de superfície um tanto enrugada, muito irregular, seguindo a "topografia" do substrato ; circular a alongada, 5-6 por mm, 150-200 μ de diâmetro.

dissepimento : (Est. XXI, fig. c) de espessura mais ou menos uniforme, variando de 40-120 μ ; formado por hifas semelhantes às do contexto, prevalecendo as de menor diâmetro.

HIMÊNIO : (Est. XXI)

cistídias e setas, não existentes.

medas : (fig. d) poucas, cilíndricas, 12-20 μ de diâmetro, ultrapassando as basídias em 10-15 μ .

basídias : (fig. e) subglobosas, hialinas, 6-8 μ de diâmetro por 10-12 μ longas.

esporos : (fig. f) muito ligeiramente citrinos, multi-gutulados, cilíndrico-elipsóides, 3-4 x 5-6 μ .

Observações : Descrição baseada no Material n.º 4868 do Herb. Mic. da Secção de Botânica, I. A., Campinas, Est. S. Paulo.

TRAMETES CAPERATA Berkeley (Est. XXII, XXIII)

PÍLEO : (Est. XXII) efuso-reflexo, raro sésil, dimidiado ; parte reflexa 2-4 x 3-5cm, por 2-4mm espessa.

superfície : (Est. XXII, fig. a) tomentosa, com pêlos castanho-escuros a amarelados ; concêntricamente sulcada, com 1-2 sulcos por cm ; nos sulcos, e em zonas glabras, concêntricas, percebe-se uma superfície castanho-vinosa, radial e minutamente estriada, muito característica.

margem : (Est. XXII, fig. b) inteira ; quando em píleos anastomosados, apresenta-se lobada ; de bordos geralmente glabros, às vezes velutinos, lisos a minutamente franzidos ; subaguda a aguda, estéril em baixo.

CONTEXTO : (Est. XXIII, fig. c) castanho-claro, homogêneo, 1-2mm espesso ; muitas vezes nulo.

hifas do contexto : (Est. XXIII, fig. a) castanhas, não reagem em KOH ; lisas a suavemente sinuosas, variam de 2-4 μ de diâmetro ; de parede estreita e largo lúmen, não apresentam nem septos nem ramificações (apenas as de 2 μ de diâm. são pouco ramificadas).

TUBOS : (Est. XXIII, fig. b) amarelados, mais claros que o contexto, 0,5-1,5mm longos.

poros : (Est. XXII, fig. c ; XXIII, fig. b) de superfície castanho-amarelada bem clara, sendo mesmo esbranquiçada em espécimes.

em pleno desenvolvimento ; circulares a angulares, 3-4 por mm, de bordos lisos.

dissepimento : (Est. XXIII, fig. c) de espessura homogênea, variando de 70 a 120 μ ; formado por hifas semelhantes às do contexto, porém mais finas, de 2-3 μ de diâmetro.

HIMÊNIO : (Est. XXIII)

cistídias e setas, inexistentes

basídias : (fig. d) hialinas, clavadas, 3,5-10 μ .

medas : (fig. e) abundantíssimas, cilíndrico-cônicas, projetando-se além das basídias de 30-40 μ .

esporos : (fig. f) hialinos, lisos, cilíndricos ; 2 x 6 μ , na média.

Observações : Diagnose baseada no material n.º 862 do Herb. Mic. da Secção de Botânica, I. A., Campinas, Est. S. Paulo.

* * *

G L O S S Á R I O

(Est. XXIV, XXV, XXVI)

BASÍDIAS : são estruturas sexuais sôbre as quais são produzidos os esporos dos basidiomicetos. Quando septadas ou profundamente sulcadas, são chamadas **heterobasídias**, e caracterizam os *Heterobasidiomicetos* (fig. 33 a 37). Quando não septadas, e tipicamente clavadas (fig. 38 a 40), são chamadas **homobasídias**, e caracterizam os *Homobasidiomicetos*. Como as poliporáceas pertencem a este último grupo, vejamos quais as formas em que podem apresentar-se as **homobasídias** :

clavadas — fig. 38

subglobosas — fig. 39

subcilíndricas — fig. 40

BASIDIOSPOROS : assim são chamados os esporos produzidos por basídias. Podem ser septados ou não, ao germinar. Nas poliporáceas, porém, nunca se tornam septados. Quanto aos característicos gerais, os esporos das poliporáceas podem ser :

lisos — fig. 43 a 49

tuberculados — fig. 41

espinulados — fig. 42

de parede espessa — fig. 43

de parede imperceptível — fig. 45

hialinos — sem pigmentação — fig. 45 a 49

coloridos — com pigmentação — fig. 43 e 44

globosos — fig. 42

subglobosos — fig. 43

ovóides — fig. 44

elipsóides — fig. 46

cilíndrico-elipsóides — fig. 45

cilíndricos — fig. 47

alantóides — fig. 48

reniformes — fig. 49

de Ganoderma — fig. 50

CISTÍDIAS : órgãos semelhantes às basídias, porém estéreis, e mais avantajados que estas. Nas poliporáceas localizam-se sempre no himênio, ao passo que em outros

himenomicetos podem localizar-se fora d'ele. As cistídias das poliporáceas podem ser :

cilíndricas — fig. 51

cilíndrico-ventricosas — fig. 52

clavadas — fig. 53

glôbosas — fig. 54

lanteoladas — fig. 56

capitadas — fig. 55

lisas — fig. 51, 52, 53, 54 e 56.

CONTEXTO : dá-se este nome à trama de hifas que constitui o corpo de frutificação dos himenomicetos ; excetuam-se aqui a camada himenial e a crosta glabra ou pilosa da superfície. A parte do contexto que forma a parede dos tubos chama-se **dissepimento**.

quanto à consistência :

frouxa — quando cede facilmente à pressão de nossos dedos.

carnoso-mole — quando se assemelha àquela das agaricáceas em geral, i.é, quando é aquosa, facilmente esmagável à mão.

coriácea — flexível, semelhante a couro.

suberosa — semelhante a cortiça

lenhosa — semelhante a madeira

quanto à coloração : variando grandemente quanto à cor, o contexto pode ser : *branco* ; *esbranquiçado* ; *rosado* ; *castanho-claro* ; *castanho-escuro* ; *ferrugíneo* ; *homogêneo*, i.é, quando a coloração é de tonalidade uniforme ; *zonado*, i.é, quando há zonas, verdadeiras camadas, geralmente concêntricas, de tonalidades diferentes.

quanto às hifas : as hifas que constituem a trama do contexto variam muito quanto à forma, coloração, ramificação, septação, etc., e podem ser :

hialinas — fig. 57, 63 e 64

coloridas — fig. 58, 59, 60, 61 e 62

de paredes grossas — fig. 61

de paredes finas — fig. 60 e 62

pouco ramificadas — fig. 59 e 62

muito ramificadas — fig. 63

não septadas — fig. 60

septadas — fig. 62

ganchos de ligação presentes — fig. 64

CORPO-DE-FRUTIFICAÇÃO : é o esporóforo dos himenomicetos. Nas poliporáceas pode ser :

ressupinado — quando cresce esparramado sobre o substrato — fig. 12

efuso-reflexo — quando, tendo parte ressupinada, levanta-se do substrato para formar o píleo — fig. 13

séssil — quando se prende lateralmente ao substrato, sem que qualquer de suas partes se mostre ressupinada — fig. 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19 e 20

estipitado — quando o píleo se prende ao substrato por meio de um estipe ou "cabo" — fig. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17 e 22

DISSEPIMENTO : dá-se este nome àquela trama de hifas que liga intimamente um tubo ao outro, nas poliporáceas. É a própria parede dos tubos — fig. 21 a, 23 a, 24 a.

ESPORÓFORO : dá-se este nome à estrutura, de qualquer fungo, produtora dos esporos sexuais. Nos himenomicetos é também chamado **corpo-de-frutificação**.

ESTERIGMAS : são os finos prolongamentos que, partindo das basídias, produzem os esporos na extremidade, sustentando-os ali até sua maturação. As basídias das poliporáceas possuem quatro esterigmas — fig. 38 a, 39 a, 40 a.

ESTIPE :**quanto à colocação :**

- central* — fig. 1 b, 3 b, 9 b, 17 a.
- dorsal* — fig. 2 b.
- excêntrico* — fig. 5 b.
- lateral* — fig. 4 a, 22 a.

quanto ao formato :

- curto* — fig. 4 a, 5 a, 22 a.
- longo* — fig. 1 b, 2 b, 3 b, 9 a, 17 a.
- cilíndrico* — fig. 1 b, 3 b.
- cônico* — fig. 9 a.
- obcônico* — fig. 5 a, 17 a.
- direito* — fig. 1 b, 3 b.
- sinuoso* — fig. 2 b.
- simples* — fig. (tôdas, com exceção da 2 b)
- ramificado* — fig. 2 b.

quanto à superfície :

- pilosa* — quando coberta por pêlos, fig. 5 a.
- glabra* — sem pêlos
- escabrosa* — grosseiramente áspera, fig. 2 a.
- estriada* — com delicadas estrias longitudinais.
- lacada* — quando possui uma camada como que de verniz, pouco ou muito brilhante.
- lisa* — sem qualquer acidente.

GANCHOS-DE-LIGAÇÃO : em determinadas hifas dos basidiomicetos notam-se pequenas protuberâncias, semicirculares, ôcas, lateralmente ligadas às paredes de duas células adjacentes, e localizadas exatamente sobre os septos que separam tais células. Estas protuberâncias, resultantes da união sexual entre aquelas células vegetativas, são os **ganchos-de-ligação**, também chamados **alças** pelos autores portugueses, e **clamp-connections** em inglês. Ver fig. 64.

HETEROBASÍDIAS : ver **basídias**.

HIMÊNIO : as basídias podem crescer desordenadamente, como nos *Hemibasidiomicetos*, ou podem crescer agregadas, lado a lado, tôdas aproximadamente a uma só altura, formando uma camada contínua, uniforme ; a essa camada de basídias dá-se o nome de **himênio**. É o que acontece com os *Himenomicetos* e *Gasteromicetos*.

HIMENÓFORO : corresponde a **esporóforo** e a **corpo-de-frutificação**, nos himenomicetos.

HOMOBASÍDIAS : ver **basídias**.

LÚMEN : nome dado à cavidade, espaço vazio, dos tubos, hifas, etc. — fig. 60 a, 62 b.

MEDAS : são grandes feixes de delicadas hifas que atravessam o himênio e se projetam no lúmen dos tubos. São encontradas nos himenomicetos e, com mais frequência, nas poliporáceas. Variam quanto à forma, e podem ser :

- cilíndrico-globosas* — fig. 30
- cilíndrico-cônicas* — fig. 31 a
- cônicas* — fig. 31 b

PARÁFISES : dá-se este nome a hifas estéreis que, no himênio das poliporáceas, muitas vezes aparecem igualando as basídias em altura, outras vezes as ultrapassando de muito. Podem ser :

- simples* — fig. 32 a, b, d.
- ramificadas* — fig. 32 c.
- clavadas* — fig. 32 b.
- cilíndricas* — fig. 32 d.
- filiformes* — fig. 32 a.

PÍLEO : é a parte não ressupinada do corpo de frutificação dos himenomicetos, que apresenta a camada himenial, ou os poros (no caso das poliporáceas).

quanto ao estipe :

curto-estipitado — fig. 4, 5, 22.

longo-estipitado — fig. 1, 2, 3, 9, 17.

mesópodo — com estipe central — fig. 1, 3, 9, 17.

pleurópodo — com estipe lateral — fig. 4, 22.

de estipe excêntrico — fig. 5.

de estipe dorsal — fig. 2.

quanto à margem : a margem do píleo varia muito, e pode ser :

aguda — fig. 1 d.

subaguda — fig. 5 c.

obtusa — fig. 3 d.

lisa — fig. 1 d.

ondulada — fig. 9 b, 18 b.

lobada — fig. 5 c.

inteira — fig. 1 d.

fendida — fig. 5 c.

fértil em baixo — quando há poros até junto aos bordos.

estéril em baixo — quando há uma estreita faixa, junto aos bordos, sem poros.

quanto à forma : visto do alto, o píleo apresenta as mais variadas formas, e se classifica em :

dimidiado — fig. 8

flabeliforme — fig. 7

petalóide — fig. 6

espatulado — fig. 4

reniforme — fig. 2

circular — fig. 1, 3, 9, 17

irregular — fig. 5

quanto ao perfil :

convexo — fig. 17

deprimido — fig. 3

umbonado — fig. 9

infundibuliforme — fig. 1, 5

aplanado — fig. 10, 16

conchado — fig. 14

ungulado — fig. 11

imbricado — fig. 15

quanto à superfície : os caraterísticos apresentados pela superfície do píleo muito auxiliam na classificação e distinção das espécies. Segundo o seu aspecto geral, a superfície pode ser :

glabra — sem pêlos

estrigosa — com pêlos longos, mas muito ralos, podendo-se avistar a superfície glabra em baixo.

flocosa — quando os pêlos se apresentam agrupados em feixes.

hirsuta — com pêlos duros, ásperos ao tato.

puberulenta — com pêlos muito curtos, mas ainda visíveis a olho nu.

pubescente — com pêlos só visíveis com o auxílio de uma lupa.

tomentosa — com pêlos longos e emaranhados.

velutina — semelhante a veludo.

lacada — coberta como que por uma camada de verniz.

rimosa — toda fendilhada em pequenas fendas irregulares.

sulcada — com profundas depressões concêntricas.

zonada — com faixas concêntricas diferenciadas na cor.

estriada — com delicadas nervuras geralmente radiais.

escabrosa — muito grosseiramente áspera.

lisa — sem qualquer acidente.

POROS : dá-se este nome às bocas dos tubos.

quanto ao formato :

- circulares* — fig. 20, 23
- alongados* — fig. 24
- hexagonais* — fig. 21
- longo-hexagonais* — fig. 22
- dedalóides* — fig. 19
- concêntricamente lamelares* — fig. 17
- radialmente lamelares* — fig. 18

quanto aos bordos : os bordos dos poros variam muito quanto à sua constituição, e podem ser :

- lisos* — fig. 25
- dentados a serrilhados* — fig. 26
- fimbriados* — fig. 27
- lacerados* — fig. 28

SETAS : como as cistídias, são órgãos estéreis que aparecem no himênio. Geralmente são profundamente coloridas, denegridas. No geral, são pontudas, semelhantes a pequenos espinhos. Podem ser :

- ventricosas* — fig. 29 a.
- subuladas* — fig. 29 b.
- direitas* — fig. 29 a, b.
- curvas* — fig. 29 c.

SUBSTRATO : é a matéria sobre a qual vive o fungo. No caso das poliporáceas, geralmente se trata de madeira.

TRAMA : dá-se este nome ao entretecido de hifas que formam o corpo de frutificação. Assim é que dizemos : **trama do contexto**, **trama do dissepimento**, etc.

TUBOS : são as perfurações encontradas no corpo de frutificação das poliporáceas, boletáceas, fistulináceas e meruliáceas, na parede das quais cresce o himênio. As bocas dos tubos recebem o nome de **poros**.

* * *

PRINCIPAL LITERATURA CONSULTADA

1. Ainsworth, G. C. e G. R. Bisby. *Em A Dictionary of the Fungi*, pgs. 1-339. fig. 1-138. The Imperial Mycological Institute, Kew, Surrey, 1943.
2. Bessey, E. A. *Em A Text-Book of Mycology*, pgs. 1-495. ilustrado. P. Blakiston's Son & Co., Inc. Philadelphia, 1935.
3. Bourdot, H. e A. Galzin. *Em Hyménomycètes de France*, pgs. 1-761. Sceaux, 1927.
4. Gaeumann, E. A. e C. W. Dodge *Em Comparative morphology of fungi*, pgs. 1-701. 1.ª edição, ilustrada, McGraw-Hill Book Company, Inc. N. Y., 1928.
5. Killermann, S. Reihe Hymenomycetaceae. *Em Engler, A. e K. Prantl. Natuerlichen Pflanzenfamilien* 6 : 99-283. Leipzig, 1928.
6. Lloyd, C. G. *Em Mycological Notes* 1 : a 7 : pgs. 1-1348, fig. 1-3266. Cincinnati, Ohio, U.S.A., 1898-1922.
7. Lowe, J. L. The Polyporaceae of New York State (Pileate Species). *Tech. Bul. of the N. Y. Sta. College of Forestry at Syrac. Univ.* 41 : 1-142. ill. 1934.
8. Moeller, A. *Em Protobasidiomyceten, untersuchungen aus Brasilien*. I-XI + 1-179. taf. 1-6. Jena, 1895.
9. Overholts, L. O. Comparative studies in the Polyporaceae. *Sep. Annals Mo. Bot. Garden* 2 : 667-730. ill. 1915.

10. **Overholts, L. O.** Research Methods in the Taxonomy of the Hymenomycetes. Sep. Proceedings of the International Congress of Plant Sciences 2 : 1688-1712, ill., 1929.
11. **Overholts, L. O.** The Polyporaceae of Pennsylvania I. (The genus Polyporus). Tech. Bul. The Penn. Sta. College 298 : 1-28. pl. 1-2. 1933.
12. **Overholts, L. O.** The Polyporaceae of Pennsylvania II. (The genera Cyclomyces, Daedalea, Favolus, Fomes, Lenzites and Trametes). Tech. Bul. The Penn. Sta. College 316 : 1-16. pl. 1-2. 1935.
13. **Viégas, A. P.** Técnica de cortes à mão livre. Bragantia 3 : 193-198. est. 1., Instituto Agronômico, Campinas, 1943.
14. **Wettstein, Dr. Richard.** *Em Handbuch der Systematischen Botanik*, pgs. 1-1149, ilustrado, Franz Deuticke, Leipzig, 1935.

Est. I

Daedalea ouercina (L.) Fries.

a. R. Teixeira & J. C. Mendes, del
Daedalea quercina (L.) Fries.

Est. III

Favolus brasiliensis Fries.

Est. IV

A.R. Teixeira & J.C. Mendes, del.

Favolus brasiliensis Fries.

Est. V

Fomes rimosus (Berk.) Cooke

Fomes rimosus (Berk.) Cooke

Est. VII

A.R. Teixeira e J.C. Mendes, del.

Fomes rimosus (Berk.) Cooke

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

Est. IX

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

Ganoderma sp. (*laccatum* Kalchb.?)

Est. XI

Ganoderma sp. (*laccatum* Kalchb.?)

Hexagona variegata Berkeley

Hexagona variegata Berkeley

Lenzites repanda (Mont.) Fries.

Lenzites repanda (Mont.) Fries

Est. XVI

A. R. Teixeira e J. C. Mendes, del.

Lenzites repanda (Mont.) Fries

Polyporus leonotis Kalchb.

A.R. Teixeira & J.C. Mendes, del.

Polyporus leonotis Kalchb.

Est. XIX

Polyporus gilvus (Schw.) Fries.

Est. XX

Polyporus gilvus (Schw.) Fries

Est. XXI

A.R. Ferreira & J.C. Mendes, del.

Poria pulchella (Schw.) Cooke

Trametes caperata Berkeley

Est. XXIII

Trametes caperata Berkeley

ESTAMPA XXIV

- 1 — píleo circular, mesópodo, infundibuliforme (de ilustração de Wettstein 14). a) pé do estipe, globoso ; b) estipe liso, glabro, cilíndrico ; c) poros ; d) margem inteira, lisa, aguda ; e) substrato ; f) superfície do píleo, zonada.
- 2 — píleo reniforme, convexo, de estipe dorsal. a) pé do estipe, de superfície escabrosa ; b) estipe ramificado, glabro, sinuoso a noduloso ; c) superfície do píleo, glabra, radialmente enrugada com suaves rugas ; d) substrato.
- 3 — píleo circular, mesópodo, deprimido. a) pé do estipe, de formato irregular ; b) estipe glabro, cilíndrico, liso ; c) poros ; d) margem obtusa, inteira, ligeiramente sinuosa ; e) tubos estratificados (caraterístico das *fomóideas*) ; f) superfície glabra, concêntricamente sulcada ; g) contexto ; h) substrato.
- 4 — píleo espatulado, pleurópodo. a) estipe curto, glabro, liso, subcilíndrico ; b) poros ; c) substrato.
- 5 — píleo irregular, infundibuliforme, de estipe excêntrico. a) estipe curto, obcônico, piloso ; b) poros ; c) margem lobada a fendida ; d) superfície glabra ; e) substrato.
- 6 — píleo petalóide, séssil, convexo.
- 7 — píleo flabeliforme, séssil, convexo.
- 8 — píleo dimidiado, séssil, convexo.
- 9 — píleo circular, mesópodo, umbonado (de fotografia de Lloyd (6). a) estipe cônico, glabro, liso ; b) margem subaguda, ondulada ; c) superfície glabra, concêntricamente sulcada ; d) umbo ; e) substrato.
- 10 — píleo séssil, aplanado. a) superfície glabra, concêntrica e suavemente ondulada ; b) contexto ; c) tubos estratificados ; d) margem obtusa ; e) substrato.
- 11 — píleo séssil, ungulado. a) superfície glabra, concêntrica e suavemente ondulada ; b) contexto ; c) tubos estratificados ; d) margem obtusa ; e) substrato.
- 12 — corpo-de-frutificação ressupinado (caraterístico do gênero *Poria*). a) tubos não estratificados ; b) contexto ; c) substrato.
- 13 — corpo-de-frutificação efuso-reflexo. a) superfície glabra, concêntrica e suavemente ondulada ; b) contexto ; c) tubos não estratificados ; d) margem obtusa ; e) substrato.
- 14 — píleo séssil, conchado. a) superfície pilosa ; b) contexto ; c) tubos não estratificados ; d) margem obtusa ; e) substrato.
- 15 — píleo imbricado. a) superfície glabra, lisa ; b) contexto ; c) tubos não estratificados ; d) substrato ; e) margem obtusa.

Est. XXIV

A. R. Fonseca, del.

ESTAMPA XXV

- 16 — *Trametes* sp. — corte transversal mostrando os tubos a diferentes profundidades no contexto. a) superfície pilosa ; b) contexto ; c) tubos ; d) substrato.
- 17 — *Cyclomyces* sp., de uma fotografia de Lloyd (6). a) estipe obcônico ; b) poros lamelares, concêntricos, típicos do gênero ; c) superfície convexa ; d) substrato.
- 18 — *Lenzites* sp. — a) poros lamelares radiais, típicos do gênero ; b) bordos suavemente sinuosos ; c) substrato.
- 19 — *Daedalea* sp. — a) poros irregularmente alongados, dedalóides, típicos do gênero ; b) substrato.
- 20 — Poros pequenos, arredondados, típicos dos gêneros *Polyporus*, *Fomes*, *Ganoderma* e *Trametes*.
- 21 — *Hexagona* sp. — poros aumentados. Notar quão delgado é o dissepimento.
- 22 — *Favolus* sp. — poros longo-hexagonais, tendendo a lozangular, típicos do gênero.
- 23 — poros circulares, muito aumentados.
- 24 — poros alongados, muito aumentados.
- 25 — bordos lisos, dos poros.
- 26 — bordos dentados ou serrilhados, dos poros.
- 27 — bordos fimbriados, dos poros.
- 28 — bordos lacerados, dos poros.
- 29 — Setas : a) ventricosas ; b) subuladas ; c) curvas. d) basídias ; e) dissepimento.
- 30 — Meda cilíndrico-globosa. a) meda ; b) basídias.
- 31 — Medas : a) cilíndrico-cônicas ; b) cônicas. c) basídias.
- 32 — Paráfises : a) filiformes, simples ; b) clavadas, simples ; c) filiformes, ramificadas ; d) cilíndricas, simples.

Est. XXV

25

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A.R. Ferreira, del.

ESTAMPA XXVI

- 33 — basídias de *Auricularia* sp.
- 34 — basídias de *Septobasidium* sp. — a) probasídia
- 35 — basídias de *Dacryomyces* sp. — a) epibasídia ; b) hipobasídia
- 36 — basídia de *Tremella* sp. — de ilustração de Moeller (8).
- 37 — basídia de *Exidia* sp. — de ilustração de Moeller (8).
- 38 — homobasídias tipicamente clavadas ; a) esterigmas.
- 39 — homobasídias clavado-globosas. a) esterigmas.
- 40 — homobasídias clavado-cilíndricas. a) esterigmas.
- 41 — esporo tuberculado — adaptado de Lowe (7).
- 42 — esporo globoso, espinulado — adaptado de Lowe (7).
- 43 — esporo sub-globoso, de parede espessa, colorida (visto em corte).
- 44 — esporo ovóide, colorido.
- 45 — esporo cilíndrico-elipsóide, hialino.
- 46 — esporo elipsóide.
- 47 — esporo cilíndrico.
- 48 — esporo alantóide.
- 49 — esporo reniforme.
- 50 — esporo de *Ganoderma* (visto em corte). a) ápice, geralmente truncado ; b) episporo ; c) endosporo.
- 51 — cistídia cilíndrica.
- 52 — cistídia ventricosa.
- 53 — cistídia clavada.
- 54 — cistídia subglobosa.
- 55 — cistídia capitada (incrustada apenas no topo).
- 56 — cistídia lanceolada.
- 57 — hifa lisa, hialina.
- 58 — hifa sinuosa, fracamente colorida, não ramificada.
- 59 — hifa sinuosa, profundamente colorida, pouco ramificada.
- 60 — hifa de parede estreita e largo lúmen. a) lúmen.
- 61 — hifa de parede grossa e estreito lúmen. a) lúmen.
- 62 — hifa de parede estreita, largo lúmen, septada, pouco ramificada. a) septos ; b) lúmen.
- 63 — hifa hialina, muito ramificada.
- 64 — hifas com ganchos de ligação. a) antes da fusão das células ; b) logo depois da fusão ; c) estágio final.

Est. XXVI

A. R. Ferreira, del.