

Errata

Em março/abril de 2017 [Rev Col Bras Cir. 2017;44(2):179-86], a Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões publicou o artigo original intitulado "Reconstrução imediata com enxerto autólogo de gordura: influência na recorrência local de câncer de mama." (<http://dx.doi.org/10.1590/0100-69912017002012>), de autoria de Camile Cesa Stumpf; Jorge Villanova Biazus; Fernando Schuh Ângela Erguy Zucatto; Rodrigo

Cericatto; José Antônio Crespo Cavalheiro; Andrea Pires Souto Damin; Márcia Portela Melo. Os seguintes erros foram identificados:

Título em inglês:

Onde se lê:

"...influence in breast cancer regional recurrence";

Leia-se: "

...influence in loco regional recurrence in breast cancer.

Tabelas:

Onde se lê:

Tabela 1. Características clínicas e histológicas dos pacientes com carcinoma ductal invasivo que se submeteram à cirurgia conservadora ou lipoenxertia.

| | CCM + Lipoenxertia (n=27) | CCM (n=167) |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Idade (homens no ano) | 53,6 ± 10,9 | 56,4 ± 12,0 |
| Tamanho do tumor (mm) | 24,3 ± 10,5 | 20,6 ± 12,0 |
| Classificação histológica | | |
| I | 7 (25,9) | 38 (22,8) |
| II | 9 (33,3) | 85 (50,9) |
| III | 11 (40,7) | 44 (26,3) |
| Estadiamento clínico (TNM) | | |
| I | 7 (25,9) | 78 (46,7) |
| II | 20 (74,1) | 89 (53,3) |
| Histologia | | |
| CDI | 24 (88,9) | 149 (89,2) |
| CLI | 3 (11,1) | 18 (10,8) |
| Receptor do estrogênio | | |
| Presente | 22 (81,5) | 128 (76,6) |
| Ausente | 5 (18,5) | 39 (23,4) |
| Receptor de progesterona | | |
| Presente | 22 (81,5) | 116 (69,5) |
| Ausente | 5 (18,5) | 51 (30,5) |
| HER2 | | |
| Com alta expressão | 3 (11,1) | 19 (11,4) |
| Sem alta expressão | 20 (74,1) | 137 (82,0) |
| Indeterminado | 4 (14,8) | 11 (6,6) |
| Quimioterapia neoadjuvante | 1 (3,7) | 26 (15,6) |
| Quimioterapia adjuvante | 17 (63,0) | 62 (37,1) |
| Radioterapia adjuvante | 27 (100) | 163 (97,3) |
| Intervalo para começo da terapia adjuvante (meses) | 1 (1 - 2) | 2 (1-4) |

Variáveis categóricas, descritas como n (%); Variáveis quantitativas simétricas descritas como média ± desvio-padrão; Variáveis quantitativas assimétricas descritas como meios (P25-P75); CCM- Cirurgia conservadora da mama; CDI- carcinoma ductal invasivo; CLI- carcinoma lobular invasivo.

Leia-se:**Tabela 1.** Características clínicas e histológicas dos pacientes com carcinoma ductal invasivo que se submeteram à cirurgia conservadora ou lipoenxertia.

| | CCM* + Lipoenxertia (n=27) | CCM (n=167) | p |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| Idade (média em anos) | 53,6 ± 10,9 | 56,4 ± 12,0 | 0,268 |
| Tamanho do tumor (mm) | 24,3 ± 10,5 | 20,6 ± 12,0 | 0,134 |
| Classificação histológica | | | 0,194 |
| I | 7 (25,9) | 38 (22,8) | |
| II | 9 (33,3) | 85 (50,9) | |
| III | 11 (40,7) | 44 (26,3) | |
| Estadiamento clínico (TNM) | | | 0,070 |
| I | 7 (25,9) | 78 (46,7) | |
| II | 20 (74,1) | 89 (53,3) | |
| Histologia | | | 1,000 |
| CDI** | 24 (88,9) | 149 (89,2) | |
| CLI*** | 3 (11,1) | 18 (10,8) | |
| Receptor do estrogênio | | | 0,757 |
| Presente | 22 (81,5) | 128 (76,6) | |
| Ausente | 5 (18,5) | 39 (23,4) | |
| Receptor de progesterona | | | 0,294 |
| Presente | 22 (81,5) | 116 (69,5) | |
| Ausente | 5 (18,5) | 51 (30,5) | |
| HER2 | | | 0,330 |
| Com alta expressão | 3 (11,1) | 19 (11,4) | |
| Sem expressão | 20 (74,1) | 137 (82,0) | |
| Indeterminado | 4 (14,8) | 11 (6,6) | |
| Quimioterapia neoadjuvante | 1 (3,7) | 26 (15,6) | 0,135 |
| Quimioterapia adjuvante | 17 (63,0) | 62 (37,1) | 0,020 |
| Radioterapia adjuvante | 27 (100) | 163 (97,3) | 1,000 |
| Intervalo para início da terapia adjuvante (meses) | 1 (1 - 2) | 2 (1-4) | 0,041 |

Variáveis categóricas, descritas como n (%); Variáveis quantitativas simétricas descritas como média ± desvio-padrão; Variáveis quantitativas assimétricas descritas (P25-P75); *CCM- Cirurgia conservadora da mama; **CDI- carcinoma ductal invasivo; ***CLI- carcinoma lobular invasor.

Onde se lê:**Tabela 2.** Incidência de recidiva nos grupos de cirurgia conservadora e lipoenxertia.

| | CCM + Lipoenxertia (n=27) | CCM (n=167) |
|-----------------------|---------------------------|-------------|
| Recorrência global | 1 (3,7) | 7 (4,2) |
| Recidiva local | | |
| Sim | 7 (25,9) | 38 (22,8) |
| Não | 9 (33,3) | 85 (50,9) |
| Recorrência sistêmica | | |
| Sim | 7 (25,9) | 78 (46,7) |
| Não | 20 (74,1) | 89 (53,3) |

As variáveis categóricas, descritas como n (%); CCM - cirurgia conservadora da mama.

Leia-se:**Tabela 2.** Incidência de recidiva nos grupos de cirurgia conservadora e lipoenxertia.

| | CCM* + Lipoenxertia (n=27) | CCM (n=167) | p |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-------|
| Recorrência global | 1 (3,7) | 7 (4,2) | 1,000 |
| Recorrência local | | | 1,000 |
| Sim | 0 (0,0) | 4 (2,4) | |
| Não | 27(100) | 163 (95,8) | |
| Recorrência sistêmica | | | 0,454 |
| Sim | 1 (3,7) | 3 (1,8) | |
| Não | 26 (96,3) | 164 (98,2) | |

As variáveis categóricas, descritas como n (%); *CCM - cirurgia conservadora da mama.